



sc. sup. 3. Pl. 4.



MAG 1555



STORIA
NATURALE,
GENERALE, E PARTICOLARE

DEL SIG.

DE BUFFON

INTENDENTE DEL GIARDINO DEL RE,
DELL' ACCADEMIA FRANCESE, E
DI QUELLA DELLE SCIENZE, ec.

Colla Descrizione

DEL GABINETTO DEL RE

DEL SIG.

DAUBENTON


CUSTODE E DIMOSTRATORE
DEL GABINETTO DI STORIA NATURALE.

Trasportata dal Francese

TOMO XXVII.



IN MILANO. MDCCLXXIII.
APPRESSO GIUSEPPE GALEAZZI
REGIO STAMPATORE.
Con licenza de' Superiori, e Privilegio.







PIPISTRELLO DAL FERRO DI LANCIA

IL PIPISTRELLO

FERRO-DI-LANCIA (a).

Nella molteplicità della specie dei pipistrelli, che non erano nè nominate, nè conosciute, ne abbiamo noi indicate alcune con nomi tolti dagl' idiomi stranieri, ed altre con denominazioni formate sul loro carattere più sensibile; ve ne ha una, che

A 2

(a) *Vespertilius Americanus vulgaris*. Il pipistrello comune di America. Seba, *Vol. I. pag. 90. tav. 55. fig. 2.*

Vespertilio murini coloris, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, naso cristato
Vespertilio Americanus. Il pipistrello di America. Brisson, *Regn. anim.* pag. 228. *Nota.* Il Sig. Brisson si è ingannato non supponendo a questo pipistrello, che quattro dita alle ale; è la figura di Seba, che lo ha tratto in errore, di fatti essa non rappresenta che tre diti nella membrana dell' ala, ed un quarto, che forma il pollice, ma questo è un difetto del Disegnatore. Il Sig. Edwards, che è stato più esatto nel disegno, che ha fatto di questo animale, vi ha delineate le cinque dita, che ha realmente, come tutti gli altri pipistrelli.

Vespertilio rostro appendice auriculæ formâ donato.
 Sloane, *Hist. of Jamaïc.* Vol. II. pag. 330.

Bat from Jamaïca. Edwards, *of Birds*, pag. 201. tab. *ibid.* fig. 1.

Perspicillatus vespertilio ecaudatus, naso foliato plano acuminato. *Syst. nat.* 7. *Mus. ad Fr.* 1. pag. 7. *Linn. Syst. nat.* Edit. X. pag. 31.

abbiamo appellata il *ferro-di-cavallo*, perchè ha un rilievo in faccia simile perfettamente alla forma di un ferro di cavallo. Parimente nominiamo quella, di cui qui si tratta, il *ferro-di-lancia*, perchè presenta una cresta o membrana in forma di trifoglio acutissimo, e che rassomiglia affatto a un ferro di lancia fornito de' suoi orecchioni. Quantunque questo carattere basti solo per farlo distinguere da tutte le altre, si può ancora aggiugnere, ch'esso non ha coda, ch'esso è quasi dello stesso pelame e della grossezza stessa del pipistrello comune, ma che in vece di avere siccome quello e la maggior parte degli altri pipistrelli sei denti incisivi alla mascella inferiore, non ne ha che quattro: del resto questa specie, la quale è assai comune nell'America, non si trova in Europa.

Vi è a Senegal un altro pipistrello, che ha pure una membrana sul naso, ma tal membrana in vece d'avere la forma di un ferro-di-lancia o di un ferro-di-cavallo, come ne' due pipistrelli, di cui abbiamo fatta menzione, ha una figura più semplice, e somiglia ad una foglia ovale: questi tre pipistrelli essendo di climi diversi non sono semplici varietà, ma specie separate e distinte. Il Sig. Daubenton ha fatta la descrizione di questo pipistrello del Senegal sotto il nome della *foglia* nelle *Memorie dell' Accademia delle Scienze*, l'anno 1759., pag. 374.

del Pipistrello Ferro-di-lancia . 5

I pipistrelli, che già hanno grandi rapporti cogli uccelli pel loro volo, per le loro ali e per la forza dei muscoli pettorali pare, che gli si avvicinino anche più per queste membrane o creste, che hanno sulla faccia; queste parti eccedenti, le quali non si presentano sulle prime, che come superflue deformità, sono i caratteri reali e i digradamenti visibili dell' ambiguità della Natura fra questi quadrupedi volanti e gli uccelli; perchè la maggior parte di questi hanno pure delle membrane e delle creste intorno al becco e alla testa, che pajono tutte del pari superflue, come quelle dei pipistrelli.



DESCRIZIONE DEL PIPISTRELLO

FERRO-DI-LANCIA.

Quest' animale [*tav. I.*] è una specie di pipistrello , che ha molta relazione a quello , che abbiain chiamato il *Ferro di Cavallo* (*), a cagione della forma fungolare del naso , che non è men rimarchevole per la sua straordinaria figura nel pipistrello , di cui or si parla ; esso rassomiglia a un ferro di lancia , che abbia due rami alla sua base : si potrebbe altresì paragonare la strana figura di questo naso a quella d'un trifoglio , che non avesse punto di picciuolo , e 'l cui lobo di mezzo fosse più grande degli altri due e avesse la forma d'un ferro di lancia : ma questi tre lobi non sono realmente separati ; la membrana non è fessa come pare , è solamente piegata , e forma una piccola doccia , all' origine di cui trovasi l'apertura di ciascuna narice . La parte della membrana , ch' è al di sotto di quella che rassomiglia a un ferro di lancia , sporge in fuori sopra il naso e su i lati del muso , ove trovasi un' eminenza ch' è formata dalla pelle , e che sembra servir di base per appoggiare i piccoli lobi del trifoglio . Il muso è largo ; sul

(*) Vedi il Tomo XVI. di quest' Opera , *tav. XX.*

Descrizione del Pipistrello, ec. 7

dinanzi del labbro inferiore vi ha una figura triangolare contrassegnata da una pelle granita. Le orecchie son grandi ed hanno sul lato esterno una lunga incavatura che comincia dalla punta; vi ha un piccolo orecchino puntuto. La membrana delle ale s' estende nove linee più lungi che la coda, ch' è cortissima. Il pelo di tutto il corpo e la membrana delle ale e della coda hanno un color bruno-carico o nericcio. Questo pipistrello ha tre pollici e sette linee di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, e un piede e sette pollici d' estensione.

I denti sono al numero di trentadue, come quelli della nottola, della serotina, del barbastello, del can-volante, e del can-volante dal collo rosso: ve ne son quattro incisivi, due canini e dieci mascellari in ciascuna mascella: i due incisivi superiori del mezzo son molto più grandi e più larghi degli altri che son piccolissimi, egualmente che i quattro del disotto: i primi due mascellari da ciascun lato son piccoli, e gli altri tre son grossi. Sebbene sianvi cinque pipistrelli aventi trentadue denti come il *ferro di lancia*, questo nondimeno è diverso dagli altri cinque per la situazione e per la figura de' denti; non vi ha che i cani-volanti che abbiano, come il *ferro di lancia*, quattro incisivi a ciascuna mascella; essi però hanno dodici mascellari nella mascella inferiore, e solamente otto nella superiore, mentre il *ferro di lancia* ne ha dieci in ciascuna mascella.

Il pipistrello *ferro di lancia* ha molta relazione a quello, che abbiain descritto in quest' Opera (a), sotto il nome di *ferro di cavallo*, e a quello, di cui ho data la descrizione nelle Memorie della Reale Accademia delle Scienze (b), sotto il nome di *foglia*. Questi tre pipistrelli hanno delle membrane sporgenti al sito del naso; ma nella figura delle dette membrane vi passano delle differenze grandi; quella della *foglia* è in forma di piastra ovale posta verticalmente; rassomiglia ad una foglia, e perciò ne ho dato il nome a questo pipistrello: essa è molto estesa a proporzione della grandezza dell'animale, imperciocchè ha otto linee di lunghezza e sei di larghezza, e il pipistrello non ha che due pollici e un quarto di lunghezza, presa dall'estremità del muso fino all'ano: le orecchie sono quasi due volte più lunghe della membrana del naso; l'una tocca l'altra col loro orlo interiore, dalla loro origine fino alla metà della loro lunghezza; hanno un orecchino o tumore, ch'è molto stretto e puntuto all'estremità, e che non ha che la metà della lunghezza dell'orecchia. Questo pipistrello non ha coda; il suo pelo è d'un bel color cenerino con alcune tinte di gialliccio: esso mi fu comunicato dal Sig. Adanson, che lo portò dal Senegal; rassomiglia al pipistrello *ferro di cavallo* pel numero e per la situazione dei denti,

(a) Vedi il Tomo XVI., tavola XX.

(b) Anno 1759., pagina 374.

del Pipistrello Ferro-di-lancia . 9

e principalmente perch' esso non ha punto di denti incisivi superiori : questi due pipistrelli son diversi dal *ferro di lancia* per questo carattere e pel numero de' denti .

Ho veduto un altro pipistrello del Senegal (a), che manca di denti incisivi superiori , come il *ferro di cavallo* e la *foglia* , ma ha due denti mascelari di più nella mascella superiore , e in tutto ventotto denti . Esso è presso a poco della stessa grandezza che il pipistrello *ferro di cavallo* , ha il muso largo e allungato ; le orecchie sono di mediocre grandezza , e vi ha un orecchino molto corto , larghissimo e ritondato ; il disopra del corpo ha un color bruno , e 'l disotto è mischiato di bruno men carico e di color cenerino ; l'estremità della coda è sciolta dalla membrana come nel pipistrello, di cui ho data la descrizione alla pag. 78. del Tomo XX. di quest' Opera , e nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze , anno 1759. , sotto il nome di *Murmotta-volante* , colla descrizione d' un altro pipistrello , che ho chiamato *Ratto-volante* , di cui in questa Storia Naturale non si è ancor fatta menzione : anch' esso mi fu comunicato dal Sig. Adanson , che l' ha recato dal Senegal ; è presso a poco della stessa grandezza che la Nottola (b) ; ha il muso

(a) Esso mi fu comunicato dal Sig. Adanson ; ne ho data la descrizione nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze , anno 1759. , sotto il nome di *Ratto-volante* .

(b) Vedi il Tomo XVI. di quest' Opera , tav. XVIII. fig. 1.

10 *Descrizione del Pipistrello, ec.*

corto e grosso , e le orecchie larghe e un orecchino piccolissimo ; il disopra del corpo è bruno , il disotto è mischiato di bianco sporco e di fulvo ; la membrana delle ale e della coda ha delle tinte di bruno e di grigio , e l'estremità della coda è sciolta dalla membrana : i denti sono al numero di ventisei ; vi son due incisivi e due canini in ciascuna mascella , otto mascellari nella mascella superiore , e dieci nell' inferiore.







IL SERVAL

Ratti sc.

IL SERVAL (a).

Questo animale, che è vissuto per alcuni anni nel Serraglio del Re sotto il nome di *gatto-tigre*, ci pare lo stesso, che è stato descritto dai Signori dell' Accademia sotto il nome di *gatto-pardo*; e noi ignoreremmo forse ancora il suo vero nome, se il Sig. Marchese di Montmirail non l'avesse trovato in un Viaggio italiano (b), di cui ha fatta la traduzione e l'estratto. „ Il *ma-*
 „ *raputé*, che i Portoghesi dell' India appel-
 „ lano *servat*, (dice il P. Vincenzo Maria)
 „ è un animale selvatico e feroce, più grosso
 „ del gatto selvatico, e un po' più piccolo
 „ della civetta, da cui è diverso perciò che
 „ la sua testa è più rotonda e più grossa,
 „ relativamente al volume del suo corpo, e
 „ perchè la fronte sembra scavata nel mezzo;
 „ somiglia alla pantera pei colori del pelo,
 „ che è fulvo sulla testa, sul dorso e su i
 „ fianchi, e bianco sotto il ventre, ed anche

(a) *Serval*, nome che i Portoghesi stabiliti nell' India hanno dato a questo animale, che gli abitanti del Malabar appellano *Maraputé*.

Gatto-pardo, Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, *Partie I. page 109.*

(b) Voyage du Père F. Vincent-Marie de Sainte-Catherine de Sienné. *Venise, 1683. in 4. p. 409.* article traduit par M. le marquis de Montmirail.

„ per le macchie, che sono distinte, egual-
„ mente distribuite, ed un po' più piccole di
„ quelle della pantera; gli occhi sono vivifi-
„ simi, i mustacchi forniti di setole lunghe
„ e ruvide: ha la coda corta, i piedi gran-
„ di, e armati d'unghie lunghe e storte.
„ Si trova nelle montagne dell' India; si
„ vede di rado a terra, si tiene quasi sem-
„ pre sugli alberi, dove fa il nido, e coglie
„ gli uccelli, di cui si nutrisce; salta pure
„ così leggermente come una scimia da un
„ albero all' altro, e con tanta destrezza e
„ agilità, che in un momento trascorre un
„ lungo tratto, e non fa per così dire,
„ che mostrarsi e scomparire; è di un na-
„ turale feroce, nondimeno fugge al vedere
„ un uomo se non viene irritato, e massi-
„ mamente col disordinargli il covile; per-
„ chè allora diventa furioso, si slancia, mor-
„ de e lacerà quasi altrettanto della pan-
„ tera.

La prigionia, i buoni o cattivi trattamenti, non vagliono a domarne, nè a temperarne la ferocia; quello, che abbiamo veduto nel Serraglio era sempre in procinto di slanciarsi contro di quelli, che gli si appressavano: non si è potuto delineare, nè descrivere se non a traverso la grate della sua prigione: si manteneva di carne come le pantere e i leopardi.

Questo serval o maraputè di Malabar e
delle

delle Indie (a) ci sembra lo stesso animale del gatto-tigre del Senegal e del Capo di Buona-speranza, il quale secondo le testimonianze dei Viaggiatori (b) somiglia al gatto nella figura, ed alla tigre (cioè alla pantera o al leopardo) per le macchie nere e bianche del pelo; „ questo animale, dicono essi, „ è quattro volte più grosso di un gatto, „ è vorace, e mangia le scimie, i ratti e „ gli altri animali “.

Nel paragone, che abbiain fatto del serval col gatto-pardo descritto dai Signori dell' Accademia non vi abbiain trovate altre differenze fuori delle lunghe macchie del dorso, e degli anelli della coda del gatto-pardo, i quali non sono nel serval; ha soltanto queste macchie del dorso situate più vicine a quelle delle altre parti del corpo; ma questa piccola differenza fa una varietà troppo piccola, perchè si possa dubitare dell' identità della specie di questi due animali.

Tom. XXVII. B

(a) Vi sono in Sagori [isola sul Gange] dei gatti-tigre, i quali sono grossi come un montone. *Nouveau Voyage par le sieur Luillier* Rotterdam, 1726 p. 90.

(b) *Voyage de le Maitre*, pag. 100. — Il gatto di bosco o il gatto-tigre è il più grosso dei gatti selvatici del Capo; la sua abitazione è nei boschi, ed è macchiato quasi come la tigre. La pelle di questi animali somministra eccellenti pellicce pel caldo e per ornamento, e perciò si vendono ad alto prezzo al Capo. *Description du cap de Bonne-esperance*, par Kolbe, Tom. III. pag. 50.

DESCRIZIONE

DEL SERVAL.

IL serval [tav. II.] è più grande del gatto selvaggio, ma m'è paruto non esserne diverso per la forma del corpo, se non perchè ha il muso un po' più lungo, le orecchie più grandi e la coda più corta. Quello, che ha servito di soggetto per questa descrizione, aveva il corpo a proporzione più grossolano che il gatto selvaggio, ed anche che i gatti domestici, forse perchè era stato lungo tempo mantenuto in una gabbia nel Serraglio di Versailles. Il Sig. Perrault aveva già osservato che il serval, di cui presumiamo ch'egli abbia data la descrizione sotto il nome di gatto-pardo (*), era sì grasso che il suo collo sembrava esser più corto di quello del gatto. Quantunque la figura, che il Sig. Perrault ha unita alla mentovata descrizione, sia diversa da quella, che noi qui ne diamo, e ch'è stata disegnata con molta esattezza sull'animal vivo, nondimeno non vi ha luogo a dubitare, che queste due figure non siano state fatte sopra animali della medesima specie. Nella descrizione del Sig. Perrault ho veduto che il gatto-par-

(*) Memorie per servire alla Storia Naturale degli Animali, *Parte I.*, pag. 110.

Descrizione del Serval. 15

do, che n'era il soggetto, rassomigliava molto all'animale, di cui qui si tratta, per la grandezza e per le proporzioni del corpo, e quanto a' colori del pelo non vi ho notate che leggieri differenze, come si soglion trovare fra individui d'una medesima specie d'animali selvaggi.

Il disopra del muso era di color cenerino, tinto di bruno: la fronte, la sommità, il didietro e i lati della testa, la faccia esterna delle orecchie, il di sopra e i lati del corpo, la coda, la faccia esterna delle gambe anteriori, e le gambe di dietro in intero avevano un color fulvo più o men carico e mischiato di rossiccio ed anche di cenerino in alcuni siti. L'estremità del muso, il disotto del collo e la faccia interna delle gambe anteriori avevano un color bianco o biancastro; tutte queste parti erano sparfe di macchie nere o nericce ed anche grige; esse eran molto piccole sulla testa e sul basso delle gambe; eranvi delle fasce nere e trasversali sulla faccia esterna delle orecchie e sull'alto della faccia interna dell'avan-braccio, e quattro o cinque anelli dello stesso color nero sull'estremità della coda. Gli occhi eran circondati d'un cerchio bianco: la mascella inferiore, l'interno delle orecchie, la gola, il petto, e il ventre avevano parimente un color bianco. Il pelo m'è paruto alquanto più grosso di quello del gatto, ma presso a poco della stessa lunghezza.

Non ho potuto osservare quest'animale che attraverso la ferrata della sua gabbia, e non mi fu

possibile il prender le misure delle differenti parti del suo corpo, nè il distinguere esattamente le diversità de' colori del suo pelo. La descrizione del Sig. Perrault non può supplire a questo difetto che con alcune misure delle parti esteriori, ch' ora riferirò; vi unirò le osservazioni che quest' Autore ha date sulle parti interiori colle loro misure, per quanto esse potranno riferirsi al piano delle mie descrizioni.

pied. poll. lin.

Lunghezza dall' estremità del muso

fino al principio della coda ————— 2. 6. o.

Altezza dall' estremità delle zampe

fin sopra il dorso ————— 1. 6. o.

Lunghezza della coda ————— o. 8. o.

L'epiploon era molto carico di grassia, s'estendeva fino nell' anguinaglie, e si ripiegava all' innanzi sugl' intestini.

Gl' intestini tenui e 'l cieco avevan tutti presso a poco la stessa grossezza: il colon e 'l retto eran più grossi d' un terzo.

Lo stomaco era molto grande e molto ampio.

Il fegato aveva sei gran lobi, tre de' quali eran divisi ciascuno in due parti. La vescichetta del fiele aveva un color gialliccio.

La milza rassomigliava in qualche modo ad una foglia di quercia, perch' era frastagliata in più siti; aveva un color rosso-bruno.

Il diaframma era molto carnosso, e la sua parte nervosa aveva poca estensione.

La verga era piccolissima, e nella ghianda non si trovava verun osso.

Le sinuosità del cervello erano longitudinali e in piccol numero.

pied. poll. lin.

Lunghezza degl'intestini tenui dal pi-			
loro fino al cieco	7.	0.	0.
Circonferenza	0.	2.	0.
Lunghezza del cieco	0.	1.	6.
Circonferenza	0.	2.	0.
Lunghezza del colon e del retto presi			
insieme	1.	0.	0.
Circonferenza	0.	3.	0.
Lunghezza del canale intestinale in in-			
tero, non compreso il cieco	8.	0.	0.
Lunghezza della milza	0.	4.	0.
Larghezza nel mezzo	0.	1.	3.
Lunghezza della verga e della ghianda	0.	1.	6.
Circonferenza	0.	0.	4 $\frac{1}{2}$



L' OCELOT (a).

L'Ocelot è un animale dell' America ferocce e carnivoro, che si dee porre a fianco del jaguar e del coguar, o immediatamente vicini; perchè loro si accosta nella grandezza, e loro rassomiglia nella figura e nel naturale. Il maschio e la femmina sono stati recati vivi a Parigi dal Sig. l'Escot, e si sono veduti alla fiera di S. Ovide nel mese di Settembre dell' anno 1764: venivano essi dai paesi vicini a Cartagena, ed erano stati tolti piccoli alla madre nel mese di Ottobre dell' anno 1763: in tre mesi d'età erano divenuti feroci e forti a segno di uc-

(a) Oceloto, nome che per abbreviazione abbi-
am tolto da *Tlalocelotl*, nome di questo animale nel
suo paese nativo nel Messico.

Tlacoozlotl, tlalocelotl. Catus pardus Mexicanus.
Hrenand. *Hist. Mex.* pag. 512. fig. *ibid.*

*Pardalis. Felis cauda elongata, corpore maculis su-
perioribus virgatis, inferioribus orbiculatis
habitat in America. Magnitudo melis, supra fu-
scus, subtus albicans; lineæ punctaque nigra per
totum corpus longitudinaliter sparsa; sed pedes &
abdomen tantum punctis, latera lineis latioribus
albis & fuscis pinguntur. Aures breves margine
bifide ab,que penicillis, pedes 5. 4. caudâ verticil-
lato variegatâ proportionem cati. Mystaces 4. ordi-
num, in singulo ordine setæ 3. 5. 5. albæ, basi
nigræ, longitudine capitis. Linn. Syst. nat. Edit. X.
pag. 42.*

Fig. 1.



Fig. 2.



Romiz fr.

L'OCELOT FEMINA



cidere e divorare una cagna, che loro data erasi per nutrice; a un anno di età, quando noi gli abbiain veduti, avevano due piedi in circa di lunghezza, ed è certo, che dovevano crescere ancora, e che probabilmente erano allora pervenuti alla metà appena, o a due terzi del loro intero aumento. Si facevano vedere sotto il nome di *gatto-tigre*, ma noi abbiamo esclusa questa denominazione precaria e composta con tanto più di ragione, perchè ci è stato mandato sotto lo stesso nome il *jaguar*, il *serval* e il *margay*, i quali nondimeno sono tutti e tre differenti infra di loro, e da quelle altresì, di cui qui parliamo.

Il primo Autore, che ha fatta menzione formale di questo animale, e in guisa da farlo conoscere si è Fabri; egli ha fatto incidere i disegni, che ne avea fatti Recchi, e ne ha composta la descrizione su questi stessi disegni, che erano coloriti, e ne ha fatta una specie d'istoria dopo ciò, che Gregorio di Bolivar ne avea scritto, e a lui raccontato. Io ho fatti questi riflessi affine di rischiarare un fatto, che ha indotti i Naturalisti in una specie di errore, e sul quale confesso, che io pure mi era com'essi ingannato: il fatto si è di sapere se i due animali delineati da Recchi, il primo col nome di *Tlatlahquiocelotl*, e il secondo con quello di *Tlacoatzotl*, *Tlalocelotl*,

e in appresso descritti da Fabri come di specie differenti, non siano lo stesso animale. Avevasi fondamento di riguardarli, e si riguardavano in fatti, siccome diversi, quantunque le figure fossero affai somiglianti, perchè sonoci però differenze nei nomi, ed anche nelle descrizioni; ho dunque creduto, che il primo notesse essere il medesimo del jaguar, cosicchè nella nomenclatura di questo animale, io ho riferito il nome Messicano *Tlatlauhquiocelotl*: ora questo nome Messicano non gli si conviene, e dappoichè abbiain veduti i maschi e le femmine, di cui qui parliamo, io mi sono persuaso, che i due descritti da Fabri non sono che lo stesso animale, di cui il primo è il maschio, e il secondo la femmina: era mestieri di un accidente, come quello che ci è accaduto, e vedere insieme il maschio e la femmina per accorgerci di questo piccolo errore. Fra tutti gli animali di pelle *tigrata*, l'ocelot maschio l'ha certamente più bella e più vagamente variata (a); quella del leopardo

(a) *Universum corpus pulchro roseoque subrubet colore, excepto inferiore ventre qui albicat potius; maculis rosarum effigie, nigricantibus omnibus intra suave rubentem colorem, totum ita corpus, pedes & cauda ordine quodam distinguuntur ut elegantem plane huic animali acu pictum tapetem vel peripetasma impositum crederes; sunt autem maculae hae in dorso & capite rotundiores majoresque;*


medesimo non vi si accosta per la vivacità de' colori e per la regolarità del disegno, e quella del jaguar, della pantera e della lonza ancora meno; ma nell' ocelot femmina, i colori sono più sparuti, e meno regolare il disegno, ed è appunto questa differenza apparentissima, che ha potuto ingannare Recchi, Fabri (a) e gli altri; si vedrà paragonando le figure e le descrizioni dell' uno e dell' altro, che le differenze non lasciano d'essere considerabili, e che mancano alla pelle della femmina molti fiori e ornamenti, che si trovano su quella del maschio.

Quando l' ocelot è giunto al suo compiuto aumento, ha, secondo Gregorio di Bolivar, due piedi e mezzo di altezza, e circa quattro di lunghezza, la coda, quantunque assai lunga, non tocca terra quando è penzoloni, e in conseguenza ha poco più di due piedi di lunghezza. Questo animale è voracissimo

B 5

versus ventrem vero pedesque oblongiusculæ & multo minores. Fabri apud Hernand. Hist. Mex. pag. 498.

(a) *Si animalis figuram spectemus cum antecedente non nihil corporis delineatio congruit; si colorem & maculas quibus pingitur, plurimum discrepat. In hoc totius color corporis non rubicundus sed obscure cinereus apparet præter ventrem tamen qui albicat. Maculæ nec ordinatæ adeo nec ita rotundæ roseive coloris & figuræ sed oblongæ nigricantes omnes in medio vero albicantes sparguntur, crura non ita fortis, &c. ibid. pag. 512.*



e tutto insieme timoroso; assale di rado gli uomini, teme le cagne; e quando è inteso cerca di rinselvarsi e sale su un albero: ivi resta per dormire e per insidiare i volatili e il bestiame, su cui si slancia tosto che li vede in vicinanza opportuna; antipone il sangue alla carne, ed è perciò che distrugge molti animali, perchè in vece di satollarli divorandoli, non fa che diffetarli, succhiando loro il sangue (a).

Nello stato di cattività conserva i suoi costumi, nulla può temperare il suo natural feroce, nulla può calmare i suoi movimenti inquieti, si è costretto tenerlo sempre chiuso in gabbia. „ A tre mesi (dice il „ Sig. l'Escot) poichè questi due animali „ ebbero divorata la loro nutrice, io li

(a) Nota. Dampier parla di questo modesto animale sotto il nome di *gatto-tigre*, ed ecco ciò che ne dice. „ Il gatto-tigre delle terre della „ baia di Campece è della grossezza dei nostri cani, „ che si fanno azzuffare coi tori; ha le gambe „ corte, il corpo raccolto, e quasi come quello „ d'un mastino, ma in tutto il resto, cioè nella „ testa, nel pelo e nella maniera di tracciare la „ preda, somiglia assai alla tigre (*jaguar*). tolto „ che non è così grosso: ve ne ha ivi di molti; „ divorano i giovani vitelli ed ogni sorta di cac- „ ciagione, che si trova in copia, però sono meno „ da temersi per questo stesso, perchè non man- „ cano di pascoli.... essi hanno un portamento „ altero e lo sguardo feroce “. *Voyage de Dampier*, Tom. III. pag. 306.

„ tenni in gabbia, e gli ho nudriti di carne
„ fresca, di cui mangiavano sette o otto
„ libbre al giorno; si accordavano maschio
„ e femmina, come i nostri gatti domestici;
„ regna fra di loro una superiorità singolare
„ per la parte del maschio; qualunque vo-
„ glia si abbiano questi due animali, giam-
„ mai la femmina prende nulla se non se
„ n'è il maschio satollato, e se questi non
„ le gitta i pezzi, ch'egli ricusa; ho dato
„ più volte ad essi dei gatti vivi; ed è av-
„ venuto, che ne succiarono il sangue finchè
„ furono morti, ma non li mangiarono
„ mai; ho mandati ad essi due capretti,
„ ma non mangiano essi carne di sorta al-
„ cuna nè cotta, nè salata (a).

Per testimonianza di Gregorio di Bolivar
pare, che questi due animali non producano
d'ordinario, che due parti, e quella del
Sig. l'Escot pare che lo confermi; perch'egli
dice di avere uccisa la madre prima di pren-
dere i due figli, di cui abbiàm parlato; lo

B 6

(a) Lettera del Sig. l'Escot, che ha recati questi animali dal continente di Cartagena al Sig. di Beoff, Corrispondente dell' Accademia delle Scienze in data del 17. Settembre 1764. *Nota.* Il Sig. de Beoff, che si è compiaciuto di comunicarmi questa Lettera è molto versato nella Storia Naturale, e questa non sarà la sola occasione, che noi avremo a parlare delle cose, che ci ha partecipate.

24 *Stor. Natur. dell' Ocelot .*

Stesso è dell' ocelot come del jaguar , della pantera , del leopardo , della tigre e del leone : tutti questi animali , che si distinguono per la grandezza , non producono , che in iscarso numero , laddove le gatte , che si potrebbero intromettere in questa medesima razza producono in maggior numero , il che prova , che il più o il meno nella produzione appartiene più alla grandezza , che alla forma .



DESCRIZIONE

DELL' OCELOT.

Quest'animale [*tav. III. fig. 1.*] è quasi egualmente grande che il jaguar e la lince, poichè ha quasi due piedi di lunghezza dall'estremità del muso fino all'origine della coda; parimente rassomiglia molto per le proporzioni del corpo al jaguar e agli altri animali di questo genere, come alla tigre, alla pantera, al leopardo, &c. Esso ha il muso più lungo e più grosso che il gatto, e la coda più corta, la quale è presso a poco della stessa lunghezza che quella del jaguar, e non è lunga che un piede in circa, per quanto ho potuto giudicare delle misure di quest'animale, vedendolo attraverso i cancelli d'una gabbia. Egli era troppo feroce per lasciarsi toccare; non ostante il suo pelo m'è paruto essere della stessa qualità che quello del jaguar, della pantera, &c.: ma il mantello era più bello per la distribuzione de' suoi colori, che rappresentavano diverse figure simmetriche nelle loro varietà; esse eran formate da strisce e da macchie nere sopra fondi bianchi o fulvi. Sul disopra del muso e della testa vedevasi una striscia nera, che s'estendeva da ciascun lato dalla narice fino all'angolo anteriore dell'occhio, si prolungava sulla testa, e terminava sull'occipite allato dell'orecchia. Fra queste due fasce

eranvi sulla fronte e sulla testa delle piccole macchie nere simmetricamente disposte in forma di fiore allungato: parimente al sito dei mustacchi eranvi varie file di piccole macchie nere e rotonde: due strisce dello stesso colore eran situate lungo i lati della mascella inferiore l'una al disopra dell'altra; quella del disopra metteva capo all'angolo esterno dell'occhio; l'estremità anteriore di quella del disotto aveva due rami, l'inferiore de' quali era diretto verso la gola. Sul disopra del collo eranvi quattro fasce longitudinali, e una striscia nera tra le due fasce di mezzo; le quattro fasce non erano interamente nere, ed avevano del fulvo nel lor mezzo; le due fasce esterne erano alquanto curve al basso colla loro estremità posteriore in forma d'uncino, che non è sì grande come sul margay, di cui si farà menzione nel proseguimento di questo Tomo. Lungo il dorso dell'ocelot s'estendeva una striscia nera fino all'origine della coda: da ciascun lato della detta striscia eravi una fila parallela di macchie nere ed ovali d'un pollice in circa di lunghezza, e al disotto di questa fila ve n'erano altre due composte di figure ovali, nere sugli orli e fulve nel mezzo, con piccole macchie rotonde e nere: il piccolo diametro delle figure ovali era lungo circa un pollice, e trasversale relativamente alla lunghezza del corpo: al disotto della terza fila eravi su i lati del corpo una fascia di più d'un pollice di larghezza, che s'estendeva dalla spalla fino al di-

nanzi della coscia, e ch' era orlata di nero come le figure ovali, e fulva nel mezzo con piccole macchie rotonde e nere: al disotto di questa fascia ve n' era un' altra alquanto men larga, la quale era interrotta; l' altra al contrario era continuata da un capo all' altro sul lato destro. Queste lunghe fasce fanno un carattere assai distintivo tra l' animale di cui si parla e la pantera, che ha delle figure rotonde o quasi rotonde, orlate di nero e fulve nel mezzo, con un punto nero nel centro: ve n' erano di somiglienti sulla coscia e sulla gropa, ed altre ovali sulla spalla e lungo il braccio. Il disotto del collo aveva delle strisce trasversali, l' una delle quali s' estendeva da un lato all' altro come un collarino situato vicino al petto; questa parte, il ventre, le quattro gambe e i piedi non avevano che macchie nere; quelle dell' avan-braccio e della gamba propriamente detta erano molto più grandi di quelle de' piedi: eranvi pure delle macchie nere sulla coda, le quali erano molto più grandi verso la sua estremità che verso la sua origine. Il fondo dal colore sul disopra del muso, della testa e del collo, sul dorso, sul disopra della groppa e della coda era fulvo, eccettuato sull' estremità della coda, ch' era quasi interamente nero: il color del fondo era bianco o biancastro sul disotto e su i lati della testa, del collo e del corpo, sul disotto della coda e sulle gambe: i piedi avevano un fondo di color grigio mischiato d' una leggier tinta di fulvo.

28 *Descrizione dell' Ocelot .*

La femmina[*tav. III. fig. 2.*] era alquanto più piccola del maschio; aveva presso a poco gli stessi colori distribuiti nella medesima guisa, ma erano meno apparenti, il fulvo era più scolorito, il bianco men puro, le strisce avevano minor larghezza, e le macchie minor diametro. La striscia nera del mezzo del dorso era interrotta in più siti, sulle spalle e sulla groppa non eranvi figure ovali, orlate di nero e con un punto nel mezzo: ma soltanto macchie nere disposte in circolo, come sul leopardo. Le macchie dell' estremità della coda erano men grandi che sul maschio: il mantello era men bello; bisognava mirarla dappresso per comprenderne tutte le differenze, ch' erano molto più apparenti sul maschio.







IL MARGAY

Ramés sc.

IL MARGAY (a).

IL Margay è assai più piccolo dell' ocelot; somiglia esso al gatto selvatico per la grandezza e per la figura del corpo; ha soltanto la testa più quadrata, il muso men corto, le orecchie più rotonde e la coda più lunga; il suo pelo è anche più corto di quello del gatto selvatico, ed è segnato con fasce, con linee, e con macchie nere su un fondo di color fulvo: ci è stato mandato da Cajenna sotto il nome di *gatto-tigre*, e partecipa in fatti della natura del gatto e del jaguar o dell' ocelot, i quali sono i due animali, ai quali si è dato il nome di *tigre* nel nuovo

(a) *Margay*, voce formata da *Maragua* o *Margaia*, nome di questo animale nel Brasile.

Al Maragnone vi sono animali, i quali sono specie di gatti selvatici, che gl' Indiani appellano *Margaia*, i quali hanno la pelle assai bella essendo tigrata in ogni sua parte. *Miss. du P. d'Abbeville*, page 250.

Tripe Maxtlaton. Fernand. *Hist. Nov. Hisp.* p. 9.

Maraguao sive Maracaia. Marcg. *Hist. Nat. Bras.* pag. 233.

Felis fera tigrina Malakaia. Barrère, *Hist. de la Fr. équin.* pag. 153.

Felis sylvestris tigrinus ex Hispaniola. Seba, *Vol. I.* pag. 77. tab. 42. fig. 2.

Felis ex griseo flavescens maculis nigris variegata....

Felis sylvestris tigrina. Il gatto selvatico tigrato. Briff. *Regn. anim.* pag. 266.

continente. Secondo Fernandes, questo animale, quando è pervenuto al suo sommo aumento non è così grande, come la civetta; e secondo Marcgrave, il cui paragone ci sembra giusto, è della grandezza del gatto selvatico, a cui rassomiglia pure per le abitudini naturali non vivendo che di piccoli volatili, d'insetti ec. ma è difficilissimo di addimesticarsi, anzi non perde mai il suo natural feroce; varia egli assai pe' colori, quantunque sia d'ordinario quale qui lo rappresentiamo: è un animale comunissimo nella Guiana, nel Brasile, e in tutte le altre provincie dell' America meridionale. Per ciò che ne pare è lo stesso di quello, che nella Luigiana si appella *Pichou* (a), ma la specie n'è meno comune nei paesi temperati, che ne' paesi caldi.

Se noi riandiamo colla mente questi animali crudeli, la cui pelle è così bella e così perfido il naturale, noi troveremo nell' antico continente la tigre, la pantera, il leopardo, la lonza, il serval; e nel nuovo il jaguar, l'ocelot e il margay, i quali non ci sem-

(a) Il *Pichou* è una specie di gatto pitois alto come la tigre, ma meno grosso, la cui pelle è bella assai: è un gran distruggitore del pollame, ma per buona sorte non è comune nella Luigiana. *Histoire de la Louisiane, par le Page du Pratz, Tom. II. pag. 92., fig. pag. 67.*

brano altro, che diminutivi dei primi, e che non avendone nè la grandezza, nè la forza, sono tanto timidi e deboli, quanto sono gli altri intrepidi e fieri.

Vi è ancora un animale di questo genere, che pare diverso da tutti quelli, che abbiain nominati; i Pelliccieri li chiamano *Guepard*; noi ne abbiamo vedute parecchie pelli, le quali somigliano a quelle della lince per la lunghezza del pelo, ma non terminando le orecchie con un pennacchio, il guepard non è una lince, nè è una pantera, nè un leopardo, non ha esso il pelo corto come questi animali, ed è diverso da tutti per una specie di chioma o di pelo lungo quattro o cinque pollici, che ha sul collo e fra le spalle; ha pure il pelo del ventre lungo tre in quattro pollici, e la coda a proporzione più corta di quella della pantera, del leopardo o della lonza; è presso a poco della statura di quest' ultimo animale, non avendo, che in circa tre piedi e mezzo di lunghezza del corpo; del resto la sua pelle, ch'è di un fulvo pallidissimo, è sparfa siccome quella del leopardo di macchie nere, ma più vicine le une alle altre, e più piccole non avendo, che tre o quattro linee di diametro.

Io avvisai, che questo animale dovesse essere lo stesso di quello, che indica Kolbe sotto il nome di *lupo-tigre*, io qui ne rife-

risco la descrizione (a) perchè si possa paragonar colla nostra; questo è un animale comune nelle terre vicine al Capo di Buona-speranza; giace egli di giorno tra le fessure delle rupi, o ne' buchi, che si forma sotterra; di notte va in traccia della preda; ma siccome urla cacciando, così avvisa gli uomini e gli animali, talchè è assai facile evitarlo o ucciderlo. Del rimanente è probabile, che la parola *guepard* sia derivata da *lepard*; così i Tedeschi e gli Olandesi nominano il leopardo: abbiamo altresì rilevato, che vi sono delle varietà in questa specie pel fondo del pelo e pel colore delle macchie, ma tutti i guepardi hanno il carattere comune de' peli lunghi sotto il ventre, e della chioma sul collo.

(a) E' della grandezza di un cane ordinario, e talvolta più grosso: la testa è larga come quella degli alani, che si fanno combattere in Inghilterra coi tori; ha le mascelle grosse come pure il muso e gli occhi; i denti sono taglienti; il pelo è riccio come quello di un can barbone, e macchiata come quello della tigre; ha le zampe larghe e armate di grossi artigli, che nasconde quando vuole come i gatti; la coda è corta ha per mortale nimico il leone, la tigre e il leopardo, che gli danno spessissimo la caccia; lo inseguono fino nella tana, se gli avventano addosso e lo sbranano. *Description du Cap de Bonne-esperance, par Kolbe, Tome III. pages 69. & 70.* Nota. L'animale, a cui dà questo Aut. il nome di *tigre*, è quello che noi abbiamo denominato *leopardo*, e quello ch'egli nomina *leopardo* è la *pantera*.

DESCRIZIONE

DEL MARGAY.

IL margay [*tav. IV.*] che ha servito di soggetto per questa descrizione, essendo stato ucciso in Cajenna, vi era stato preparato in guisa, che sotto la pelle, che fu in seguito imbottita, non vi restavano che gli ossi della testa e dei piedi. Mi sembra che la statura di quest' animale fosse minore di quella de' nostri gatti, e che non avesse che un piede e tre o quattro pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda: la coda però del margay era a proporzione più lunga di quella del gatto, poichè aveva undici pollici. La testa era men larga, il muso più lungo, e le orecchie più corte, esse non avevano che quattordici linee di lunghezza. Per queste proporzioni il margay ha maggiori relazioni alla tigre, al leopardo, alla pantera, al jaguar, ec., che al gatto, e loro rassomiglia anche più che al gatto, per la qualità e pe' colori del pelo, la cui lunghezza non era che d' un mezzo pollice in circa. Il di sopra e i lati della testa, del collo e del corpo, la faccia esteriore del braccio, dell' avan-braccio, della coscia e della gamba, e l' di sopra dei piedi avevano un color fulvo-chiaro con fasce e con macchie nere. Il di sotto della testa, del collo e del corpo, la faccia interna del braccio e dell'

34 *Descrizione del Margay.*

avan-braccio, della coscia e della gamba avevano un color bianco con macchie e con alcune fasce nere. L'occhio era orlato di nero; da ciascun lato della sommità della testa eravi una striscia nera, che s'estendeva dal disopra dell'occhio fino all'occipite, e un'altra striscia dello stesso colore, che cominciava all'angolo posteriore dell'occhio, e discendeva sul lato del collo, ed altre quattro che s'estendevano sul disopra del collo. Eranvi pure delle strisce longitudinali e irregolari sul disopra del corpo; una striscia che rappresentava una specie d'uncino, ec. L'orecchia era bianca sul mezzo della sua faccia esterna, e il restante era nero. Vedevansi delle macchie nere di differenti grandezze e di diverse figure sulla testa, sul corpo, sulle gambe, e sulla coda, ch'era variata di nero, di fulvo e di grigio.



DESCRIZIONE DEL GUEPARDO.

DI quest' animale non ho veduto che due pelli, l'una delle quali aveva tre piedi e mezzo di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, ch' era lunga un piede e otto pollici. Il pelo era morbido, lungo un piede sulla maggior parte del corpo, lungo tre pollici e mezzo sul disopra del collo e tra le spalle in forma di piccola chioma, la quale non si vede sulle tigri, sulle pantere, su i leopardi, ec. Il pelo della pelle del guepardo era di color bianco-sporco, con una leggier tinta di fulvo, principalmente sulla testa, e sulle quattro gambe. Tutta questa pelle era sparfa di piccole macchie nere quasi rotonde, situate molto vicino le une alle altre, principalmente lungo il dorso e la coda; quelle del ventre erano le più distanti, e quelle delle cosce erano le più grandi; per altro esse non avevano che un mezzo pollice in circa di diametro. La chioma era mischiata d' un bruno nericcio e di un fulvo scolorito e pallido, e i suoi peli eran duri. Eravi una striscia, che s' estendeva dall' angolo della bocca fino all' angolo anteriore dell' occhio. Le orecchie non avevano che due pollici di lunghezza; il basso della loro faccia esterna era nero; il disotto della mascella inferiore aveva un color bianco; l' estremità della coda era nera.

36 *Descrizione del Guepardo.*

L'altra pelle di guepardo non aveva che tre piedi di lunghezza, e la coda un piede e due pollici. Essa pareva provenire da un animal più giovane; non era diversa dalla prima, se non perchè il suo pelo era più lungo, eccettuato quello della chioma. Il color biancastro del fondo era più chiaro. Del resto i colori su queste due pelli erano perfettamente gli stessi.



IL CHACAL (a).

E

L'ADIVE.

NOi non siamo sicuri, che questi due nomi indichino due animali di specie differenti; sappiamo solamente, che il chacal è più grande, più feroce, più difficile di ad-
Tom. XXVII. C

(a) *Chacal*, *Jachul*, nome di questo animale nel Levante, e che noi abbiamo adottato; *Adil*, secondo Belon; *Tulki* in alcune provincie del Levante, secondo Oleario, *Siacalle*, secondo Cornelio le Bruu; *Adlibo* in Italiano, secondo il P. Vincenzo Maria; *Chical* in Turchia, secondo Hasselquist; *Sical*, secondo Polluce; *Squilachi* in Greco, secondo Belon; *Zacalia*, secondo Spon e Weeler; *Siachul*, *Schachal*, *Siechunt*, *Siacali* in Persia, secondo Kempfer; *Jacard*, secondo Delon; *Deeb* in Barberia, secondo Shaw, *Jaquaparel* a Bengala e *Nari*, nel Madurè secondo altri Viaggiatori.

Adil, bestia intermedia tra il lupo e il cane, che i Greci nominano volgarmente *Squilachi*, e crediamo che fra il *Chryseos* o *Lupus aureus* degli antichi Greci. *Observat. de Belon, feuillet 163.*

Lupus aureus. Kœmpfer, *Amanit. exotic.* p. 413. fig. pag. 407. fig. 3.

Vulpes indiae orientalis. Valentin. *Mus.* p. 452. fig. Tab. ibid.

Canis flavus, *lupus aureus* Le loup doré. Brisson, *Regn. anim.* pag. 237.

Aureus canis, *lupus aureus dictus* Linn. *Syst. nat.* edit. X. pag. 40.

dimesticarsi dell' Adivè (a), ma che nel resto sembrano in tutto somiglianti. Potrebbe essere adunque, che l'adive non fosse, che il chacal familiare, di cui fattasi fosse una razza domestica più piccola, più debole, e più mansueta della razza selvaggia; perchè l'adive rispetto al chacal è a un di presso come il piccolo can-barbone rispetto al cane da caccia; nondimeno siccome questo fatto non è indicato, che da alcuni esempj particolari, che la specie del chacal in generale non è domestica come quella del cane; che altronde si trova di rado tanta diversità in una specie libera, così siamo inclinati a credere, che il chacal, e l'adive sieno realmente due specie distinte. Il lupo, la volpe, il chacal, e il cane formano quattro specie, le quali quantunque accostantisi le une alle altre, sono nondimeno diverse infra di loro: le varietà nella specie del cane sòno moltissime; la maggior parte procedono dallo stato di domestichezza, in cui pare che sieno stati in ogni tempo ridotti. L'uomo ha create delle razze in questa specie scegliendo e congiungendo i più grandi o i più piccoli, i più graziosi, o i più defor-

(a) *Nota.* Ho letto in alcune delle nostre Cronache di Francia, che nel tempo di Carlo IX., assai donne della Corte avevano degli adivi in luogo di cagnuolini..

mi, i più pelosi, o i più nudi ec. ma indipendentemente da queste razze prodotte per opera dell' uomo, ci sono nella specie del cane molte varietà, le quali pare, che non dipendano che dal clima. L' alano, il danese, lo spagnuolo, il cane turco, quello di Siberia ec. traggono il loro nome dal clima, di cui sono originarj, e sembrano più differenti infra di loro, che nol sia dall' adive il chachal: potrebbe adunque essere avvenuto, che i chachal sotto climi diversi avessero subite delle varietà diverse, e ciò si accorda ottimamente coi fatti, che abbiamo raccolti. Dagli scritti de' Viaggiatori appare, che ve n' abbia per tutto di grandi, e di piccoli; che nell' Armenia, nella Cilicia, nella Persia, e in tutta la parte dell' Asia, che noi diciamo *il Levante*, ove questa specie è numerosissima, spiacevolissima e nocivolissima, sieno comunemente grandi come le nostre volpi (a), che abbiano solo le gam-

C 2

(a) Il jacard o adive è grande come un cane medio, che somiglia per la coda alla volpe e al lupo pel muso; se ne allevano nelle case, ma il lor naturale è di nascondersi sotterra di giorno, onde non escono, che di notte per cercarsi il pascolo; vanno in truppa, divorano i fanciulli, e fuggono gli uomini, i loro gridi sono lamentevoli, e spesso direbbesi, che sono quelli di molti fanciulli di diverse età misti insieme; i cani gli molestando e li allontanano dal-

be più corte; e che sieno rimarchevoli pel colore del pelo, che è di un giallo vivo e lucente; perciò è, che molti Autori han-

le case. *Voyage de Delon*, page 109. — Trovasi nella Persia una specie di volpe appellata *Schakal*, che gli abitanti nominano comunemente *Tulki*; ve n'ha di molte assai, e della grandezza quasi istessa delle nostre volpi di Europa, il dorso e i lati sono coperti d'una specie di grossa lana con peli lunghi e ruvidi, il ventre bianco come la neve, le orecchie nere come lustrino, la coda più piccola di quella delle nostre volpi; la udiamo di notte girare intorno al villaggio, dove noi siamo, e c'impertunano i suoi gridi lugubri e continui, molto simili a quelli di un uomo, che si lagna. *Voyage d'Ollarius*, p. 531. — L'adive somiglia al lupo per la figura, pel pelo e per la coda, ma è più piccolo, e la statura è minore di quella della volpe; è rarissimo, ma stupido; viaggia di notte e resta il giorno nella sua tana; full' imbrunire altro non odefi per le campagne; questi animali si avvicinano ai Viaggiatori e si fermano a guardarli senza far segno di timore. Corrono nelle Chiese, dove straceiano e divorano quanto lor piace; tutto ciò, che è fatto di cuojo è la loro vivanda favorita. L'adive schiattisce come la volpe, e quando uno grida tutti gli altri gli rispondono; questo istinto di gridare tutti insieme non pare ad essi volontario, ma di pura necessità; tal che se uno di questi animali è entrato in una casa per predare, ed ode i suoi compagni gridare da lontano non può trattenerli dal gridare egli pure, e per tal modo di scoprirli. *Voyage du Père Fr. Vincent-Marie*, chap. XIII., article traduit par M. le marquis de Montmirail. — Si è conservato per dieci mesi un chacal in una casa, dove ho dimorato per

no appellato il chacal *lupo dorato*. Nella Barberia, nelle Indie Orientali, al Capo di buona-Speranza, e nelle altre provincie dell'

qualche tempo: è un animale tanto simile nella grandezza alla volpe e nella figura e nel colore, che la maggior parte dei forestieri si sono ingannati, quando la prima volta ne hanno veduto alcuno; la maggior differenza, che fiavi tra l'uno e l'altro si è nella testa, essendo quella del chacal come di un can di pastore, che avesse il muso lungo, e nel pelo, ch'egli ha ruvido come quello del lupo: il suo colore è molto simile al colore dello stesso, e puzza tanto, che non può eoricarsi in qualche luogo senza infettarlo.... Questo animale è sommamente vorace e ardito.... Non teme di entrare nelle case... Quando s'incontra in un uomo in luogo di fuggire al primo vederlo come le altre bestie, lo rimira fieramente in atto di minacciarlo, quindi prosiegue il suo cammino. E' di un naturale cattivo, e sempre pronto a mordere, qualunque diligenza si usi per ammanarlo con carezze dandogli da mangiare, il che ho potuto notare in quello, di cui ho favellato, ch'è stato ritrovato assai giovane, e che si era piacevolmente allevato come un cane, che si amasse assai: tuttavia non si addomesticò mai perfettamente, non poteva soffrire d'essere toccato da nessuno, mordeva tutti, non si è mai ottenuto, che non saltasse sulla mensa, e non prendesse quanto poteva. Tutta la campagna della Natolia è popolata di questi chacali: si odono tutte le notti a fare uno strepito grandissimo intorno alle città, non latrando come i cani, ma gridando con una certa voce acuta, ch'è loro particolare. *Voyage de Dument. La Haie, 1699., Tom. IV., pag. 29.*

Africa e dell' Asia pare che questa specie abbia sofferta molte varietà : sono essi più grandi in questi paesi più caldi , e il loro pelo è piuttosto di un bruno-fosco , che di un bel giallo , e ve n' ha di colori diversi (a) . La specie del chacal è dunque sparfa per tutta l' Asia , dall' Armenia fino al Malabar (b) , e trovasi pure nell' Arabia , nella

(a) Il jakas , che i sudditi del Re di Comany vicino ad Acra ci hanno recato era grosso come un montone , ma aveva i piedi più alti : il pelo era corto e macchiato , le gambe a proporzione del corpo erano grosse prodigiosamente . . . Avea la testa pure assai grossa , piatta , e larga , e ciascun dente della lunghezza di un dito e più . . . Ai piedi ha degli artigli di una formidabile grossezza . *Voyage de Bosman* , pag. 331.

(b) Ci sono a Bengala dei cani selvatici appellati *Jaquparels* o *Cani criards* , il cui pelo è rosso ; vengono in truppa ogni notte ad abbajare spaventevolmente lungo il Gange ; la loro voce , e i loro gridi sono così diversi e confusi che non si può intendere a parlare ; non fuggono quando i Mori passano vicino ad essi . . . Questi animali sono comuni quasi in tutta l' India . *Voyage d'Innigo de Biervillas* , *première partie* , pag. 178. — Vi è nel Maduré una specie di cane salvatico che si prenderebbe per una volpe ; gl' Indiani l'appellano *Nari* , e i Portoghesi *Adiba* . . . Quando io viaggiava di notte udiva questi animali ululare in ogni ora . *Lettres édifantes* , XII. *recueil* , pag. 98. — Vi è a Guzaratte una specie di cane salvatico , che si appella *Jakals* . *Relation de Mandelslo* , *suite d'Olearius* , Tom. II. , pag. 234. — Si vede un gran numero di jackali

Barberia (a), nella Mauritania, nella Guinea (b) e nelle terre del Capo. Pare che sia stata destinata ad essere sostituita a quella

nel paese del Malabar; ne ho veduto uno nella foresta di Ceylan, sono essi della figura della volpe, singolarmente per la coda sono molto ghiotti della carne umana Sieguono le nostre armate, e disotterrano i nostri morti Noi ascoltiamo sovente di notte i gridi spaventevoli di questi animali, che somigliano assai a quelli de' nostri cani irritati Gridano a varie riprese come se si rispondessero. *Recueil des voyages de la Compagnie des Indes orientales, Tom. VI., pag. 980.* Tutto il paese di Calcut è pur pieno di volpi (chacal) le quali vengono di notte fino alla città, e cacciano come qui fanno i cani, e non si ode altro romore tutte le notti pe' giardini e per le strade. *Voyage de Fr. Pyrard, Tom. I., pag. 427.* — Il schecal è una specie di cane salvatico Ve n'ha una sì gran quantità nei contorni di Surate, che non possiamo intenderci a parlare pel grande strepito, che vi fanno gridando distintamente ova, ova, ova, che si accosta al latrato del cane: questo animale è ghiotto dei corpi morti ve ne ha pure in gran numero nei deserti di Arabia, lungo il Tigre, e l'Eufrate, e nell'Egitto. *Voyage de la Boulaye-le Gouz, pag. 254.*

- (a) Ne' regni di Tunisi, e di Algeri, il deab o jackal è di un colore più scuro della volpe, e quasi della stessa grandezza; schiattisce ogni sera ne' villaggi e nei giardini, e si nutre come il dubbah, di radiche, di frutti; di carogne. *Voyage de Shaw, Tom. I., pag. 320.* Nota. Il dubbah, di cui Shaw fa qui menzione è l'iena.
- (b) Si trova nella Guinea, e più comunemente ancora nel paese d'Acra, e in quello d'Aquamboe,

del lupo (a), il quale manca, o almeno è rarissimo in tutt' i paesi caldi.

Tuttavia, siccome si trovano dei chacal e degli adivi nelle medesime terre, siccome la specie non ha potuto essere spogliata del suo naturale per una lunga domestichezza, e vi

un animale crudelissimo, che i nostri chiamano *Jackals* Vengono di notte fino sotto alle mura del forte, che noi abbiamo ad Acra per rapire dalle stalle i porci, i montoni ec. *Voyage de Bosman*, pag. 249. Vedi lo stesso, pag. 331. e 332. — I cani selvatici del Congo, che si chiamano *Mebbia*, sono nimici mortali di tutti gli altri quadrupedi; non sono molto diversi dai nostri cani corridori, si veggono correre a trenta e quaranta insieme, e talora anche in numero maggiore . . . si avventano ad ogni sorta di animali, e d'ordinario ne fanno preda mercè il loro numero: non assaltano gli uomini. *Voyage du P. Zuchel à Congo & en Esbiopie*, pag. 293., cité par Kolbe. Il cane salvatico del capo di Buona-speranza somiglia a quelli del Congo descritti dal P. Zuchel ec. *Description du cap de Bonne-esperance par Kolbe, Partie III.*, pag. 48. . . Vi è al capo un animale, la cui specie si accosta molto a quella della volpe: Gesner ed altri l'hanno chiamato *Renard croisé*. Gli Europei del capo gli hanno dato il nome di *Jackals*, e gli Otentotti quello di *Zentie* o *Kenlie*. *Id. Partie III.*, pag. 62.

(a) Ho osservato, che non vi sono che pochi lupi nell' Ircania, e nelle altre provincie della Persia, ma che si trova per tutto un animale, il cui grido è spaventevole, che appellano *Chacal*. Esso è ghiotto singolarmente dei cadaveri, che disotterra. *Voyage de Chardin, Tom. II.*, pag. 29.

ha costantemente una differenza considerabile tra questi animali per la grandezza, e parimente pel naturale; noi li riguarderemo come due specie distinte riserbandoci a riunirle quando sarà comprovato, che si frammischiano, e che producono insieme. La nostra presunzione sopra la diversità di queste due specie è tanto meglio fondata, quanto più pare che si accordi coll' opinione degli Antichi. Aristotile dopo di avere parlato chiaramente del lupo, della volpe e dell' iena indica assai oscuramente due altri animali dello stesso genere, l'uno sotto il nome di *Pantera*, l'altro sotto quello di *Thos*: i Traduttori di Aristotele hanno interpretato *panter* per *lupus canarius*, e *thos* per *lupus cervarius*, lupo canario, lupo cerviere; questa interpretazione dinota bastevolmente, che riguardavano il panther e il thos come specie di lupi; ma io ho dimostrato all' articolo della lince, che il *lupus cervarius* dei Latini non è il thos dei Greci: questo *lupus cervarius* è lo stesso del *chaus* di Plinio, lo stesso che la nostra lince o lupo cerviero, nessun carattere del quale conviene al thos. Omero, descrivendo il valore di Ajace, il quale solo si avventa contro una moltitudine di Trojani, in mezzo dei quali Ulisse ferito trovasi imbarazzato, fa il paragone di un leone, che d' improvviso scagliandosi sopra dei rhos affollati intorno a un

cervo ridotto agli estremi li disperde e discaccia come vili animali. Lo Scoliaſte d'Omero interpreta la parola *thos* per quella di panther, ch'egli dic' eſſere una ſpecie di lupo debole e timoroso; pertanto il *thos*, e il panther ſono ſtati preſi per lo ſteſſo animale da alcuni Greci antichi; ma pare, che Ariſtotele li diſtingua ſenz' aſſegnare ad eſſi neppure caratteri e attributi diverſi. „ I „ *thos*, egli dice, hanno tutte le parti interne ſimili (a) a quelle del lupo..... „ ſi congiungono (b) come i cani, e producono due, tre o quattro parti, i quali „ naſcono cogli occhi chiuſi: il *thos* ha il „ corpo e la coda più lunghi della coda e „ del corpo del cane, ma è meno alto; e „ quantunque abbia le gambe più corte, non „ laſcia d'avere altrettanto di velocità, perchè eſſendo agile e deſtro può ſaltar più „ lontano.... Il leone e il *thos* ſono nemici (c), perchè vivendo entrambi di carne ſono coſtretti prendere il loro paſcolo „ nello ſteſſo fondo, e per conſeguenza di „ contraſtarſelo.... I *thos* (d) amano l'uomo, non gli ſi avventano mai, nè lo temono molto; ſi battono coi cani e col

(a) Ariſtotel., *Hiſt. anim. lib. II., cap. XVII.*

(b) *Idem, lib. VI., cap. XXXV.*

(c) Ariſtotel., *Hiſt. anim. lib. IX., cap. I.*

(d) *Idem, lib. IX., cap. XLIV.*

„ Leone, per la qual cosa non si trovano
„ nello stesso luogo che pochissimi leoni e
„ thos. I migliori thos sono i più piccoli;
„ ve n'ha di due specie, alcuni ne fanno tre.“
Ecco quanto dice Aristotele al proposito dei
thos, il quale parla infinitamente meno del
panther; non si trova che un solo tratto nel
medesimo capo 35. del sesto libro della sua
Storia degli animali. „ Il panther, dice,
„ produce quattro parti, hanno gli occhi
„ chiusi come i piccoli lupi di fresco nati.“
Paragonando questi tratti con quello di Ome-
ro, e con quelli degli altri Autori Greci,
mi par quasi certo, che il thos d'Aristotele
sia il chacal grande, e che il panther sia il
piccolo o l'adive; si vede, ch'egli ammette
due specie di thos, ch'egli non parla, che
una volta sola del panther, e per così dire
all'occasione del thos: è dunque probabilis-
simo, che questo panther sia il thos della
piccola specie, e questa probabilità pare, che
diventi certezza pel testimonio d'Oppiano (a),
che ripone il panther nel numero dei pic-
coli animali, come per esempio ghiri e gatti.

Il thos è dunque il chacal, e il panther
è l'adive, e formino essi due specie diverse
o una sola, è certo, che quanto gli antichi
hanno detto del thos e del panther conviene

(a) Oppian. *de Venatione*, lib. II.

al chacal e all' adive, e non può applicarsi agli altri animali; e se fino al presente si è ignorato il vero significato di questi nomi, se sono stati sempre male interpretati, ciò è, perchè i Traduttori non conoscevano gli animali, e perchè i Naturalisti moderni, che poco li conoscevano, non hanno potuto correggerli.

Quantunque la specie del lupo si avvicini assai a quella del cane, quella del chacal non lascia di trovar luogo tra le due; *il chacal o l' adive*, come dice Belon, è una bestia tra il lupo e il cane; congiunta alla ferocia del lupo ha la domestichezza in parte del cane, la sua voce è un ululato misto di gemito e di latrato (a); è più gridatore del

(a) E' d' un bel colore giallo più piccolo del lupo, va sempre in truppa, e abbaja tutte le notti... Vorace e ladro, talchè ruba non solo ciò, eh' è buono da mangiare, ma i cappelli, le scarpe, le briglie dei cavalli, e quanto può rapire. *Observ. de Belon, pag. 163. — Jackal pend annem orientem inhabitat; bestia astuta audax. Et furacissima est... Interdum circa montes latet, noctu pervigil Et vagus est: caterontim praedatum excurrit in rura Et pagos... Ululatum noctu edunt execrabilem ejulatu humano non dissimilem quem interdum vox latrantium quasi canum interstrepit: unique inclamant omnes acclamant, quotquot vocem e longinquo audiunt. Kœmpfer, Ananit. exotic., pag. 413. — Verso il canale del mar Nero vi sono molti fiacalli o cani selvatici non molto dissimili dalle volpi, sopra tutto*

del cane, più vorace del lupo ; non va mai solo , ma sempre in una compagnia di venti, trenta o quaranta ; si radunano ogni giorno per far guerra o caccia ; vivono di piccoli animali , e si fanno temere pel numero dai più forti ; assaltano ogni specie di bestiame o di volatili quasi sotto gli occhi degli uomini ; entrano arditamente e senza far segno di paura negli ovili, nelle stalle, nelle scuderie, e quando non vi trovano altro, si divorano il cuojo de' fornimenti, degli stivali, delle scarpe, e portano via le coreggie, che non hanno tempo di trangugiare. In difetto di preda viva, disotterrano i cadaveri degli animali e degli uomini ; e fa d'uopo calcare la terra sulle sepolture, e frammischiarvi grosse spine per impedir loro a raspare e a scavare, perchè un'altezza di pochi piedi di terra non basta ad arrestarli (a) :

Tom. XXVII. D

pel muso. Credesi, che sieno generati dai lupi e dai cani ; la sera, e talora a notte innoltrata alzano orribili gridi.... Sono assai cattivi e nocivi come i lupi. *Voyage de Corneille le Brun, fol. Paris, 1714, pag. 56.*

- (a) Gli adivi sono avidissimi dei cadaveri, particolarmente degli umani. Quando i Cristiani vanno a seppellirne alcuno alla campagna, fanno una fossa profondissima, la quale nondimeno non basta ad impedire, che non disotterrino i corpi ; perciò usano di pestare coi piedi la terra, che si gitta nella fossa, e di aggiugnervi pietre, e spine, le quali ferendo questi animali gli distol-

travagliano molti insieme, e accompagnano con gridi lugubri questo disotterramento, e quando sono una volta accostumati ai cadaveri umani, non cessano di aggirarsi nei cimiteri, di seguire le armate, di unirsi alle caravane: sono essi in somma i corbi dei quadrupedi: la carne più infetta non gli allontana; il loro appetito è così costante, così veemente, che il cuojo più arido è per lor saporito, e buona egualmente è per essi qualsivoglia pelle, grassia e immondezza animalesca. L'iena pure ha la stessa inclinazione alla carne putrefatta; essa ancora disotterra i cadaveri, ed appunto per questo costume comune a questa e a quelli si sono confusi questi animali, quantunque l'uno dall'altro differentissimi. L'iena è una bestia solitaria, taciturna, selvaticchissima e più forte del chacal, ma non è tanto fastidiosa, e si contenta di divorare i morti senza turbare i vivi, laddove tutti i Viaggiatori si querelano dei gridi, delle rapine e degli eccessi del chacal (a), il quale congiugne

gono dallo scavare più profondamente. Il nome *adive* vuol dire *lupo* in lingua araba; la figura, il pelo, la voracità sono analoghe a questo nome; ma la sua grandezza, la familiarità, la stupidità ne danno una idea differente. *Voyage du P. Fr. Vincent-Marie, chap. XII., article traduit par M. le marquis de Montmirail.*

(a) *Jackalls are in so great plenty ab ut the gar-*

del Chacal e dell' Adive . 51

l'impudenza del cane alla viltà del lupo ,
e partecipando della natura d'entrambi non è ,
che un odioso composto di tutte le cattive
qualità dell' uno e dell' altro ,

*dens , that they pass in numbers like a pack of
lionds in ful cry everi evening , giving not only
disturbance by their noise , but making free with
the poultry and other provisions , if very good
care is not taken to keep them out of their reach .
The Nat. Hist. of alepo by Alex. Russel. London ,
1756. — Vi sono molti chacal ne' contorni del
monte Caucaso ; questo animale non è dissomi-
gliante dalla volpe . Difotterra esso i morti , e
divora gli animali e le carogne . Si sepelliscono
nell' Oriente i morti senza bara , e col loro su-
dario . Ho veduto in molti luoghi sovrapporre
grosse pietre sulle fosse unicamente a cagione di
queste bestie per impedire che non le aprano e di-
vorino i cadaveri . La Mingrelia è coperta di
questi chacal ; assedianno talora le case , e met-
tono urli spaventosi , il peggio si è , che fanno
grande scempio delle gregge e delle razze . *Vo-
yage de Chardin , pag. 76.**



DESCRIZIONE

DEL CHACAL.

Questa descrizione è stata fatta sopra una pelle e sopra uno scheletro di chacal. La pelle aveva due piedi e sette o otto pollici di lunghezza dall'estremità del naso fino all'origine della coda, la cui lunghezza era di sette pollici. Il pelo del disopra e dei lati della testa era mischiato di biancastro, di rossiccio e di nero: il disopra del collo, il garrot, le spalle, il disopra e i lati del corpo e la coda avevano gli stessi colori che la testa, ma il nero vi dominava. I più lunghi peli avevano due pollici di lunghezza, ed eran bianchi verso la radice; eravi del nero al disopra del bianco, e questi due colori si succedevano nuovamente nel restante della lunghezza dei peli; allontanandoli si trovava tra essi una lanugine di color bruno ch'era morbida e folta. I lati del collo e 'l basso dei lati del corpo, il petto e la faccia esterna delle gambe erano di color fulvo più o men carico: eravi una macchia nera sul basso della faccia esterna dell'avan-braccio. Il labbro superiore, il labbro e la mascella inferiori, il disotto del collo, il ventre e la faccia interna delle gambe eran bianchi o biancastri. I crini dei mustacchi eran neri, e avevano fino a tre pollici di lunghezza.

Descrizione del Chacal . 53

Gli ossi della testa del chacal rassomigliano interamente a quelli della testa della volpe, eccettuato l'osso frontale, la cui parte media posteriore era più convessa nello scheletro del chacal, che ha servito di soggetto per questa descrizione.

I denti di questi due animali si rassomigliano pure pel numero, per la forma e per la situazione.

Nello scheletro del chacal vi sono altrettante vertebre e coste, quante in quello della volpe, del cane e del lupo. Tutti questi scheletri hanno lo stesso numero d'ossi nello sterno. Le articolazioni delle coste si trovano negli stessi siti. Gli ossi del catino e delle quattro gambe sono parimente nello stesso numero ed hanno la stessa figura. Nella coda non eranvi che sedici vertebre, ma mi è paruto che nello scheletro, di cui si parla, ne mantenessero alcune: così vi ha luogo a credere che il chacal ne possa aver diciannove come la volpe, e ch'esso rassomigli altrettanto a quest'animale per lo scheletro intero, che per gli ossi della testa, che distinguono principalmente la volpe dal lupo e dalla maggior parte dei cani. Il chacal però è molto più grande della nostra volpe, come si può vedere dalle misure riferite nella tavola seguente, paragonandole con quelle degli ossi della volpe, che si trovano nel Tomo XIV. di quest'Opera, *pagina 104. e seguenti.*

ped. poll. lin.

Lunghezza della testa dall'estremità

delle mascelle fino all'occipite — o. 6. o.

pied. poll. lirr.

La maggior larghezza della testa —	o.	3.	1 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della mascella inferiore: dalla sua estremità anteriore fino all' estremità posteriore dell' apofisi condiloidea —	o.	4.	4.
Larghezza della mascella inferiore al fito dei denti canini —	o.	o.	8 $\frac{1}{2}$
Larghezza della mascella superiore al fito dei denti canini —	o.	1.	o. $\frac{1}{2}$
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —	o.	1.	9.
Lunghezza della detta apertura —	o.	o.	10.
Larghezza —	o.	o.	7.
Lunghezza degli ossi proprj del naso	o.	2.	2.
Larghezza delle orbite —	o.	1.	1.
Altezza —	o.	1.	o.
Lunghezza dei denti canini —	o.	o.	8.
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra del collo —	o.	o.	4 $\frac{1}{3}$
Larghezza —	o.	1.	6 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della settima costa, ch' è la più lunga —	o.	5.	o.
Lunghezza dello sterno —	o.	7.	3.
Lunghezza del corpo delle più lun- ghe vertebre lombari —	o.	o.	9 $\frac{1}{2}$
Lunghezza delle più lunghe false ver- tebre della coda —	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Larghezza della parte superiore dell' osso dell' anca —	o.	1.	5.

Altezza dell' osso dal mezzo della cavità cotiloidea fino al mezzo del lato superiore	o.	2.	7 $\frac{1}{2}$
Larghezza del catino	o.	1.	6.
Altezza	o.	1.	10.
Lunghezza dell' omoplata	o.	3.	11.
Lunghezza dell' umero	o.	4.	11.
Lunghezza dell' osso dell' ulna	o.	5.	6.
Altezza dell' olecranio	o.	0.	9.
Lunghezza dell' osso del radio	o.	4.	7 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del femore	o.	5.	4.
Lunghezza della tibia	o.	5.	4.
Lunghezza del peroneo	o.	6.	0 $\frac{1}{2}$
Altezza del carpo	o.	0.	5.
Lunghezza del calcagno	o.	1.	3.
Altezza del prim' osso cuneiforme e dello scafoide presi insieme	o.	0.	5.
Lunghezza del prim' osso del metacarpo	o.	0.	8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del terzo e del quarto	o.	2.	0.
Lunghezza del primo e del quart' osso del metatarso	o.	2.	0.
Lunghezza del secondo e del terzo	o.	2.	3.
Lunghezza della prima falange del pollice	o.	0.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del terzo e del quarto dito dei piedi anteriori	o.	0.	9.
Lunghezza della seconda falange del			

56 *Descrizione del Chacal.*

	<i>pied. poll. lin.</i>		
pollice —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda falange del terzo e del quarto dito —————	o.	o.	6.
Lunghezza della terza falange ———	o.	o.	7.
Lunghezza della prima falange del secondo e del terzo dito dei piedi di dietro —————	o.	o.	9.
Lunghezza della seconda falange —	o.	o.	7.
Lunghezza della terza falange ———	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$



L' I S A T I S (a).

SE il numero delle somiglianze in generale, se la perfetta conformità delle parti interiori bastassero per accertare l'unità delle specie, il lupo, la volpe, e il cane non ne formerebbero, che una sola, perchè il numero delle somiglianze è assai maggiore di quello delle differenze, e la somiglianza delle parti interne è compiuta; nondimeno questi tre animali formano tre specie non solamente distinte, ma ancora distanti bastevolmente ad ammettere altre specie infra di loro; e siccome quella del chacal è intermedia fra il cane, e il lupo, la specie dell' isatis è parimente posta tra la volpe e il cane.

Tom. XXVII.

E

(a) *Isatis*, nome che M. Gmelin ha dato a questo animale, e che noi abbiamo adottato. Jonston indica pure questo nome. *De quad. digit.* pag. 135. *Peszi*, in lingua Russa, secondo Gmelin, *Tom. III.* pag. 215.

Vulpes alba *Vulpes crucigera*. Aldrov. *de quad. digit.* pag. 221. & suiv. fig. *ibid.*

Canis hieme alba, æstate ex cinereo cærulescens

Vulpes alba, le Renard blanc Briss. *Regn. anim.* pag. 241.

Lagopus. *Canis caudà rectà, apice concolore*. *Syst.*

Nat. 5. *Vulpes alba*. *Kalm. Bahus*, 236.

Vulpes cærulescens. *Faun. Suec.* 14. ... *habitat in alpebus Lapponicis, Sibiria* *pedes densissime pilosi ut in lepore*. *Linn. Syst. Nat.* edit. X. p. 40.

Fino al presente non si è considerato questo animale, che come una varietà nella specie della volpe; ma la descrizione, che ne ha fatta il Sig. Gmelin (a), e di cui qui daremo un estratto, non lascia più dubitare, che non siano due specie differenti.

L'isatis (di cui diamo qui le misure così del maschio, che della femmina) è comunissimo in tutti i paesi del nord vicino all

(a) *Novi Comment. Acad. Petrop. Tom. V. ad annos 1754. & 1755. Petropoli, 1760.*

M I S U R E DELL' ISATIS.	L'ISATIS Maschio.	L'ISATIS Femmina.
	pied. pol. lin.	pied. pol. lin.
Dall'estremità del muso all' origine della coda —	L. 10. 0 $\frac{1}{10}$	L. 10. 0.
Lunghezza della coda —	I. 0. 0 $\frac{7}{10}$	0. 11. 0.
Lunghezza delle orecchie	0. 2. 0.	0. 2. 0.
Larghezza delle orecchie alla base —	0. 1. 0 $\frac{1}{10}$	0. 1. 0 $\frac{6}{10}$
Distanza delle orecchie fra di loro —	0. 2. 0 $\frac{1}{2}$	0. 2. 0 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del braccio —	0. 4. 0 $\frac{1}{2}$	0. 3. 0 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell'avem-brac- cio —	0. 4. 0 $\frac{1}{2}$	0. 3. 0 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del carpo., del metacarpo. e delle dita —	0. 3. 0 $\frac{4}{1}$	0. 3. 0 $\frac{3}{2}$

M I S U R E DELL' <i>ISATIS</i> .	L' <i>ISATIS</i>	
	<i>Maschio</i> .	<i>Femmina</i> .
	<i>pieđ. poll. lin.</i>	<i>pieđ. poll. lin.</i>
Lunghezza delle unghie ai piedi anteriori ———	o. o. o $\frac{4}{5}$	o. o. o $\frac{4}{5}$
Lunghezza delle cosce qui quasi ———	o. 5. o	o. 4. o $\frac{5}{2}$
Lunghezza delle gambe qui quasi ———	o. 5. o	o. 4. o $\frac{5}{2}$
Lunghezza dei piedi di die- tro ———	o. 4. o $\frac{1}{2}$	o. 4. o $\frac{5}{6}$
Lunghezza delle unghie dei piedi di dietro ———	o. o. o $\frac{4}{5}$	o. 4. o $\frac{4}{5}$

mare agghiacciato, e appena se ne trova di qua dal sessantanovesimo grado di latitudine: è tutto simile alla volpe per la forma del corpo e per la lunghezza della coda, ma per la testa somiglia più al cane; ha il pelo più morbido di quello della volpe comune, e il suo pelame è bianco in un tempo, e turchino-cenericcio in altri. La testa è corta a proporzione del corpo: è larga vicino al collo, e termina in un muso molto acuto; le orecchie sono quasi rotonde: ha cinque dita e cinque unghie ai piedi anteriori, e solo quattro dita, e quattro unghie ai piedi posteriori; nel maschio la verga è appena grossa come una penna da scrivere, i testicoli sono grossi come mandorle, e tanto na-

scoffi nel pelo, che appena si possono scoprire; i peli, onde tutto il corpo è coperto, sono lunghi circa due pollici, sono lisci, folti e morbidi come la lana; le nari e la mascella inferiore sono sforniti di pelo, la pelle è apparente, nera e nuda in queste parti.

Lo stomaco, gl'intestini, le viscere, i vasi spermatici così del maschio che della femmina sono simili a quelli del cane, vi è un osso nella verga, e lo scheletro intero somiglia a quello di una volpe.

La voce dell' isatis partecipa del latrato del cane e del mugolio della volpe. I mercatanti, che fanno commercio di pellicce, distinguono due sorte d' isatis, gli uni bianchi e gli altri turchini cenericci; questi sono i più pregiati, e più che sono turchini o bruni, sono di maggior prezzo. Questa differenza nel colore del pelo non fa che sieno di specie diverse: cacciatori periti hanno assicurato al Sig. Gmelin, che nello stesso parto vi sono dei piccoli isatis bianchi ed altri cenericci; pertanto l'uno non è che una varietà dell' altro.

Il clima dell' isatis è il nord, e le terre che preferiscono d'abitare sono quelle delle rive del mare gelato e dei fiumi ch'entrano in esso; amano i luoghi aperti e non dimorano nei boschi; se ne trovano nelle parti più fredde, nelle più montuose e più nude

della Norvegia, della Lapponia, della Siberia, e parimente nell' Islanda (a). Questi animali si congiungono al mese di Marzo; ed avendo le parti della generazione disposte come i cani, non si possono separare nel tempo della congiunzione; dura il lor calore quindici giorni o tre settimane; in tal tempo stanno sempre all' aperto, ma dopo si ritirano nelle loro tane che essi medesimi si sono scavate. Queste tane, le quali sono anguste e profonde, hanno molte uscite; le tengono nette, vi portano del muschio per istarvi più agiati; portano come le cagne circa nove settimane; le femmine partoriscono alla fine di Maggio o al principio di Giugno, e producono d' ordinario sei, sette o otto parti (b). Gl' *isatis* che poi divengono bianchi sono giallicci appena nati, e que' che diventano turchini-cenericci sono alquanto

E 3

(a) Verosimilmente viaggiando sui banchi di ghiaccio sonosi introdotte le volpi nella Islanda; se ne trovano moltissime in quest' isola; esse non sono rosicce; ve n' ha poche nere, e comunemente sono bigie, o azzuricce nell' estate, e bianche nell' inverno; in quest' ultima stagione la loro pelliccia è migliore. *Hist. Nat. de l'Islande*, par *Anderson*, Tom. I. pag. 56.

(b) Nota. Il Sig. Gmelin dice, dopo il testimonio de' Viaggiatori, che questi animali producono tal volta venti o venticinque parti in un sol portato. Io credo questo fatto dubbiosissimo, e il numero molto esagerato.

neri, e il pelo allora è cortissimo; la madre gli allatta, e li serba nella tana per cinque o sei settimane, passate le quali li fa uscire e reca ad essi da mangiare. Al mese di Settembre il loro pelo ha già un mezzo pollice di lunghezza; gl' isatis, che debbono diventar bianchi, lo sono già in tutto il corpo fuor che in una fascia longitudinale sul dorso, e in un'altra trasversale sopra le spalle, le quali sono brune, ed è allora, che l' isatis si chiama *volpe crocifera* (a), ma questa croce bruna scompare prima dell' inverno, ed allora si fanno del tutto bianchi, e il loro pelo è lungo più di due pollici; verso il mese di Maggio incomincia a cadere, e la muda termina del tutto nel mese di Luglio, però la pelliccia non è buona che all' inverno.

L' isatis vive di ratti, di lepri e di uccelli, esso è scaltro come la volpe per coglierli; si tuffa nell' acqua, attraversa i laghi per cercare i nidi delle anitre e delle oche, ne mangia le uova e i pulcini, e non ha per nemico in que' climi deserti e freddi, se non se il ghiottone, che lo insidia e lo attende al varco.

(a) Nota. Questo indizio pare bastevolmente preciso per credere, che la *Vulpes crucigera* di Gesner. *Icon. Quad. fig. pag. 190.*; & de Rzaczinski. *Hist. Nat. Pol. pag. 231.*, sia lo stesso animale che l' isatis.

Siccome il lupo , la volpe , il ghiottone e gli altri animali , che abitano le parti del nord dell' Europa e dell' Asia , sono passati dall' uno all' altro continente , e si trovano tutti nell' America , l' isatis vi dee pur essere , ed io presumo , che la volpe bigia-inargentata dell' America settentrionale , di cui Catesby (a) ha data la figura , sia per avventura l' isatis anzi che una semplice varietà della specie della volpe .

(a) Hist. Nat. de la Caroline par Catesby , Tom. II.
fig. pag. 78.



IL GHIOTTONONE (a).

IL Ghiottonone, grosso di corpo e basso di gambe è quasi della forma stessa del tasso, ma è il doppio più grande e più grosso: ha la testa corta, gli occhi piccoli, i denti for-

(a) Ghiottonone, nome, che è stato dato a questo animale a cagione della sua insaziabile voracità. *Jerff*, in Isvezzese; *Wilfrass*, in Tedesco; *Rosomack*, in Ischiavone; *Glutton*, in Inglese; *Carcajou*, nel Canada; *Quincajou*, in altri siti dell' America settentrionale.

Inter omnia animalia quæ immuni voracitate creduntur insatiabilia, gulo, in partibus Sueciæ septentrionalis præcipuum suscepit nomen ubi patrio sermone, jerff, dicitur & lingua Germanicâ, wilfrass; Sclavonice, rosomaka à multâ commestione; Latine vero nonnisi scititio nomine gulo, videlicet à gulositate appellatur. Olai, Magn. Hist. de Gent. sept. p. 138.

Gulo à voracitate insatiabili, the Glutton. Charleton, Onom. pag. 15.

Gulo. Gulon. Apollon. Megabeni. Hist. Gulonis. Viennæ Austriæ, 1681.

Rosomaka. Enfeb. Nieremb. Hist. Nat. Peregrin. pag. 188.

Rosomaka. Gulo. Rzaczinski, Hist. Nat. Pol. pag. 339. Gulo, Olai Magni. Crocuta, Maji. Boophagus, German. Wiel-frass. Polonice, Rosomak. Id. anch. pag. 311.

Gulo Wielfrass. , Boophagus, Magnus vorator, Rosomacka. Klein, de quad. pag. 83. fig. tab. 5.

Gulo. Mustela plantis fissis corpore rufo-fusco, medio dorfi nigro. Linn. Syst. nat. edit. X. pag. 45.

tiſſimi , il corpo membruto , la coda corta anzi che lunga e molto peloſa nell'eſtremità : è nero ſul dorſo , e roſſo-ſcuro ſu i fianchi ; la ſua pelliccia è delle più belle e più cercate ; ſi trova aſſai comunemente nella Lapponia e in tutti i luoghi vicini al mare del nord coſì in Europa , come in Aſia ; ſi trova ſotto il nome di *Carcajou* nel Canada e nelle altre parti dell' America più ſetentrionale ; vi è poi ogni apparenza , che l'animale della baja d'Huſon , che il Sig. Edwards ha pubblicato (a) ſotto il nome di *Quick-Hatch* o *Wolverenne*, piccolo orſo o lupicci-
no , ſecondo il ſuo Traduttore , ſia lo ſteſſo che il carcajou del Canada , lo ſteſſo , che il ghiottone del nord dell' Europa ; mi pare altresì , che l'animale indicato da Fernandes ſotto il nome di *Tepeytzcuitli* o *Cane di montagna* , poſſa eſſere il ghiottone , la cui ſpecie ſi è ſparſa per avventura nelle montagne deſerte della nuova Spagna (b).

Olao magno è a mio parere il primo , che ha fatta menzione di queſto animale ; egli

E 5

(a) Edwards , *Hiſt. of Birds* , p. 103. fig. *ibid.*

(b) *Animal eſt parvi canis magnitudine audaciſſimum-
que ; aggreditur enim cervos & quandoque etiam
interficiť , corpus univerſum nigrum : pećtus ac
collum candens , pili longi & cauda longa & ca-
ninum quoque caput , unde nomen . Fernandes ,
Hiſt. anim. nov. Hiſp. pag. 7. cap. 21.*

dice (a) che è della grossezza di un grande cane, che ha le orecchie e il muso da gatto, i piedi e le unghie fortissime, il pelo scuro, lungo e folto, la coda pelosa come quella della volpe, ma più corta. Secondo Scheffer (b) il ghiottone ha la testa rotonda, i denti forti e acuti simili a quelli del lupo, il pelo nero, il corpo largo e i piedi corti come quelli della lontra. La Hontan (c), che ha parlato il primo del carcajou dell' America settentrionale dice: „ figuratevi un „ doppio tasso; esso è l'immaginè più vera, „ che io posso suggerirvi di questo animale“. Secondo Sarazin (d), il quale probabilmente non ne avea veduti, che de' piccoli, i carcajous hanno poco più di due piedi di lunghezza di corpo, e otto pollici di coda; „ hanno essi, egli dice, la testa molto corta „ e molto grossa, gli occhi piccoli, le mascelle fortissime e munite di trentadue denti „ assai taglienti. “ L'orsatto o lupiccino di Edwards (e), che mi sembra lo stesso animale, era, dice questo Autore, grosso come

(a) *Olaï Magni, de Gent. septent. p. 138. & seq.*

(b) *Histoire de Lapponie, par J. Scheffer, Paris, 1678. pag. 314.*

(c) *Voyage de la Hontan, Tom. I., pag. 96.*

(d) *Histoire de l'Académie des Sciences, année 1713., pag. 14.*

(e) *Histoire des Oiseaux, per Edwards, pag. 103.*

una volpe ; avea il dorso arcato , la testa bassa , le gambe corte , il ventre quasi strisciante per terra , la coda di una mediocre lunghezza e pelosa verso l'estremità . Tutti dicono concordemente , che non si trova questo animale , che nelle parti più settentrionali dell' Europa , dell' Asia e dell' America ; il Sig. Gmelin (a) è il solo , che sembri assicurare , che viaggia fino nei paesi caldi ; ma questo fatto mi è incertissimo , per non dir falso ; Gmelin , siccome alcuni altri Naturalisti (b) ha forse confusa l' iena del mezzodì col ghiottone del nord , che in fatti si rassomigliano nelle abitudini naturali , e sopra tutto nella voracità , ma che per tutti gli altri riguardi sono animali differentissimi .

Il ghiottone non ha le gambe fatte per correre ; può appena camminare a passo lento , ma l' astutezza supplisce al difetto della velocità ; aspetta gli animali al varco ; sale sugli alberi per gittarsi sopra di loro , e assaltarli con vantaggio ; si avventa agli alci

E 6

(a) Il ghiottone è il solo , di cui si possa dire , come dell' uomo , che vive egualmente sotto la Linea , che sotto al Polo . Si vede per tutto , va dal Mezzodì al Nord , e dal Nord al Mezzodì , purchè trovi da mangiare . *Voyage de Gmelin* , Tom. III. , pag. 492. & *suiv.*

(b) Briss. *Regn. anim.* , pag. 235. e 236.

e ai renni, scalfisce ad essi il corpo, e vi si attacca così tenacemente cogli artigli e coi denti, che non è possibile distaccarnelo; questi poveri animali in vano corrono a precipizio; in vano si fregano contro gli alberi, e fanno i maggiori sforzi per liberarsi: l'inimico affiso ad essi in groppa o in collo, prosegue a succhiare il sangue, ad impiagargli e divorargli a poco a poco colla stessa energia e avidità finchè gli ha uccisi (a); è cosa, diceasi, impercettibile come possa per tanto tempo proseguire il ghiottone a mangiare e divorar tanta carne in una volta.

Ciò che i Viaggiatori ne riferiscono è forse esagerato; ma decimando i loro scritti ne

(a) Il ghiottone è un animale carnivoro, un po' men grande del lupo; ha il pelo ruvido, lungo, e di un bruno che si accosta al nero, massimamente sul dorso; ha l'astuzia di rampicarsi su un albero per insidiare le selvaggine; e quando qualche animale passa, gli salta sul dorso, e fa così bene attaccarcisi cogli artigli, che gliene mangia parte, e il povero animale dopo molti sforzi inutili per liberarsi da un nimico così molesto, cade al fine in terra, e resta preda di lui. Sono necessarj almeno tre levrieri de' più forti per assalir questa bestia, nè senza grande stento ne restano vincitori. I Russi tengono in molto pregio la pelle del ghiottone, ne fanno d'ordinario dei manichotti per gli uomini e degli orli di berette. *Relation de la grande Tartarie*, Amsterdam, 1737., pag. 8.

rimane tuttavia tanto (a) da essere convinto, che il ghiottone è affai più vorace di qualunque de' nostri animali rapaci, pertanto si è chiamato l'*Avoltojo de' quadrupedi*, più insaziabile, più rapace del lupo; distruggerebbe esso tutti gli altri animali se ne avesse pari l'agilità; ma è costretto strascinarsi tardamente, e il solo animale, ch'egli può prendere al corso, è il castoro, riguardo a cui ottiene molto agevolmente il suo fine, e di cui assalta talora le capanne per divorar lui co' suoi parti, quando non possono prontamente gittarsi all'acqua (b) perchè il

(a) *Hoc animal voracissimum est, reperto namque cadavere tantum vorat ut violento cibo, corpus instar tympani extendatur; inventaque angustia inter arbores se stringit ut violentius egerat: sicque extenuatum revertitur ad cadaver & ad summum usque repletur, iterumque se stringit angustia priore, &c.* Olai Magni, *Hist. de Gent. sept.*, pag. 138.

(b) Il Carcajou, quantunque piccolo, è fortissimo e furiosissimo; e quantunque carnivoro, è così lento e pesante, che si strascina sulla neve, anzichè camminare. Non può raggiugnere camminando che il castoro, il quale è lento al pari di lui, e ciò può ottenere l'Estate, quando il castoro è fuori della sua capanna, ma d'Inverno non può che rompere e demolire la capanna stessa, e prendervi il castoro, il che non gli riesce che affai di raro, perchè il castoro ha il suo asilo sicuro sotto al ghiaccio. *Histoire de l'Académie royale des Sciences, année 1713.*, pag. 14.

castoro lo supera al nuoto ; e il ghiottone che vede fuggirsi la preda si avventa ai pesci ; e in difetto di carne viva , cerca i cadaveri , li disotterra , gli sbrana e li divora fino all' ossa.

Quantunque questo animale sia scaltro ed usi delle astuzie con riflessione per far preda degli altri animali, pare , che non abbia senso distinto per la sua conservazione , e neppure l'ordinario e comune per la sua salute ; si accosta egli stesso all' uomo o se lo lascia avvicinare (a) senza dimostrare timo-

(a) Gli Operaj scopersero di lontano un animale che camminava verso di loro a passi tardi e lenti , che alcuni credettero un orso , e altri un ghiottone ; s'innoltrarono verso di questo animale , che conobbero alla fine per un ghiottone , e dopo di averlo percosso con un bastone lo presero ancor vivo ; e tosto mi fu recato . . . Dopo le relazioni che i Cacciatori della Siberia mi avevano fatte dopo parecchi anni sulla destrezza di questo animale sia per aggirare gli altri animali , e supplire coll' astuzia al difetto della leggerezza , sia per evitare le insidie degli uomini , io rimasi forpreso al vedere venirci incontro deliberatamente questo animale a procacciarsi la morte. Isbrandides lo chiama un animale cattivo , e che non vive che di rapina ; „ ha il costume , egli dice , di starsi tranquillo „ su gli alberi , e di nascondersi come la lince „ finchè passi un cervo , un alce , un capriuolo , „ una lepre ec. ed allora si slancia come una „ saetta sull' animale , gli ficca i denti nel cor- „ po , e lo rode insin che spira , dopo di che

re ; questa indifferenza che pare un segno d'imbecillità procede per avventura da una diversissima cagione ; egli è certo , che il ghiottone non è stupido, poichè trova i mezzi

„ lo divora con agio , e ne inghiottisce per fino
„ il pelo e la pelle . Un Waiveda che conser-
„ vava presso di se un ghiottone per suo sol-
„ lazzo , lo fece un giorno gittare nell' acqua ,
„ e spinse contro di lui una coppia di cani ;
„ ma il ghiottone si scagliò tostamente sulla testa
„ di uno di essi , e lo tenne sott' acqua , finchè
„ ne fu soffocato “ . . . L' astuzia , onde il ghiot-
„ tone sorprende gli animali (prosiegue M. Gmelin) è confermata da tutt' i Cacciatori
quantunque si pascoli d' ogni animale vivo e mor-
to , antipone il renne Spia i grossi animali
come un ladro di strada , o li sorprende quando
dormono nel covile va in cerca di tutte le
reti , che distendono i Cacciatori per prendere
le diverse specie di animali , ed egli non si la-
scia cogliere I Cacciatori delle volpi tur-
chine e bianche (isatis) , le quali dimorano nelle
vicinanze del mare agghiacciato si querelano del
torto , che fa ad essi il ghiottone . . . Così chia-
masi con ragione , perchè è incredibile quanto
possa mangiare , io non ho mai udito dire , quan-
tunque lo abbia più volte dimandato a' Caccia-
tori di professione , che questo animale si com-
prima fra due piante per votare il corpo , onde
poter soddisfare di nuovo , e più prontamente
alla sua insaziabile voracità . Ciò sembrami una
favola di un Naturalista , o la finzione di un
Pittore . *Voyage de Gmelin* , Tom. III. , pag. 492.
Nota . Olao ha scritto il primo questa favola ,
ed un Delineatore ne ha da Gesner ricopiata la
figura .

da soddisfare al suo appetito sempre vivo e più che smoderato ; non è nè meno mancante di coraggio , poichè assale indifferente ogni animale , in cui s'incontra , e perchè in vista dell' uomo non fugge , nè mostra timore ; se dunque manca d'attenzione per se medesimo , non è per indifferenza sulla sua conservazione , è solo abitudine di sicurezza : siccome egli abita un paese quasi deserto , e di raro incontra uomini , e non conosce altri nemici ; dacchè ogni volta che si è cimentato cogli animali , n'è rimasto vincitore ; così cammina con fiducia , e non ha il seme del timore , che suppone qualche prova infelice e qualche esperienza della sua debolezza ; si vede per esempio nel leone , che non fugge dall' uomo , salvo che non abbia provata la forza delle sue armi ; e il ghiottone strascinandosi sulla neve nel suo clima deserto , non lascia di aggirarsi con perfetta sicurezza , e di regnarvi da liono non tanto per la sua forza , quanto per la debolezza di quelli che lo circondano .

L'isatis meno forte , ma assai più leggiere del ghiottone , gli serve di provveditore , questo lo siegue alla caccia , e spesso gl'involta la preda , prima che l'abbia sbranata , almeno la divide , perchè al momento , che il ghiottone arriva , l'isatis per non essere egli medesimo divorato , abbandona ciò , che gli rimane da mangiare ; questi due animali

si scavano del pari delle tane; ma gli altri loro costumi sono diversi, l'isatis va spesso in truppa, e il ghiottone solo, se non se qualche volta colla femmina; si trova d'ordinario insieme nelle loro tane. I cani (a) anche più animosi temono di accostarlegli e di azzuffarsi con lui; si difende egli co' piedi e co' denti, ed apre loro mortali ferite, ma siccome non può sottrarsi colla fuga, gli uomini agevolmente ne fanno preda.

La carne del ghiottone (b), siccome quella di tutti gli animali voraci è cattivissima da mangiare, non si cerca che per averne la pelle, che è un' eccellente (c) e magni-

(a) *Vix conceditur ut a canibus apprehendatur, cum ungulas, dentesque adeò acutos habeat, ut ejus congressum formident canes qui in ferocissimos lupos vires suas extendere solent. Olai Magni, Hist. de Gent. sept., pag. 139.*

(b) *Curo hujus animalis omnino inutilis est ad humanam escam, sed pellis multum commoda ac pretiosa. Candet enim fuscata nigredine instar panni damasceni diversis ornata figuris atque pulchrior in aspectu redditur quo artificum diligentia & industria colorum conformitate in quorumque vestium genere fuerit coadunata. Olai Magni, Hist. de Gent. sept., pag. 139.*

(c) Si dice, che il ghiottone è un animale particolare al paese del Nord... E' di un colore nericcio; ha i peli come la volpe per la lunghezza e spessezza, ma più fini e più morbidi, per cui le pelli sono più ricercate, e molto care anche nella Svezia. *Articolo estratto, e tradotto. Appollon. Megabeni, Historia Gulonis, Viennæ Austriae, 1681.*

fica pelliccia; altra non pregiassi più di questa se non se quella del gibellino e della volpe nera, e si pretende, che quando è scelta bene e ben preparata, sia più lucida d'ogni altra, e che sul fondo di un bel nero si rifletta la luce e brilli partitamente come sopra una stoffa damascata (a).

(a) I ghiottoni sono molto comuni nella Lapponia.... La pelle è estremamente nera, il cui pelo sfavilla d'un certo bianco lucido come il raso o dommasco fiorato. Alcuni la paragonano alla pelle delle martore zibelline, fuor che queste hanno il pelo più morbido e più delicato. Questa bestia non dimora solo in terra, ma altresì sotto acqua come le lontre.... ma il ghiottone è molto grande e più vorace della lontre... Non insegue solo le bestie salvatiche, ma ancora le domestiche, e i pesci. *Histoire de la Lapponie, par Scheffer, pag 314.*



LE MUFFETTE.

NOi diamo il nome generico di *Muffetta* a tre o quattro specie d'animali, che contengono ed etalano quando sono molestati, un odore così acuto e così cattivo, che toglie il respiro come il vapore sotterraneo, che si appella *muffetta*. Quegli animali si trovano in tutta la estensione dell'America (a) meridionale e temperata; sono stati indistintamente indicati dai Viaggiatori coi nomi di *puzzolenti*, *bestie puzzolenti*, *figli del diavolo*, ec. (b) e non solamente

(a) Nelle terre vicine allo stretto Magellánico, vedemmo un altro animale a cui abbiamo dato il nome di *Garritore*, o *Fischiatore*, perchè al vedere alcuno, egli garrisce, fischia, e scava la terra co' piè dinanzi, quantunque altro non abbia per sua difesa che l'ano, che volge tosto contro chi gli si accosta, e mette escrementi di un odore il più abborrimevole che sia mai. *Voyage du capitaine Wood. Suite des voyages de Dampier*, Tom. I., pag. 181. — Vi sono nel Perù molte piccole volpi, fra le quali sono rimarchevoli alcune, che spargono un insopportabile odore; entrano le notti nelle città, e quantunque sieno chiuse le finestre si sentono lontano più di cento passi; per forte il numero è piccolo, altrimenti infetterebbero tutto il mondo. *Histoire des Incas*, Tom. II., pag. 269.

(b) Una sorta di faina denominata *figlia del diavolo* o *bestia puzzolente*, perchè l'orina che de-

sono stati confusi fra di loro, ma con altri, che sono di specie lontanissime. Hernandez(a) ha indicati assai chiaramente tre di questi animali; chiama il primo *Ysquepatl*, nome Messicano, che gli conserveremmo, se fosse più facile a pronunziarlo; esso fa la descrizione della figura di lui, ed è lo stesso animale, la cui figura si trova nell' opera di Seba (b); noi lo denominaremo *Ceaso* dal nome *Squash*, che ha nella nuova Spagna (c).

pone quando è inseguita, infetta l'aria a un mezzo quarto di lega tutto all'intorno; altronde è un graziosissimo animale; è della grandezza di un piccolo gatto, ma più grosso, d'un pelo lucido che partecipa del bigio con due linee bianche, che gli formano sul dorso una figura ovale dal collo fino alla coda; questa è pelosa come quella della volpe, e l'arizza come fa lo scojattolo. *Histoire de la nouvelle France*, par le P. Charlevoix, Tom. III., pag. 333. Nota. Questo animale è lo stesso che quello, che noi qui appelleremo *Conepata* dal nome che ha nel Messico.

(a) *Ysquepatl seu Vulpecula quæ Maizium torrefactum æmulatur colore. Genus primum . . . sunt & alia duo hujus vulveculæ genera eadem formâ & naturâ quorum alterum Ysquepatl etiam vocatum fasciis multis candentibus distinguitur, alterum vero Conepati seu vulpecula puerilis unicâ tantum utrinque ductâ perque caudam ipsam eodem modo delatâ. Hernand. Hist. Mex., pag. 332., fig. ibid.*

(b) Seba, Vol. I., pag. 68. Tab. 42., fig. 1.

(c) Lo Squashe è un animale di quattro piedi più

Il secondo di questi animali, che Hernandes nomina pure *Ysqwiepatl* è quello, che è qui rappresentato, e che noi chiameremo *Chincho* dal nome, che ha nell' America meridionale. Il terzo che Hernandes nomina *Corepatl*, ed al quale conserveremo tal nome, è lo stesso che è stato pubblicato per Catesbi (a) sotto la denominazione di *puzzola d'America*, e per il Sig. Brisson sotto quella di *puzzola vergata* (b). Finalmente conosciamo ancora una quarta specie di muffetta, a cui daremo il nome di *Zorillo*, che ha nel Perù e in alcune altre parti delle Indie Spagnuole.

grosso di un gatto, la testa rassomiglia a quella di una volpe, ha le orecchie corte, e gli artigli acuti, che gli servono a salire sugli alberi come un gatto: ha la pelle rivestita di un pelo corto, fino, e gialliccio, la carne è buonissima, e salubre assai. *Voyage de Dampier, Tom. III., pag. 302.*

(a) *Histoire naturelle de la Caroline par Catesbi. Londres, 1743., Tom. II., pag. 62., fig. ibid.* Ecco la descrizione che ne fa l'Autore. „ Questo „ animale pel taglio non è molto diverso dalla „ puzzola comune, fuori che il naso è un „ po' più lungo; tutti quegli, che ho veduti „ erano neri e bianchi, quantunque non fossero „ segnati alla stessa maniera, questo aveva una „ riga bianca, che si stendeva dal di dietro della „ testa largo il mezzo del dorso fino al groppone „ con quattro altre righe in ogni lato, ch' erano „ parallele alla prima“.

(b) *Mustela nigra, tenebris in dorso albis, Putorius striatus.* Le putois rayé - Briss. *Regn. anim.* pag. 250.

Al Sig. Aubry, Curato di S. Luigi, siamo debitori della cognizione di due di questi animali; il suo genio e i suoi lumi nella Storia naturale, si manifestano nel suo Gabinetto, che è uno de' più scelti della città di Parigi; egli ci ha comunicate le sue raccolte qualunque volta ce n'è venuto il bisogno; nè questa sarà la sola occasione, che ci si porgerà per contrassegnargli la nostra riconoscenza. Questi animali, che il Sig. Aubry ha voluto imprestarci per fargli delineare e scolpire sono il coaso, il chincho e il zorillo; si ponno riguardare i due ultimi come nuovi, perchè non se ne trova la figura in nessun Autore.

Il primo di questi animali è giunto al Sig. Aubry sotto il nome di *Pekan*, figlio del diavolo o gatto selvatico della Virginia; ho veduto, che questo non era altrimenti il pekan, ho rigettate le denominazioni di figlio del diavolo e di gatto selvatico come artificiali e composte, ed ho conosciuto che era questo lo stesso animale che Hernandez ha descritto sotto il nome d'*Isquiepatl*, e che i Viaggiatori hanno indicato sotto quello di *squash*; e appunto da questa ultima denominazione ha derivato il nome *coaso*, ch'io gli ho dato; ha circa sedici pollici di lunghezza compresa la testa e il corpo, ha le gambe corte, il muso sottile, le orecchie piccole, il pelo di un color bruno carico, le un-

ghe nere e acute : abita ne' buchi , nelle fessure delle rupi , dove alleva i suoi parti ; vive di scarafaggi , di bacherozzoli , di piccoli uccelli ; e quando può entrare ne' rustici cortili , strozza il pollame , a cui mangia il cervello : quando viene irritato o spaventato , esala un fetentissimo odore ; ciò è per questo animale un mezzo sicuro di difesa ; nè uomini , nè cani osano accostarsigli : la sua orina , che si frammischia apparentemente con questo vapore appestato lorda e infetta indelebilmente ; del resto pare , che siffatto odore non siagli abituale . „ Mi è stato man-
 „ dato da Surinam questo animale vivo ,
 „ dice Seba (a) , io l'ho mantenuto in vita
 „ per tutta un'estate nel mio giardino , dove
 „ lo teneva legato con una piccola catena ;
 „ esso non mordeva alcuno , e quando gli si
 „ porgeva il cibo , si poteva maneggiare co-
 „ me un cagnolino ; scavava la terra col
 „ muso , ajutandosi colle zampe dinanzi , le
 „ cui dita sono armate di unghie lunghe
 „ e curve ; si nascondeva di giorno in una

(a) *Xsquepatk* , il cui colore a quello somiglia del grano abbrustolito la testa somiglia a quella d'una piccola volpe , e il suo grugno è presso a poco come quello del porco ; gli Americani lo chiamano *Quasje* . Seba , Vol. I. , pag. 68. *Notw.* Questa autorità prova ancora , che la parola *Squash* o *Coasa* è il vero nome di questo animale .

„ specie di tana fatta da se medesimo ; ne
„ usciva la sera , e dopo di essersi ripulito
„ cominciava a correre , e correva tutta la
„ notte a destra e manca , secondo la lun-
„ ghezza della catena ; indagava per tutto
„ chinando a terra il naso ; gli si dava ogni
„ sera da mangiare , e non ne prendeva se
„ non quanto gliene abbisognava senza toc-
„ care il resto ; non gli piacevano nè carne ,
„ nè pane , nè molti altri cibi ; le sue de-
„ lizie erano le pastinacce gialle , le capriuo-
„ le crude , le ciniglie e i ragni.... Verso
„ la fine dell' autunno si trovò morto nella
„ sua tana ; senza dubbio non potè resistere
„ al freddo . Ha il pelo del dorso di un colore
„ castagnò carico , ha le orecchie corte , la
„ parte anteriore della testa rotonda e d'un
„ colore un po' più chiaro di quello del dor-
„ so , e il ventre giallo . La coda è di una
„ mediocre lunghezza coperta d'un pelo bru-
„ no e corto ; vi si scorgono tutto all' in-
„ torno specie di anelli giallicci . “ Noi os-
„ serveremo che quantunque la descrizione e
„ la figura esposta da Seba convengano otti-
„ mamente colla descrizione e colla figura di
„ Hernandes si potrebbe nulladimeno dubitare
„ ancora , che questo fosse lo stesso animale ,
„ perchè Seba non fa veruna menzione del suo
„ detestevole odore , e perchè è difficile im-
„ maginare come abbia potuto conservare nel
„ suo giardino tutta un' estate una bestia così
puz-

puzzolente, e non parlare descrivendola della molestia, che doveva cagionare a quegli, che se le accostavano; si potrebbe adunque credere che questo animale proposto per Seba sotto il nome d'*ysquiepatl* non sia il vero, o che la figura esposta da Fernandes sia stata appropriata all'*ysquiepatl*, mentre apparteneva per avventura ad un altro animale, ma questo dubbio, che a prima giunta sembra fondato non sussisterà più quando si saprà, che questo animale non rende coral odore pestilenziale, se non quando viene irritato o molestato, e che molte persone in America ne hanno allevati e addomesticati (a).

Tom. XXVII.

F

(a) Malgrado la molesta lordura di questi animali, gl' Inglese, i Francesi, gli Svezzezi, e i Selvaggi dell' America settentrionale talora gli addomesticano; diceasi, che allora gli seguono come gli animali domestici, e che non depongono la loro orina se non quando gli molestano o gli percuotono: quando i Selvaggi ne uccidono alcuno, gli tagliano la vescica, affinchè la carne, che trovano buona da mangiare non prenda l'odore dell' orina; ho spesso incontrati degl' Inglese e dei Francesi, che mi hanno detto di averne mangiata, e di averla trovata di buonissimo sapore, che si accostava secondo essi a quello del porchetto di latte; gli Europei non fanno alcun caso della sua pelle a cagione della grossezza, e della lunghezza del pelo, ma i Selvaggi se ne servono per fare delle borse ec. *Voyage de Kalm*, pag. 417. Articolo tradotto dal *Marchese di Montmirail*.

Di queste quattro specie di muffette, che testè abbiamo indicate sotto il nome di *coaso*, *conepata*, *chincho* e *xorillo*, i due ultimi appartengono ai climi più caldi dell' America meridionale, e forse non sono che due varietà, e non due specie diverse. Le due prime sono del clima temperato della nuova Spagna, della Luigiana, degli Illinesi, della Carolina, ec. e a mio giudizio sono due specie distinte e diverse dalle altre due, e massimamente il *coaso* che ha il carattere particolare di non avere che quattro unghie ai piedi anteriori, mentre tutti gli altri ne hanno cinque; ma del resto questi animali hanno tutti presso a poco la stessa figura, lo stesso istinto, lo stesso fetore, e non differiscono per così dire, che pei colori e per la lunghezza del pelo. Il *coaso* è, come si è di sopra veduto di un colore bruno assai uniforme, e non ha la coda pelosa come gli altri. Il *conepata* (a) ha sopra un fondo di

(a) Gl' Inglese appellano *Polecat*, una specie d'animale, che trovasi comunemente non solo nella Transilvania, ma negli altri paesi più al Nord e al Sud nell' America, si chiama volgarmente *Scunck* nella nuova York; gli Svezzezi, che sono in questo paese, lo nominano *Fiskatte* . . . Questo animale somiglia molto alla martora, è presso a poco della stessa grossezza, e d'ordinario d'un color nero, ha però sul dorso una bianca riga longitudinale, ed una da ogni lato dello stesso colore e della stessa lunghezza; se ne vedono, ma di rado, di quelli che sono quasi

pelo nero cinque fasce bianche , le quali si estendono in lunghezza dalla testa alla coda.

F 2

del tutto bianchi Questo animale depone i suoi parti del pari nelle cavità degli alberi , che nelle tane , non resta solo in terra , ma sale su gli alberi ancora . E' nimico degli uccelli ; rompe le loro uova e mangia i loro parti ; e quando può entrare in un pollajo , ci fa grande strage Quando è inseguito o dai cani , o dagli uomini , corre finchè può , o monta su un albero , e quando è ridotto alle strette , mette l'orina contro quegli , che lo inseguono . . . l'odore n'è sì forte , che soffoca ; se cadesse una goccia di questo liquore appestato negli occhi si correrebbe rischio di perdere la vista ; e quando cade sulle vesti , v'imprime un odore così tenace , ch'è difficilissimo il dissiparlo ; la maggior parte dei cani si distolgono e fuggono tosto che il sentono ; è necessario più di un mese per togliere questo odore ad una stoffa . . . Nei boschi si sente spessissimo da lontano . Nel 1749. venne uno di questi animali vicino al mio albergo , era d'Inverno e di notte , i cani erano desti , e lo inseguirono ; nell'atto stesso si diffuse un odore così fetente , ch'essendo io in letto pensai di restarne soffocato , le vacche mettevano altissimi mugiti . . . Sulla fine dello stesso anno ne venne un altro , nè sparse alcun odore , perchè nol lascia , che quando è molestato o cacciato . Una femmina , che di notte lo scoprì agli occhi scintillanti , l'uccise , e nell'atto stesso riempì la cava di un tale odore , che non solo la detta femmina ne fu ammalata per alcuni giorni , ma il pane , la carne , e le altre provvisioni , che conservava nel suo alloggio furono talmente ammorbate , che nulla si potè conservare , ma si dovette gittar via . *Voyage de Kalm &c.*, pag. 442.

Il chinco (a) è bianco sul dorso e nero sui fianchi colla testa tutta nera, fuor d'una

(a) Questo animale è appellato *Chinche* dai nativi del Brasile, è grosso come uno dei nostri gatti, ha la testa lunga, che si va restringendo dalla sua parte anteriore fino alla estremità della mascella superiore, che prolungasi oltre alla mascella inferiore, formando entrambe una bocca aperta fino agli angoli esteriori degli occhi, i quali sono lunghi, e la loro lunghezza è ristretta, l'uvea è nera, e tutto il rimanente è bianco, le sue orecchie sono larghe, e quasi simili a quelle d'un uomo, le cartilagini, che le compongono hanno gli orli rovesciati al di dentro, i loro lobi o parti inferiori pendono un poco al basso; e tutta la disposizione di queste orecchie mostra, che questo animale ha il senso dell'udito assai delicato; due fascie bianche nascono sulla testa, e passano al di sopra delle orecchie allontanandosi l'una dall'altra, e vanno a terminare in arco ai lati del ventre; i piedi sono corti, le zampe divise in cinque diti, forniti all'estremità di cinque unghie nere, lunghe, e acute, che gli servono a scavare la terra; il dorso è simile a quello del porco, e il disotto del ventre è tutto piatto; la coda è lunga come il corpo, non è diversa da quella di una volpe; il pelo è d'un bigio scuro e lungo come quello dei nostri gatti; dimora nella terra come i nostri conigli, ma la sua tana non è così profonda; ho durata molta fatica a dissipare da' miei abiti il cattivo odore, ond'erano imbevuti, durò più di otto giorni, quantunque gli avessi lavati molte volte, bagnati, e asciugati al sole ec. Mi fu detto, che il cattivo odore di questo animale procedeva dalla sua orina, che spargeva sopra la sua coda, di cui servesi come di aspersorio

fascia bianca, la quale si estende dalla cervice fino al frontale del naso; la coda è assai folta di peli bianchi misti con un po' di nero. Il zorillo (a), che si appella anche *mapurita* (b), pare di una specie più

per inaffiare, e mettere in fuga con questo orribile odore i suoi nemici; ch'egli orina entrando nella sua tana per impedire, che altri vi entri, ch'è molto ghiotto di uccelli e di polli, e che questi sono quegli animali, che distruggono principalmente gli uccelli nelle campagne di Buenos-ayres. *Journal du P. Feuillée. Paris, 1714., pag. 272. & suiv. Nota.* Parmi, che questo animale sia stato indicato da Acofta sotto il nome di *Chinchille*, il quale non è diverso dal chincho. „ I chinchilli, dice questo „ Autore, sono piccoli animali come scojattoli, „ che hanno un pelo mirabilmente morbido e liscio ... e si trovano nella Sierra del Perù “. *Histoire Naturelle des Indes occidentales, pag. 199.*

(a) Il Zorilla della nuova Spagna è grande come un gatto, d'un pelo bianco e nero con una bellissima coda: quando è inseguito, si ferma per pisciare: questa è la sua difesa; perchè il fetore di questo escremento è sì forte, che appesta l'aria per cento passi d'intorno, ed arresta quegli, che lo inseguono; se ne cadesse sopra di un abito, converrebbe sotterrarlo per impedirne il fetore. *Voyage de Gemelli Carreri, Tom. VI., pag. 212. & 213.*

(b) Il Mapurita delle rive dell'Orenoque è un piccolo animale il più bello, e al tempo stesso il più detestevole, che si possa vedere: i Bianchi dell'America lo chiamano *Mapurita*, e gl'Indiani *Mafutitiqui*; ha il corpo tutto macchiato di bianco e di nero; la sua coda è rivestita d'un

piccola; ha nondimeno la coda così bella e pelosa come il chinco, da cui è diverso per la disposizione delle macchie della pelle; ella è di un fondo nero, sul quale si estendono in lunghezza delle fasce bianche dalla testa fino alla metà del dorso, ed altre specie di fasce bianche trasversalmente sopra le reni, sulla groppa e sull'origine della coda, la quale è nera fino alla metà della sua lunghezza, e bianca dalla metà fino alla fine; laddove quella del chinco è tutta dello stesso colore. Tutti questi animali (a) sono presso

bellissimo pelo: è vivo, maligno e ardito. . . . confida nelle sue armi, di cui ha sperimentato l'effetto fino ad esserne quasi soffocato . . . scarica certi fiati, che appestano anche di lontano . . . Gli Indiani nondimeno ne mangiano la carne, e si vestono della sua pelle, che non ha alcun cattivo odore. *Histoire Naturelle de l'Orenoque, par Gumillu, Tom. III., pag. 240.*

- (a) V'è alla Luigiana una specie di animale, assai graziosa, ma che in distanza di più di una lega appesta l'aria colla sua orina, e perciò si nomina la *bestia puzzolente*; ella è grossa come un gatto: il maschio è di un bellissimo nero, e la femmina del pari nera è orlata di bianco; il suo occhio è vivissimo . . . a ragione è nominata *puzzolente*, perchè il suo odore infetta. . . . Un giorno ne uccisi una, il mio cane le si gittò addosso e venne a me scuotendola; una goccia del suo sangue, e senza dubbio ancora della sua orina, cadde sopra il mio abito, che era di traliccio di caccia, e mi appestò talmente, che fui costretto a ritornare a casa a cangiare vestito, ec. *Histoire de la Louisiane, par le Page du Pratz,*

a poco della stessa figura e della stessa grandezza della puzzola di Europa; le rassomigliano ancora per le abitudini naturali; e il fisico risultamento della loro organizzazione è pure lo stesso. La puzzola è fra tutti gli animali di questo continente quello che esala il più cattivo odore, è solo più affinato nelle muffette, le cui specie o varietà sono nell'

Tom. II. pag. 86. § 87. — Quando uno di questi animali è assalito da un cane per comparire più terribile, cangia per modo la sua figura arricciando il pelo e rannicchiando tutto il corpo, che si fa quasi del tutto rotondo, ciò che lo rende stravagante e spaventevole; nondimeno quest'aria minacciofa non bastando per isgomentare il suo nimico, mette in opera per allontanarlo un rimedio assai più efficace, perchè manda da qualche segreto canale un odore così appestato, che infetta l'aria molto lontano intorno a se, in guisa, che gli uomini e gli animali si affrettano ad allontanarsi: ci sono dei cani, a cui è insopportabile questo fetore, e gli costringe a lasciarsi fuggire la preda, ve n'ha di altri, che immergendo il naso nella terra rinnovano gli assalti finchè hanno ucciso il puzzolente; ma di raro si curano d'inseguire una caccia così disagiata, che gli fa patire quattro o cinque ore. Gl' Indiani tuttavia ne considerano la carne come una cosa delicata. Io ne ho mangiato e l'ho trovata di buon sapore; ne ho veduti alcuni, che erano stati da piccoli addomesticati; sono divenuti mansueti e assai vivi, i quali non mettevano in pratica questa operazione, a cui la paura e l'amore della loro conservazione gli sforzano ad avere ricorso. I puzzolenti si nascondono nelle cavità degli alberi e delle rupi; se ne trovano in quasi tutto il continente setten-


America numerose, laddove la puzzola è sola della sua nell' antico continente ; perchè io non credo già che l' animale di cui Kolbe parla sotto il nome di *tasso puzzolente* (a), e che a me pare una vera muffetta, esista nel Capo di Buona-Speranza come nazionale ; può essere che sia stato trasportato dall' America, e che Kolbe, che non è esatto nei fatti, abbia tolta la sua descrizione dal P. Zuchel, ch' egli cita come persona che ha veduto questo animale al Brasile. Quello della nuova Spagna, che Fernandes indica sotto il nome di *Ortohua*, mi pare lo stesso animale del zorillo del Perù ; e il *Tepemaxtla* dello stesso Autore (b) potrebb' essere il conepata, che dee trovarsi nella nuova Spagna siccome alla Luigiana, ed alla Carolina.



DE-

trionale dell' America ; si nutriscono d' insetti e di frutti selvatici. *Histoire naturelle de la Caroline, par Catesbi, Tom. II. pag. 62.*

(a) *Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe, Tom. III. pages 86. & 87.*

(b) *Ortohula, magnitudine tres dodrantes vix superat nigro candidoque vestita pilo sed quibusdam in partibus fulvo . . . apud has gentes in cibi jamdiu venit usum quamvis crepitus ventris sit illi fatidissimus : Occitucensibus versatur agris . . . est & altera species quam tepimaxilam vocant eadem fere formâ & naturâ sed nullâ in parte fulva. & caudâ nigris albisque fuscis transversim discurrentibus variâ quæ provenit quoque apud Occitucenses. Fernand. Hist. An. nov. Hisp. pag. 6. cap. XVI.*





IL CHINCO

DESCRIZIONE

DEL COASO.

Quest' animale [*tav. V. fig. 1.*], che ci fu spedito dalla Virginia sotto i nomi di *Pekan*, *Gatto selvaggio*, o *Figliuolo del Diavolo*, è differentissimo dal gatto, ed è diverso altresì dal pekan, di cui si parlerà nel proseguimento di questo Tomo, per varj caratteri, e principalmente pel numero delle dita: esso è più piccolo del pekan, e non ha che sedici pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda. Sappene del coaso io non abbia veduto che una pelle disseccata e imbottita, pure m' è sembrato aver il muso molto più lungo, le orecchie più grandi, le gambe più corte e i piedi più piccoli che il pekan. I suoi denti rassomigliavano tanto a quelli della faina, quanto a quelli del pekan. Il coaso aveva maggior somiglianza alla faina che al pekan per la figura della testa e del corpo intero, eccettuata la coda, ch' era poco pelosa: il tronco non aveva che sei pollici di lunghezza, e il pelo non oltrepassava un pollice e mezzo. Ma la maggior differenza che vi sia tra 'l coaso e i pekani, le faine, le puzzole ec. consiste nel numero delle dita: il coaso non ne ha che quattro nei piedi anteriori, mentre gli altri mentovati animali ne hanno cinque nei piedi anteriori come in quelli di dietro. Le ugne

Tom. XXVII.

90 *Descrizione del Coaso.*

son nesicce e rassomigliano più per la loro forma alle ugne delle faine che a quelle dei pekani.

Il pelo e la lanugine sono di color di marrone su tutto il corpo ; vi ha un miscuglio di grigio sulla testa . Il pelo è molto lucido ; il più lungo ha circa un pollice e mezzo ; quello della coda ha poco più di lunghezza . I mustacchi son neri e lunghi più di due pollici .



DESCRIZIONE

DEL CHINCO.

Questa descrizione è stata fatta sopra una pelle impagliata [*tav. V. fig. 2.*] che rinchiudeva gli ossi delle gambe e dei piedi e quelli delle mascelle. I denti rassomigliavano a quelli della puzzola, del furetto, dell' armellino e della donnola. La testa di questo chinco era molto piccola, le gambe molto corte, e la coda lunga e fornita di folto pelo: in generale esso rassomigliava molto alla puzzola, era presso a poco della stessa grandezza, poichè aveva sedici pollici di lunghezza, dall' estremità del muso fino all' origine della coda, il cui tronco non era lungo che otto pollici; ma il pelo s' estendeva al di là quattro pollici.


La pelle aveva delle parti nere e delle parti bianche separate da grandi e da piccoli spazj. La testa era interamente nera, eccettuata una striscia bianca, che s' estendeva lungo il frontale sul mezzo della fronte, dalla sommità della testa e dell' occipite fino al collo, ove metteva capo a una larga fascia dello stesso colore, che occupava il disopra del collo; essa s' estendeva sul garrot e sul dorso, ove si divideva in due rami, che si prolungavano fin sulla groppa: fra i detti rami eravi una striscia nera che s' estendeva dal mezzo del dorso fino alla coda, i cui peli erano per la maggior parte di color

92 *Descrizione del Chinco.*

bianco, e se ne trovavan molti ch' erano in parte bianchi e in parte neri. Il petto e 'l ventre eran bianchi con piccole macchie nere. Tutto il restante del corpo era nero con macchie bianche su i lati del collo, sulla spalla e sulla faccia esterna delle quattro gambe. Il pelo di quest' animale è molto lustro, e assai lungo, poichè quello del corpo aveva più di tre pollici e mezzo, e quello della coda più d'un mezzo piede di lunghezza. Il pelo nascondeva una lanugine molto morbida, ch' era biancastra sotto il pel bianco, e bruna sotto il pel nero. Ciascun piede aveva cinque dita e cinque ungue lunghe, alquanto curve e biancastre: quelle de' piedi di dietro eran nascoste sotto il pelo.







IL CONEPATA

T. Viers inc.

DESCRIZIONE

DEL ZORILLO.


LA descrizione di quest' animale [*tav. VI. fig. 1.*] è stata fatta sopra una pelle , che presso a poco era nello stesso stato che quella del precedente . Gli ultimi denti mascellari erano stati levati colla parte posteriore delle mascelle ; ma tutt' i denti che restavano rassomigliavano a quelli della puzzola . Il zorillo era più piccolo del chinco ; esso aveva il muso men lungo e 'l corpo più corto , poichè non vi era che tredici a quattordici pollici di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda , ch' era pure fornita di folto pelo , e lunga presso a poco egualmente che quella del chinco .


I soli colori del pelo basterebbero per far presumere che il zorillo sia di specie diversa da quella del chinco . Quello del zorillo è di color nero o nericcio con fasce , strisce e macchie bianche o biancastre che hanno qualche apparenza di gialliccio . Vi ha una macchia bianca sulla fronte tra i due occhi : veggonfi sul collo e sul dorso quattro fasce dello stesso colore ; le due di mezzo cominciano all' occipite ; l' esteriore da ciascun lato s' estende fino a una piccola distanza dall' occhio : queste fasce non son regolari nè per la loro larghezza , nè per la loro direzione : vi ha parimente un' altra

94 *Descrizione del Zorillo.*

fascia bianca da ciascun lato del petto , che comincia dietro il gomito , risale verso il dorso sul mezzo del corpo , e forma una fascia trasversale sulla parte posteriore del dorso : su i lombi trovasi una seconda fascia bianca e trasversale , che discende al dinanzi del ginocchio : vedesi una macchia dello stesso colore da ciascun lato della groppa , e una piccola fascia in forma di mezzo anello all' origine della coda , la cui estremità è parimente di color bianco , il resto è nero . Il ventre , il petto , le gambe e i piedi son neri o nericci senz' alcun miscuglio di bianco . Il pelo del corpo non ha che un pollice di lunghezza , e quello della coda ne ha tre o quattro ; tutti questi peli son sodi e lustri , e nascondono una lanugine molto morbida e dello stesso colore che il pelo . Ciascun piede ha cinque dita e cinque ugne ; quelle dei piedi di dietro sono in parte coperte dal pelo delle dita .







IL VISON

Ramus sc.

IL PEKAN E IL VISON.

E' Molto tempo, che il nome di *Pekan* era in uso nel commercio delle pellicce del Canada (a), senza che si avesse una migliore contezza dell' animale, a cui propriamente appartiene; non si trova tal nome in nessuno de' Naturalisti, e i Viaggiatori l'hanno usato indistintamente (b) per dinotare animali diversi, e massimamente le musfette; altri hanno appellato *volpe* o *gatto selvatico* l'animale, che dee avere il nome di pekan, e non era possibile trarre alcuna contezza precisa dalle notizie brevi e mancanti, che tutti ne hanno date. Altrettanto è del pekan, come del vison; noi ignoriamo l'origine di questi due nomi, e non se ne sapeva altro, fuor se non se che questi appartengono a' due animali dell' America settentrionale. Noi gli abbiamo trovati entrambi nel Gabinetto del Sig. Aubry Curato di S. Luigi, ed egli s'è compiaciuto d'impresarceli per descriverli, e farli delineare. Il

(a) Nomi delle pelli, che si estraggono dal Canada, coi loro prezzi nel 1683. I pekan, gatti selvatici o figlj del diavolo, valgono lire una e soldi 15. per ogni pelle. *Voyage de la Hontan*, Tom. II. pag. 39.

(b) Sparge un fetore insopportabile. I Francesi gli danno nel Canada il nome di *figlio del diavolo* o *bestia puzzolente*; tuttavia alcuni la chiamano *pekant*. *Voyage de Kalm*, pag. 412., articolo tradotto da M. le Marquis de Montmirail.

pekan rassomiglia tanto alla martora, e il vison alla faina, che a noi pare, che si possano riguardare come varietà in ciascuna di queste specie (a); non solamente sono dotati della stessa forza di corpo, delle stesse proporzioni, della stessa lunghezza della coda, e qualità stessa del pelo; ma altresì dello stesso numero di denti, delle unghie, dello stesso istinto, delle abitudini naturali istesse; pertanto crediamo di riguardare non senza fondamento il pekan come una varietà nella specie della martora, e il vison pure come una varietà in quella della faina, o almeno come specie così vicine, che non presentino alcuna reale diversità: il pekan e il vison hanno soltanto il pelo più bruno, più lucido e più setoloso che la martora e la faina, ma questa differenza, siccome è noto, è loro comune col castoreo, colla lontra, e cogli altri animali del Nord dell' America, la cui pelliccia è più bella di quella di questi medesimi animali nel Nord dell' Europa.

(a) Io farei molto inclinato a credere, che l'animale indicato da Sagard Theodat, sotto il nome di *Ottay*, potesse essere lo stesso, che il vison. „ L'ottay, dice questo Viaggiatore, è grande „ come un piccolo coniglio; ha il pelo nerissimo e morbidissimo, è mansueto, pulito e bello, che pare una felpa. I popoli del Canada fanno gran caso di tali pelli, di cui fanno „ de' vestiti “. *Voyage au pays des Hurons*, pag. 308. Non v'è nel Canada alcun animale, a cui questo indizio meglio convenga che al vison.

DESCRIZIONE

DEL PEKAN.

IL pekan [*tav. VII. fig. 1.*] rassomiglia esattamente alla faina e alla martora pel numero, per la forma e per la situazione dei denti; ha pure molte relazioni ai detti animali per la natura e pel colore del pelo, ed anche per la figura del corpo; ma i piedi mi son paruti a proporzione più grossi e le gambe più lunghe, principalmente le anteriori, per quanto ho potuto giudicare dall'osservazione fatta sopra una pelle disseccata e imbottita, che mi ha servito di soggetto per questa descrizione. M'è paruto che il corpo del pekan fosse per lo meno egualmente lungo che quello della faina e della martora, poichè la pelle imbottita e gonfiata al sito del ventre aveva un piede e mezzo di lunghezza, misurata in linea retta dall'estremità del muso fino all'origine della coda, il cui tronco era lungo dieci pollici: il pelo s'estendeva un pollice al di là del tronco. Ciascun piede aveva cinque dita e cinque ungue.

Quest'animale aveva un pel fodo e lustro, e una lanugine morbidissima e molto folta. La lanugine era di color cenerino sulla maggior parte della sua lunghezza, cominciando dalla radice: la punta era grigia con alcune tinte di fulvo. Il pel fodo aveva gli stessi colori che la lanugine, eccettuato

98 *Descrizione del Pekan.*

nella parte, che s' estendeva al di là della lanugine, la qual parte era grigia e nera con alcune tinte di color di marrone; la punta dei peli più lunghi era nera. Per questo miscuglio di colori l' animale è variato di grigio e di fulvo sulla testa, sul collo, sulle spalle, sull' alto delle gambe anteriori e sul dorso. Nei lati del corpo il grigio dominava sul fulvo, e la punta de' peli formava sul collo qualche apparenza di fasce trasversali nere: a certi aspetti il nero era più apparente sulla groppa che il grigio: il basso delle gambe anteriori, quelle di dietro in intero, i quattro piedi e la coda erano di color nero con qualche miscuglio di bruno: il petto e 'l ventre eran mischiati di fulvo e di bruno: eravi del bianco tra le gambe anteriori sul petto, e tra le gambe posteriori sul ventre.



DESCRIZIONE

DEL VISON.


IL vison [*tav. VII. fig. 2.*] rassomiglia alla faina per la forma del corpo, e pe' denti che ho potuti vedere in una pelle imbottita (*), che fu portata dal Canadà, e che mi servì di soggetto per questa descrizione. Vi ho veduto distintissimamente il terzo dente mascellare, ch' è di più nella faina che nella puzzola. Il vison ha il corpo, e principalmente il collo molto allungato; la coda è fornita di un pelo poco folto, ed è mediocrementemente lunga; le sue gambe son cortissime, massimamente le anteriori; ha cinque dita in ciascun piede, e cinque ungue, che son quasi affatto nascoste dal pelo delle dita. Quest' animale è presso a poco della grandezza della faina; la pelle, ch' io ho veduta, aveva un piede e quattro pollici di lunghezza, dall' estremità del muso fino all' origine della coda, il cui tronco era lungo sette pollici; il pelo non l' oltrepassava che d' un pollice, ed è nero: quello

(*) Questa pelle è nel Gabinetto del Sig. Aubry, Curato della Parrocchia di San Luigi nell' Isola di Parigi, colle pelli di pekan, di zorillo, di chinco e di coaso, le cui descrizioni precedono la presente. Il Sig. Aubry si compiacque di comunicarmi queste pelli ed altri pezzi del suo Gabinetto, colla maggior gentilezza.

100 *Descrizione del Vison.*

del corpo ha un color bruno tinto di fulvo, è molto lustro e lascia vedere al disotto una lanugine morbida, molto folta, di color cenerino chiaro, dalla radice fino alla punta, che ha una tinta di fulvo pallido. I più lunghi peli del corpo hanno circa un pollice; quelli della coda son poco più lunghi.

I mustacchi son bruni e hanno presso a due pollici di lunghezza.



IL GIBELLINO (a).

QUasi tutt' i Naturalisti hanno favellato del gibellino, senz' averne contezza, fuorchè della sua pelliccia. Il Sig. Gmelin è il primo, che ne abbia esposta la figura, e fatta la descrizione; ne vide esso due vivi presso il Governatore di Tobolsk. „ Il gibellino somiglia, egli dice, alla martora per la forma ed abitudine del corpo, ed alla donnola pei denti; esso ne ha sei incisivi molto lunghi, e un po' ricurvi con due canini alla mascella inferiore, e piccolì ed acutissimi alla superiore; ha grandi

Tom. XXVII. H

(a) Gibellino. Martora gibellina; *Zobel* in Tedesco; *Sobol* in Pollaco; *Sabbel* in Iſvezzese; *Sable* in Inglese.

Mustela Sobella. Gefner, *Hist. quad.* p. 768.

Mustela Zibellina, The Sable. Ray. *Syn. quadrup.*, pag. 201.

Mustela Zibellina, Aristotelis *Sutherius*, Nipho, *Cebalus*, Alciato, *mus sarmaticus* & *scythicus*. The *cebal* or *sable*. Charleton, *exercit.* pag. 20.

Mustela Sobella. Gefneri, *Mustela Zibellina* Jonstoni, *Mustela scythica*, *martes scythica*, *icelis scythica*, *sutherius Aristotelis*, *mus sarmaticus* & *scythicus Alciatis*, &c. Rzaczynski, *auſt.* pag. 317. *Mustela obscure fulva*, *guttare cinereo*. . . . *Martes Zibellina*. La Martora Zibellina. Briff. *Regn. anim.* p. 249.

Mustela Zibellina. Nov. Comm. Acad. Petrop. Tom. V. *Animalium quorundam quad. descriptio*. auctore Georg. Gmelin, art. 1. fig. *ibid.* tab. 6.

„ mustacchi intorno alla gola , i piedi larghi ,
„ e tutti armati di cinque unghie : questi
„ caratteri erano comuni a questi due gibel-
„ lini ; ma l'uno era di un bruno nericcio
„ in tutto il corpo , tranne le orecchie , e
„ il disopra del mento , dove il pelo era
„ un po' fulvo ; e l'altro più piccolo del
„ primo era in tutto il corpo d'un bruno
„ gialliccio colle orecchie , e il disopra del
„ mento di una gradazione di più pallidi
„ colori . Questi sono dell' inverno , perchè
„ alla primavera si cangiano per la muta-
„ zione del pelo : il primo gibellino , ch' era
„ di un bruno nero , divenne in estate di un
„ bruno giallo ; e il secondo , ch' era di un
„ bruno giallo , divenne d'un giallo pallido .
„ Ho ammirata , prosiegue il Sig. Gmelin ,
„ l'agilità di questi animali ; tosto che ve-
„ devano un gatto , si rizzavano su i piedi
„ di dietro , come per disporsi alla zuffa ;
„ sono inquietissimi , e si agitano assai di
„ notte (a) : all' incontro di giorno , e mas-
„ simamente dopo di aver mangiato , dor-
„ mono d'ordinario una mezz' ora , o un'
„ ora ; si possono in questo tempo prendere ,
„ scuotere , pungere , senza che si sveglino “.

(a) *Nota.* Questa inquietudine e questo movimento nella notte non è particolare al zibellino ; ho veduto lo stesso negli ermellini , che abbiamo avuti vivi , e che abbiamo nutriti per molti mesi .

Da questa descrizione del Sig. Gmelin s'inferisce, che i gibellini non sono tutti dello stesso colore, e che in conseguenza i Nomenclatori, che gli hanno indicati dalle macchie, e dai colori del pelo, si sono serviti di un importuno carattere, poichè non solo si cangia nelle stagioni diverse, ma varia da un individuo all' altro, e dall' uno all' altro clima (a).

I gibellini abitano le rive de' fiumi, i luoghi ombrosi, e i boschi più folti; saltano agilissimamente d'albero in albero, e schivano molto il sole, il quale, dicesi, far cangiare colore in brevissimo tempo al loro pelo; si pretende (b), che si nascondano, e che s'intormentiscano d'inverno, tuttavia appunto in questo tempo se ne fa la caccia, e si cercauo più ardentemente, perchè la pel-

H 2

(a) Di due zibellini, di cui parla il Sig. Gmelin, il primo veniva dalla provincia di Tomskien; e il secondo da quello di Beresowien; si trova pure nella sua relazione della Siberia, che sulla montagna di Sopka-Sinaia ci sono dei zibellini neri di pelo corto, a cui è proibito di dar la caccia: che una simile specie di zibellini si trova più oltre nelle montagne, come pure presso i Calmuchi Urangai. „ Ho vedute, egli dice, alcune di queste pelli, che i Calmuchi si aveano „ recate, sono esse conosciute sotto il nome di „ zibellini di Kangaraga“. *Voyage de Gmelin*, Tom. I. , pag. 217.

(b) *Rzaczynski*, *aut.*, pag. 318.

ficcia è in tal tempo più bella , e assai migliore che di estate , vivono di ratti , di pesci , di semi di pino , e di frutti selvaticchi ; sono ardentissimi in amore ; e in tal tempo hanno un odore acutissimo , e sempre putiscono i loro escrementi : si trovano principalmente nella Siberia , e non ve n'ha che pochi nelle foreste della grande Russia , ed ancora meno nella Lapponia . I gibellini più neri sono i più pregiati ; la differenza , che passa tra questa pelliccia , e tutte le altre (a) si è , che a qualunque parte si voglia , piegasi il pelo , laddove gli altri peli presi a rovescio fanno sentire qualche ruvidezza per la loro resistenza .

La caccia dei gibellini si fa dai rei confinati nella Siberia , o dai soldati , che là si mandano a tale effetto , e che vi dimorano molti anni ; gli uni e gli altri sono

(a) Il zibellino è diverso dalla martora nell' essere più piccolo , e nell' avere i peli più fini e lunghi ; i veri zibellini sono dammascati di nero , e si prendono nella Tartaria ; pochi se ne trovano nella Lapponia : più che il colore del pelo è nero , è più ricciato , e varrà qualche volta sessanta scudi , quantunque la pelle non abbia , che quattro dita di larghezza , se ne sono veduti de' bianchi e de' bigi . *Regnard, Tom. I., pag. 176.*
Nota. Schæffer parimenti dice , che si trovano talvolta de' zibellini bianchi . *Histoire de la Lapponie, pag. 318.*

obbligati a fornire una determinata quantità di pellicce, che è loro tassata; essi caricano con una sola palla il fucile, per guastar il meno che sia possibile, la pelle di questi animali, e talora in vece d'armi da fuoco usano delle balestre, e sottilissime faette. Siccome il buon esito di tal caccia suppone destrezza, e molta affiduità, così permettesì agli uffiziali d'interessarne i soldati, e dividere con essi il soprappiù di ciò, che sono essi obbligati a fornire ogni settimana, la la qual cosa è loro di un beneficio considerabile (a). Alcuni Naturalisti sospettarono, che il gibellino fosse il *satherius* di Aristotele, ed io credo la loro conghiettura ben fondata. La finezza della pelliccia del gibellino indica, che spesso dimora nell' acqua; e alcuni Viaggiatori (b) dicono, che non si trova in gran numero, se non che nelle isolette, dove i cacciatori ne vanno in traccia; d'altra parte Aristotele parla del *sathe-*

H 3

(a) Un Colonello può ricavare in sei o sette anni di servizio alla caccia dei zibellini, circa quattro mila scudi di profitto, i subalterni a proporzione, ed ogni Soldato sei o settecento scudi. *Voyage du P. Avril*, pag. 169. — Vedi pure la relazione della Moscovia per la Neville. *Paris*, 1698., pag. 217.

(b) I Cacciatori vanno a cercare i zibellini nelle isolette, ove si ritirano, gli uccidono con una specie di balestra ec. *Voyage du P. Avril*, pag. 168.

rius come di un animale di acqua , e lo unisce alla lontra e al castoro. Si dee altresì preiumere , che nel tempo della grandezza di Atene , queste belle pellicce non erano ignote alla Grecia , e che l'animale , che le somministra aveva un nome ; ora non ve n'ha alcuno , che si possa adattare al gibellino con più ragione , che quello del *satharius* , se è realmente vero , che il gibellino mangia del pesce (a) , e dimora sovente nell'acqua per essere posto nel numero degli amfibj.

(c) *In umbrosis saltibus versatur semper, insidiatur aviculis . . . in escam assumit mures, pisces, uvus rubens.* Rzaczynki, *auct. Hist. Nat. Polon.* pag. 318.



IL LEMNO (a).

OLao magno è il primo, che ha fatta menzione del lemno (b); e tutto ciò che ne dice Gefner, Scaliger, Ziegler, Jonston ec., è tolto da questo Autore, ma Wormio, dopo più esatte disamine ha fatta la storia di questo animale, ed eccone la descrizione di lui. „Ha, egli dice, la figura di „ un forcio; ma la coda più corta, il cor- „ po lungo circa cinque pollici, il pelo fino „ e maculato a varj colori, la parte ante- „ riore della testa nera, la parte superiore „ gialliccia, il collo e le spalle nere, il re- „ sto del corpo rossiccio e sparso di alcune „ piccole macchie nere di figure diverse fino „ alla coda, la quale non ha che un mez-

H 4

(a) *Leming*, nome di questo animale nel suo paese nativo nella Norvegia. *Mus Norwagicus* à *Norwagis*, *Leming*, *Leminger*, *Lemender*, *Lemmer* appellatur. *Olaüs Magnus Lemner* & *Lemnus* vocat. . . . *Zieglerus Leem* vel *Lemmer*. *Museum Wormianum*, pag. 322., fig. animalis, & *Skeleton.*, pag. 225.

Lemmus, *Mus* caudà abbreviatà pedibus pentadactylis. *Mus* caudà abruptà, corpore fulvo nigroque variò. *Faun. Suec.* 26. *Act. Stock.* 1740., pag. 326. *Tab. VI.*, fig. 4. & 5. *System. Nat.* 10. num. 2. *Linn. System. Nat. edit. X.*, pag. 59.

(b) *Olaï Magni*, *Hist. Gent. sept. lib. XVIII.*, cap. xx.

„ 2o pollice di lunghezza, ed è coperta di
„ peli gialli nerici, l'ordine delle macchie,
„ come pure la loro figura e grandezza non è
„ lo stesso in tutti gl'individui; ha intorno
„ alla bocca molti peli aspri a foggia di
„ mustacchi, di cui ne ha sei in ogni parte
„ assai più lunghi e ruvidi degli altri; l'aper-
„ tura della bocca è angusta, il labbro su-
„ periore è fesso come negli scojattoli; esco-
„ no della mascella superiore due lunghi
„ denti incisivi, acuti e un po' curvi, le cui
„ radici penetrano fino all'orbita degli oc-
„ chi, due simili denti nella mascella infe-
„ riore, i quali corrispondono ai superiori,
„ tre mascellari da ogni lato lontani dagli
„ incisivi; il primo de' mascellari molto lar-
„ go e composto di quattro lobi, il secondo
„ di tre, il terzo più piccolo; avendo cia-
„ scuno di questi tre denti il suo alveolo
„ separato, ed essendo tutti situati dentro il
„ palato vi è un grande intervallo fra loro;
„ la lingua è molto ampia, e stendesi fino
„ all'estremità dei denti incisivi; dagli avanzi
„ d'erba e di paglia, che erano nel gozzo
„ di questo animale s'inferisce, che rumi-
„ na; gli occhi sono piccoli e neri, le orec-
„ chie distese sul dorso, le gambe dinanzi
„ cortissime, i piedi coperti di pelo, e ar-
„ mati di cinque unghie acute e curve, di
„ cui quella di mezzo è lunghissima, e la
„ quinta è come un piccolo pollice o uno

„ sperone di gallo situato talvolta molto alto
 „ nella gamba ; tutto il ventre è bianchic-
 „ cio tinto leggermente di giallo, ec. “ Que-
 sto animale , il cui corpo è grosso , e le cui
 gambe sono assai corte , corre tuttavia molto
 velocemente ; abita d'ordinario nelle mon-
 tagne della Norvegia e della Lapponia , ma
 ne discendono talvolta in tanta moltitudine
 in alcuni anni (a) e in certe stagioni , che

(a) Si è osservato , che i lemni non compajono
 regolarmente ogni anno , ma in certo tempo im-
 provvisamente , e in sì gran numero , che si spar-
 gono per tutta , e coprono tutto il paese
 Queste bestiuole ben lungi dall' aver timore ,
 e fuggire quando sentono i passeggeri , sono al
 contrario ardite ed animose ; vanno davanti a
 quelli , che le assaliscono , gridano e latrano
 come cagnolini ; se si vogliono percuotere non
 si sgomentano nè del bastone , nè delle alabarde
 saltando , e slanciandosi contro quelli , che le
 battono , si avventano e mordono incollerite i
 bastoni di quelli , che le vogliono uccidere .
 Questi animali hanno la particolarità di non en-
 trare mai nelle case , nè dentro le capanne per
 farci danno , stanno sempre nascosti nei cespug-
 li , e lungo le colline ; talvolta si fanno guer-
 ra , e si partiscono come in due armate lungo
 i laghi e i prati Gli ermellini e le volpi
 sono loro nemici , e ne distruggono assai
 l'erba rinascente cagiona la morte a questi pic-
 coli animali : pare , che si uccidano anche da se
 stessi ; se ne vedono degli appesi ai rami degli
 alberi , si può credere altresì , che si gittino nell'
 acque in truppe come le rondinelle . *Histoire de
 la Lapponie, par Scheffer, pag. 322. Nota . Vi è*


si considera l'arrivo dei lemni come un terribile flagello, e da cui è impossibile liberarsi; fanno un guasto formidabile nelle campagne, devastano i giardini, distruggono le messi, e nulla lasciano intatto fuori di ciò che è chiuso nelle case, dove per singolare fortuna non usano di entrare. Latrano essi presso a poco come i cagnuolini; quando si percuotono col bastone, gli saltano sopra e lo afferrano così tenacemente coi denti, che si lasciano sollevare e trasportare a qualunque distanza senza volerlo lasciare; si scavano delle tane sotterra, e vanno come le talpe a mangiar le radici, si radunano in certi tempi, e muojono per così dire tutti insieme; sono animosissimi, e si difendono contro gli altri animali: non si sa bene d'onde vengano; il popolo crede, che cadano colla pioggia (a); il maschio è d'ordi-

ben più di apparenza, che i lemni, come tutti gli altri ratti si mangino, e si distruggano scambievolmente dacchè il pascolo loro manca, e perciò la loro distruzione è pronta come il loro nascimento.

- (a) *Bestiolæ quadrupedes, lemmar vel lemmus dicte, magnitudine soricis, pelle variâ per tempestates & repentinos imbres incompertum unde, an ex remotioribus insulis & vento delatæ an ex nubibus feculentis natæ deferantur. Id tamen compertum est statim atque deciderint, reperiri in visceribus herbæ crudæ nondum concoctæ. Hæ more locustarum in maximo examine cadentes*

nario più grande della femmina, ed ha pure le macchie nere più grandi ; muojono infallibilmente al rinascere delle erbe ; vanno in truppa sull' acqua quando è bello il tempo, ma a un soffio di vento sono tutti sommersi ; il numero di questi animali è così prodigioso, che quando muojono, l'aria n'è infetta, e quindi nascono molte malattie ; pare altresì, che infettino le piante, che hanno rosecchiate, perchè il pascolo fa allora morire il bestiame ; la carne dei lemni non è buona da mangiare, e la lor pelle quantunque d'un bel pelo, non può servire per pelliccia, perchè è troppo consistente .

omnia rarentia destruunt & quæ morfu tantum attigerint emoriuntur virulentia ; vivit hoc agmen donec non gustaverit herbam renatam . Conveniunt quoque gregatim quæ hirundines evoluturæ , sed flato tempore aut moriuntur acervatim cum lue terræ (ex quarum corruptione aer fit pestilens & afficit incolas vertigine & ictero) aut his bestiis dictis vulgariter Lekat vel Hermelin consumuntur unde iidem Hermelini pinguescunt . Ol. Mag. Hist. Gent. sept. , pag. 142.



LA SARICOVIENNA (a).

„ **L**A saricovienna, dice Thevet, si tro-
 „ va lungo il fiume della Plata; essa è
 „ di una natura anfibia dimorando più in
 „ acqua, che in terra; questo animale è
 „ grande come un gatto, e la sua pelle,
 „ che è mista di bigio e di nero è liscia
 „ come velluto; i suoi piedi son fatti a
 „ somiglianza di quelli d'un uccello acqua-
 „ tico; del resto la sua carne è delicatissima,
 „ ed ottima da mangiare (b) „. Io incomin-
 cio con riferire questo tratto, perchè i Na-
 turalisti non conoscevano questo animale sot-
 to questo nome, ed ignoravano, che il Ca-

(a) *Saricovienna*, nome di questo animale nel paese della Plata, e che noi abbiamo adottato. Questa parola *saricovienna* par derivata da *Carigueibeju*, ch'è il nome di questo animale al Brasile, e che si dee pronunziare *sarigovion*: questo nome significa *bestia ghiotta*, secondo Thevet.

Jiya, qua & *Carigueibeju* appellatur à *Brasiliensibus*. *Maregr. Hist. nat. Bras.*, pag. 234., fig. ibid.

Lutra nigricans caudà depressà & glabrà. Barrère. *Hist. de la Fr. Equin.*, pag. 155.

Lutra atrì coloris maculà sub gutture flavà.....
lutra Brasiliensis. La lontra del Brasile Brissl. *Reg. anim.*, pag. 278.

(b) *Singularités de la France antarctique*, par André Thevet. *Paris*, 1558., pag. 107. & 108.

rigueibea del Brasile, che è lo stesso, avesse membrane fra le dita dei piedi; infatti Marcgrave, che ne dà la descrizione, non parla di questo carattere, il quale nondimeno è essenziale, poichè avvicina quanto è possibile questa specie a quella della lontra.

Io credo ancora che l'animale di cui Gumilla fa menzione sotto il nome di *Guachi* (a), potrebbe essere lo stesso che la saricovienna, e che sia una specie di lontra comune in tutta l'America meridionale. Per la descrizione, che ne fa Marcgrave e Desmarchais (b), sem-

(a) Si trova nei fiumi, che si scaricano nell'Orénoque una gran quantità di cani d'acqua, che gl' Indiani appellano *Guachi*; questo animale nuota con molta leggierezza e si nutre di pesci; è anfibio, ma viene a cercare il suo pastico in terra; scava delle fosse sulle rive, in cui la femmina depone i parti. Non iscava queste fosse segnatamente, ma nei siti, in cui vivono in comune, e dove vengono a diportarsi. Io ho vedute ed esaminate diligentemente le loro tane, nulla si potrebbe vedere di più pulito; non vi lasciano il menomo filo d'erba all'intorno; ammucchiano in diporto le spine dei pesci che mangiano, ed a forza di saltare, andare e venire formano una strada bellissima e comodissima. *Histoire de l'Orénoque, par Gumilla, Tom. III., pag. 29. Nota.* Questi caratteri convengono alla saricovienna, ma sembraci, che il nome *guachi* sia stato qui mal applicato, e che appartenga alla specie di muffetta, che noi abbiamo appellato *conso*.

(b) *Voyage de Desmarchais, Tom. III., pag. 306.*

114 *Stor. Nat. della Saricovienna.*

bra, che questo animale anfibio sia della grandezza di un cane di mezzana statura, e che abbia la cima della testa rotonda come il gatto; gli occhi rotondi, piccoli e neri; le orecchie ritonde e situate al basso; cinque dita ad ogni piede, i pollici più corti degli altri diti, i quali tutti sono armati d'unghie brune e acute; la coda lunga come le gambe di dietro; il pelo assai corto e morbido, nero in tutto il corpo, bruno sulla testa con una macchia bianca alla gola. Il suo grido è simile a quello di un cagnolino, e lo interrompe talvolta con un grido diverso simile alla voce del fagino: esso vive di granchi marini e di pesci, ma si può nutrire altresì con farina di manioca sciolta nell'acqua. La sua pelle fa una buona pelliccia, e quantunque mangi molto pesce, non ha la carne il sapore di palude, ma è per lo contrario sanissima e ottima da mangiare.



UNA LONTRA DEL CANADA'.

Questa lontra assai più grande della nostra, e che debb' essere nel nord dell' Europa, siccome trovasi nel Canada, mi ha offerta l'occasione di cercare, se non era lo stesso animale che Aristotele ha indicato sotto il nome di *Latax*, ch' egli dice essere più forte e più grande della lontra; ma le nozioni, ch' egli ne dà non conformandosi interamente a questa grande lontra, e trovandola per altronde assolutamente simile alla lontra comune fuori che nella grandezza, ho giudicato, che non era altrimenti una specie particolare, ma una semplice varietà in quella della lontra. E siccome i Greci e massimamente Aristotele sono stati guardinghi nel dare nomi diversi, fuor che ad animali realmente per la specie diversi, ci siamo convinti, che il *latax* è un altro animale; altronde le lontre, come i castori sono comunemente più grandi, ed hanno il pelo più nero e più bello in America (a) che in Europa. Questa lontra del Canada

(a) Le lontre dell' America settentrionale sono diverse da quelle di Francia nell' essere tutte comunemente più lunghe e più nere; se ne trovano alcune che lo sono più delle altre, ven' ha pure di nere, come Pjay: queste sono assai cercate e care. *Description de l'Amérique septentrionale par Denys, Tom. II., pag. 202*

dee in fatti essere più grande e più nera della lontra di Francia ; ma cercando che possa essere il *Latax* d'Aristotele (cosa ignorata da tutti i Naturalisti) ho conghietturato , che era l'animale indicato da Belon sotto il nome di *lupo marino* , ed ho giudicato di dover qui riferire le notizie di Aristotele sopra il *latax* ; e quella di Belon sul lupo marino , affinchè possa farfene il paragone (a).

Aristotele fa menzione in questo tratto di sei animali anfibi ; e di questi sei non ne conosciamo che tre , la foca , il castoreo e la lontra ; gli altri tre , che sono il *latax* , il *fatherion* , e il *satyrion* sono rimasti incogniti , perchè non sono indicati , che dai nomi senza alcuna descrizione : in questo caso , siccome in tutti quelli , in cui non si può formare alcuna induzione diretta per la co-
gni-

(a) *Sunt inter quadrupedes ferasque , quæ victum ex lacu & fluviiis petunt , at vero a mari nullum , præterquam vitulus marinus . Sunt etiam in hoc genere fber , fatherium , satyrium , lutris , Latax quæ latior lutre est , dentesque habet robustos , quippe quæ noctu plerumque egradiens , virgulta proxima suis dentibus ut ferro præcidat ; lutris etiam hominem mordet , nec desistit , ut ferunt , nisi ossis fracti crepitum senserit . Latucipilus durus , specie inter pilum vituli marini & cervi . Arist. Hist. anim. lib. VIII. , cap. v. — Il lupo marino . „ Poichè gl' Inglese non hanno „ lupi nelle loro terre , la natura gli ha provveduti „ di una bestia alla sponda del loro mare , che „ tanto si accosta al nostro lupo , che se non*

gnizione della cosa, è duopo ricorrere al mezzo dell'esclusione; ma non si può usarlo con felice riuscimento, se non quando si conosce pressò a poco totalmente: si può allora dal positivo concludere al negativo, e questo negativo diventa per tal mezzo una cognizione positiva. Per esempio, io credo pel lungo studio, che ne ho fatto, di conoscere quasi compiutamente tutti gli animali quadrupedi; io so, che Aristotele non poteva avere alcuna cognizione di quelli, che sono particolari al continente dell'America; conosco altresì tra i quadrupedi tutti quelli, che sono anfibi, ed io ne distinguo da principio gli anfibi d'America, come sono il tapir, il cabiai, l'ondatra ec. mi rimangono gli anfibi del nostro continente, che sono l'ip-

Tom. XXVII. I

„ fosse ghiotto piuttosto dei pesci, che delle
 „ pecore si direbbe del tutto simile alla nostra
 „ bestia tanto rapace, considerata la corpulen-
 „ za, il pelo, la testa (che tuttavia è assai
 „ grande), e la coda molto simile al lupo ter-
 „ restre; ma siccome questo (come si è detto)
 „ non vive che di pesci, e non è stato altri-
 „ menti noto agli Antichi, così non mi è sem-
 „ brato meno rimarchevole degli animali di dop-
 „ pia vita di sopra mentovati, laonde ne ho
 „ voluto mettere il ritratto. „ *Belon, de la na-
 ture des poissons, pag. 18. Nota.* La figura è alla
 pag. 19, e somiglia più all'iena, che a verun
 altro animale, ma non può essere l'iena, per-
 chè non è anfibia, essa non vive di pesci, ed
 altronde è di un clima affatto diverso.

popotamo, la *morfa* o la vacca marina, le foche o i vitelli marini, il lupo marino di Belon, il castoro, la lontra, il gibellino, il ratto d'acqua, il *desman*, il topo d'acqua, e se si vuole ancora l'icneumone o mangosta, che alcuni hanno riguardato come anfibia, e lo hanno appellato *lontra d'Egitto*. Io sottraggo a questo numero la *morfa* o vacca marina, la quale non trovandosi, che nei mari del Nord, non era nota ad Aristotele, ne sottraggo pure l'ippopotamo, il ratto d'acqua e l'icneumone, perch'egli ne parla altrove, e gli indica coi loro nomi; finalmente ne tolgo le foche, il castoro e la lontra, che sono noti, e il topo d'acqua, che è troppo simile a quello di terra per essere distinto col nome; ci rimane il lupo marino di Belon, il gibellino, il *desman* in luogo del *latax*, del *satherion* e del *satyrion*; di questi tre animali non v'è che il lupo marino di Belon, che sia più grosso della lontra, però è il solo, che possa rappresentare il *latax*, per conseguenza il gibellino e il *desman* rappresentano il *satherion* e il *satyrion*. Ben si comprende, che queste conghietture, che io credo fondate, non sono del numero di quelle, che possa il tempo vieppiù rischiarare, eccetto che non si scoprissero alcuni manoscritti greci fino al presente ignoti, in cui questi nomi si trovassero usati, cioè spiegati con nuovi contrassegni.





LA LONTRA DEL CANADA

Ram. Jr.

DESCRIZIONE

D'UNA LONTRA DEL CANADA.

Questa lontra [tav. VIII.] trovasi nel Gabinetto sotto il nome di *lontra del Canada*; cui è paruta somigliantissima alla nostra per la forma della testa, del corpo, della coda, delle gambe e dei piedi, poichè ha delle alette fra le dita; ma è grandissima, e ha circa due piedi e dieci pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'origine della coda, ch'è lunga un piede e cinque pollici; la lunghezza totale adunque di questa lontra è di quattro piedi e tre pollici, comprendovi quella della coda, mentre la lontra che ha servito di soggetto per la descrizione di quest'animale nel *Tomo XIV.* di quest'Opera, e la lontra, la cui descrizione è stata riferita dal Sig. Perrault nella terza Parte delle *Memorie per servire alla Storia Naturale degli animali*, non avevano ciascuna che tre piedi due o tre pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'estremità della coda. Ma il Sig. Brisson, nella sua Opera intitolata *il Regno animale*, dà le misure d'una lontra del nostro paese, che aveva quattro piedi e un pollice di lunghezza, dall'estremità del muso fino all'estremità della coda, e che per conseguenza non era che di due pollici men lunga che la lontra del Canada, di cui qui si parla. Questa

lontra ha pure due specie di peli come la nostra : la lanugine è grigia-bianca sulla maggior parte della sua lunghezza : i peli lunghi e sodi sono di questo stesso colore sulla metà della loro lunghezza, cominciando dalla radice, ma l'altra metà di questi lunghi peli e la punta della lanugine, invece d'essere di color bruno su tutta la parte superiore dell'animale dall'estremità del muso fino alla coda, sulla faccia esteriore delle gambe e sul lato superiore della coda, come nella nostra lontra, sono di color fulvo. I lunghi peli dei lati della testa, della mascella inferiore, del disotto e dei lati del collo, del petto, del ventre, delle ascelle, delle anguinaglie, e della faccia interna delle gambe, sono di color biancastro come sulla nostra lontra; ma il pelo de' piedi e del disopra della testa è di color fulvo come quello del dorso, senza tinta nericcia.

La lontra del Canada, ch'è il soggetto di questa descrizione, non è dunque diversa dalla nostra lontra che per tinta di bruno e di nericcio che non si trovano sul suo pelo: esso ha forse perdute queste tinte per l'impressione del vapore del zolfo, a cui è stato sovente esposto per preservarlo dagli insetti, e quand'anche esso non si fosse accidentalmente scolorato, siffatta differenza di colore non mi parrebbe bastare per caratterizzare una specie di lontra differente da quella del nostro paese.

DESCRIZIONE

DELLA PARTE DEL GABINETTO

Spettante alla Storia Naturale

DEL PIPISTRELLO FERRO DI LANCIA,
 DEL MARGAY, DEL CHACAL
 E D'UNA LONTRA DEL CANADA'.

Num. MCCLXVII.

Un pipistrello ferro di lancia.

Questo pipistrello è conservato nello spirito di vino: la sua descrizione si trova in questo Tomo, pag. 6.

Num. MCCLXVIII.

Un margay.

Quest' animale è disseccato e imbottito, ed ha servito di soggetto per la descrizione del margay. Effo fu mandato da Cajenna al Sig. de Bombarde, che ne fece un presente al Gabinetto.

Num. MCCLXIX.

Lo scheletro del chacal.

Gli ossi di questo scheletro furono preparati in Tripoli di Siria dal Sig. Gauthier, Chirurgo del Re. La loro descrizione e le loro misure si trovano nella descrizione del chacal.

Num. MCCLXX.

Una lontra del Canada.

HO descritto quest' animale alla *pagina* 118. di questo Tomo, e l'ho paragonato alla lontra del nostro paese. Quella del Canada, di cui qui si parla, è disseccata e imbottita: sotto la pelle si son lasciati gli ossi della testa, delle gambe, dei piedi e della coda. Veggonsi de' denti, che rassomigliano a quelli della nostra lontra.



LE FOCHE, LE VACCHE MARINE E I LAMANTINI.

A Duniamo per un momento tutti gli animali quadrupedi, formiamone un gruppo, o piuttosto raccogliamogli in una truppa, i cui intervalli e ordini rappresentino presso a poco la prossimità o lontananza, che si trova in ogni specie; collochiamo nel centro i generi più numerosi, ed ai lati, ed alle ale i più scarsi; ristrigniamoli tutti in un breve spazio per vederli meglio; e troveremo, che non è possibile ritondare questo ricinto: che quantunque tutti gli animali quadrupedi sieno più uniti in fra di loro, che cogli altri esseri, se ne trovano nondimeno in molto numero, che sporgono fuori, e pare che si slancino per congiugnersi ad altre classi della Natura; le scimie inclinano ad avvicinarsi all' uomo, e vi si accostano in fatti assai vicino; i pipistrelli sono le scimie dei volatili, che imitano col volo; i porci-spinosi, i ricci marini per le spine, onde sono ricoperti, pare che ci indichino, che le penne potrebbero appartenere ad altri, fuor che agli uccelli; i tatous pel loro copperchio squamoso si accostano alla tartaruga ed ai crostacei; i castori per le squame della

lor coda rassomigliano ai pesci ; i formichieri per la loro specie di becco o di tromba senza denti , e per la loro lingua prolissa ci ricordano nuovamente gli uccelli ; alfine le foche, le vacche marine e i lamantini formano un piccolo corpo distinto , che forma una punta la più sporgente per unirsi ai cetacei .

Queste parole *foca* , *vacca marina* e *lamantino* sono denominazioni generiche anzi che nomi specifici ; noi comprendiamo sotto quella di foca 1.^o la *foca* degli Antichi , che verisimilmente è quella , che abbiamo fatta rappresentare ; 2.^o la foca comune , che noi appelliamo *vitello marino* ; 3.^o la grande foca , di cui il Sig. Parsons ha data la descrizione e la figura nelle Transazioni filosofiche , n. 469. ; 4.^o la grandissima foca , che si nomina *leone marino* , e di cui l'autore del viaggio d'Anson ha data la descrizione e le figure .

Col nome di *vacca marina* noi intendiamo quegli animali che si conoscono volgarmente sotto tal nome o di *bestie dal grande* , di cui conosciamo due specie , l'una che non si trova , che nei mari del nord , e l'altra , che non abita al contrario , che nei mari del mezzodì , a cui abbiamo dato il nome di *Dugon* , di cui abbiamo fatta delineare la testa ; finalmente sotto quello di *lamantino* comprendiamo gli animali , che diconsi *Manati* , buoi marini a S. Domingo , a Cajenna e nelle altre parti dell' America meridionale , come pure il

lamantino del Senegal e degli altri luoghi dell' Africa , i quali a nostro parere non sono che una varietà del lamantino dell' America .

Le foche e le vacche marine sono ancora più vicine ai quadrupedi , che ai cetacei , perchè hanno quattro specie di piedi , ma i lamantini , che non hanno che i due anteriori , sono più cetacei , che quadrupedi , e del tutto diversi dagli altri animali per un carattere singolare ; sono essi i soli , che possono vivere del pari e nell'acqua e nell'aria , conseguentemente i soli , che si debbono appellare *anfibi*. Nell'uomo e negli animali terrestri e vivipari , il buco della divisione del cuore , che permette al feto di vivere senza respirare , si chiude al momento che nasce , e resta chiuso per tutta la vita ; in questi animali al contrario è sempre aperto , quando la madre li partorisca in terra , poichè al momento della nascita l'aria dilata loro i polmoni , e la respirazione incomincia e si opera come in tutti gli altri animali . In mezzo di questa apertura nella divisione del cuore sempre sussistente , e che permette la comunicazione del sangue della vena cava all' aorta , questi animali hanno il vantaggio di respirare quando lor piace , e di lasciare quando è loro necessario . Questa proprietà singolare è comune a tutti ; ma ciascuno ha delle altre facoltà particolari , di cui parleremo facendo la storia di tutte le specie di questi animali *anfibi* .

LE FOCHE (a).

In generale le foche hanno la testa rotonda come l'uomo, il muso largo come la lontra, gli occhi grandi e collocati in alto, poco o nulla di orecchie esteriori, solamente due forami uditorj ai lati della testa, dei mustacchi intorno alla bocca, dei denti molto simili a quelli del lupo, la lingua forcuta o piuttosto scavata in punta, il collo ben disegnato, il corpo, le mani e i piedi co-

(a) *Phoque*. *Phoca* in Greco e in Latino, parola, a cui de Laet, ed altri hanno data una terminazione francese, e che noi abbiamo adottato come termine generico. In molte lingue dell'Europa fu indicato questo animale colle denominazioni di *Vitelli di mare*, *Cani di mare*, *Lupi di mare*, *Vitelli marini*, *Lupi marini*, *Volpi marine*. Noi ne conosciamo tre, e forse quattro specie: 1. la piccola foca nera di pelo ondeggiante e lungo, che noi crediamo che sia la foca degli Antichi, cioè il *Φάξ* d'Aristotele, e il *vitulus marinus* o *phoca* di Plinio, ed è probabilmente quella, di cui Bellone ha data la figura, e che ha indicato sotto il nome di *phoca*, *vitulus marinus*, *vecchio marino*, vitello o lupo di mare. *De la nature des poissons*, pag. 16.: 2. la foca del nostro Oceano ch'è più grande, e d'un pelo bigio, che si chiama *vitello marino*, ed a cui conserviamo questa denominazione in mancanza di altra, ed altresì per non cadere in errore adottando un nome straniero, che potrebb'essere quello di un'altra specie; noi crediamo

perti d'un pelo corto e molto ruvido, non braccio, nè avan-braccio apparente, due pelli, che congiungono cinque dita terminate da cinque unghie; due piedi senza gambe del tutto simili alle mani, soltanto più larghi e ripiegati in dietro come per unirsi ad una coda cortissima, che accompagnano ai due lati, il corpo prolungato come quello di un pesce, ma gonfio verso il petto, stretto alla parte del ventre, senza anche, senza groppa e senza cosce esteriori; animale tanto più straniero, quanto più sembra fittizio, e perocchè esso è il modello, su cui la fantasia

I 6

nulladimeno, che questo animale sia quello, che i Tedeschi appellano *Rubbe* o *Sidl*, gl'Inglese *Soile*, gli Svezze *Sial*, i Norvegesi *Manbe*, ed è certamente lo stesso, che i Signori dell'Accademia delle Scienze hanno indicato, come noi, sotto lo stesso nome di *Vitello marino*, e di cui hanno data la figura e la descrizione, pag. 189. *Et planche XXVII. de la partie I. de Mémoires pour servir à l'Histoire des animaux*. Finalmente ci sembra, che sia ancora lo stesso, di cui de Laet ha esposta la figura, e eh' egli chiama *cane marino* o *foca*. *Description des Indes occidentales*, pag. 41. Io non cito gli altri Autori, perchè hanno copiate le figure da questi, o ne hanno pubblicate delle difettose: 3. La gran foca, di cui il Sig. Parsons ha data la descrizione e la figura nelle *Trasfazioni Filosofiche*, num. 469. 4. Il leone marino, di cui si trova la descrizione e la figura nel viaggio d'Anson, pag. 100., e che potrebb' essere lo stesso, che la gran foca descritta dal Sig. Parsons.

de' Poeti ha creati i Tritoni, le Sirene, e gli Dei del mare dal capo d'uomo, dal corpo di quadrupede, dalla coda di pesce; e la foca regna infatti in questo muto impero colla sua voce, colla sua figura, col suo intendimento, colle facoltà, in una parola, che le sono comuni cogli abitatori della terra così superiori a quelle dei pesci, che sembrano non pure di un altro ordine, ma d'un mondo diverso; però questo anfibio, quantunque d'una natura lontanissima da quella dei nostri animali domestici, non lascia d'essere suscettibile d'un metodo di educazione; si mantiene ponendolo spesso nell'acqua, le si insegna a salutare colla testa e colla voce, si accostuma a quella del suo padrone, viene quando ode chiamarsi, e dà parecchi altri segni d'intendimento e di docilità (a).

Ha il cervello e il cervelletto a proporzione più grande di quello dell'uomo, i sentimenti buoni come quelli di ogni quadrupede; e pronto del pari l'intendimento; l'una e l'altra cosa si conosce dalla sua dolcezza,

(b) *Vituli marini accipiunt disciplinam, voceque pariter & visu populum salutant; incondito fremitu nomine vocati respondent. Plin. Hist. nat. lib. IX., cap. XIII.* — Un marinajo Olandese avea talmente addimesticato un vitello marino, che gli facea fare cento specie di buffonerie. *Voyages de Missen, Tom. III., pag. 113.*

dalle sue abitudini comuni, dalle sue sociali qualità, dal suo istinto vivissimo per la sua femmina, e attentissimo pe' suoi parti, dalla sua voce (a) più espressiva e più modulata di quella degli altri animali; ha pure forza ed armi, forte è il suo corpo e grande, i denti taglienti, l'unghie acute; altronde ha de' vantaggi singolari ed unici sopra tutti quegli, che si vorrebbero paragonare con esso; non teme nè il freddo, nè il caldo, vive indifferentemente di erba, di carne o di pesce; abita del pari nell'acqua, nella terra e nel ghiaccio; è colla vacca marina il solo de' quadrupedi, che merita il nome di *anfibia*, il solo, che ha il foro ovale del cuore aperto (b), il solo conseguente-

(a) Udiamo sovente di notte sulle coste del Canada la voce dei lupi marini, che somiglia quasi a quella dei gusi. *Histoire de la nouvelle France, par l'Esкарbot*. Paris, 1612., pag. 600. — Quando fummo giunti all' Isola di Giovanni Fernandes, abbiamo sentito a gridare i lupi marini giorno e notte, gli uni belavano come agnelli, gli altri latravano come cani o urlavano come lupi. *Voyages de Woodes Rogers*, pag. 206.

(b) Siccome le foche sono destinate a stare lungo tempo nell'acqua, e che il passaggio del sangue pel polmone non può farsi senza respirazione; hanno esse il foro ovale qual'è nel feto, quando cessa di respirare; questa è un'apertura situata al di sotto della vena cava; ed è una comunicazione del ventricolo destro del cuore col sinistro, che fa passare direttamente il sangue della

mente, che possa omettere di respirare, ed a cui l'elemento dell'acqua sia conveniente, ed acconcio come quello dell'aria; la lontra e il castoreo non sono veri anfibi, poichè il loro elemento è l'aria; e non avendo questa apertura nella divisione del cuore, non possono restare lungo tempo sott'acqua, e sono costretti uscirne o sollevare la testa per respirare.

Ma questi vantaggi, i quali sono grandissimi, sono compensati da imperfezioni, che sono anche maggiori. Il vitello marino è monco o piuttosto storpiato in quattro membri, le braccia, le cosce e le gambe sono quasi del tutto chiuse nel corpo; non ne escono al di fuori che le mani e i piedi, i quali sono veramente tutti divisi in cinque dita; ma queste non sono mobili separatamente, essendo congiunte da una forte membrana, e queste estremità sono piuttosto alette, che mani e piedi, specie anzi di arnesi fatti per nuotare e non per camminare; altronde i piedi essendo ripiegati in dietro, come la coda, non possono sostenere il corpo dell'animale, il quale quando è sopra terra

cava nell'aorta, e gli risparmia il lungo viaggio, che dovrebbe fare pel polmone. *Histoire de l'Académie des Sciences, depuis 1666., Tom. I., pag. 84.*

è costretto di strisciarsi come un rettile (a), e con un moto penoso; perchè il corpo non potendosi inarcare, come quello del serpente, per prendere successivamente diversi punti di appoggio, e per tal modo inoltrare la reazione del terreno, la foca giacerebbe nello stesso sito, senza la bocca e le mani, onde stringe ciò a che può appigliarsi, e se ne serve con tanta destrezza, che sale prestamente su un' alta riva, sopra uno scoglio, e per fino sopra i banchi di ghiaccio comechè ripidi e sdruciolevoli (b). Cammina altresì

(a) I lupi marini, che alcuni chiamano *vitelli marini* delle coste del Canada, sono grossi come alani; dimorano quasi sempre nell'acqua, non dipartonsi mai dalle rive del mare. Questi animali si strisciano anzi che camminare, perchè essendo fuori dell'acqua non fanno più che sdruciolare sull'arena o sul loto Le femmine depongono i loro parti sulle rupi o sulle isolette vicine al mare. Questi animali vivono di pesci; cercano i paesi freddi. *Voyage de la Hon-tan, Tom. II., pag. 45.* — Sollevandosi coll' estremità del corpo coll' ajuto delle loro ale, e traendosi la parte posteriore sotto ad essi, ribalzano, per così dire, e vibrano il corpo nella parte anteriore, traendosi dietro la posteriore, e saltando altresì colla parte dinanzi alternativamente, vanno e vengono in questo modo, finchè sono in terra. *Voyage de Dampier, Tom. I., pag. 117.*

(b) I vitelli marini hanno denti taglientissimi, co' quali troncherebbono un bastone della grossezza di un braccio, quantunque sembrino sciancati

più velocemente di quello che si possa immaginare, e spesso quantunque ferito si sottrae colla fuga al cacciatore (a).

Le foche vivono in società, o almeno molte insieme; il loro clima naturale è il Nord, quantunque possano esse vivere anche sotto alle Zone temperate, e ne' climi caldi; perchè se ne trovano alcune sulle rive di quasi tutti i mari dell' Europa, e fino nel Mediterraneo; se ne trovano pure nei mari meridionali dell' Africa e dell' America (b);

nell' andatura di dietro, si arrampicano su i banchi di ghiaccio dove dormono.... I vitelli marini, che abitano sulle rive sono più grassi, e rendono più olio di quelli, che abitano su i ghiacci.... Si trovano talora i vitelli marini sopra banchi di ghiaccio così rilevati e dirupati, che fa meraviglia il pensare, come vi sieno saliti, e il vederne spesso attaccati venti o trenta.
Description de la pêche de la Baleine, par Zörgdruger, pag. 193.

(a) Ho dati più colpi di spada a un vitello marino, il quale tuttavia corse più velocemente di me, e si gittò nell'acqua, da cui non lo vidi più uscire. *Recueil des voyages du Nord, Tom. II., pag. 130.*

(b) Vi sono molti vitelli marini nelle parti settentrionali dell' Europa e dell' America, e nelle parti meridionali dell' Africa, come nei contorni del capo di Buona speranza e nello stretto Magellanico, e quantunque io non ne abbia mai veduti nell' Indie occidentali, fuorchè nella baja di Campeche, ven' ha nondimeno su tutta la costa del mare meridionale dell' America dalla terra del Fuoco fino alla linea equinoziale, ma

ma sono infinitamente più comuni, più numerose nei mari settentrionali dell' Asia, dell' Europa (a) e dell' America, e se ne trovano pure in gran numero in quelli, che sono vicini all' altro polo nello stretto Magellánico all' Isola di Juvan Fernandes, ec. (b).

a lato del Nord della linea, non ne ho mai veduti, che a gradi ventuno di latitudine: nè mai ne ho veduti nelle Indie orientali. *Voyage de Dampier*, Tom. I., pag. 118.

- (a) *In mari Botnico & Finnico maxima vitulorum marinarum sive phocarum multitudo reperitur.* Olai Magni, *de Gent. sept.* pag. 163 — Si trovano nella Groelandia molti vitelli marini sulla costa dell' ovest, pochi verso lo Spitzberg... I più grandi vitelli marini hanno d'ordinario da cinque fino ad otto piedi di lunghezza, e il loro grasso rende l'olio migliore.... come del pari godono di stare sul ghiaccio che in terra, se ne vedono truppe di cento adunati sopra uno stesso banco di ghiaccio... Il sito dove si prendono i vitelli marini è principalmente tra' settantaquattro e settantafette gradi sui confini dei ghiacci dell' ovest. Se ne prendono pure assai annualmente nello stretto di Davis e vicino alla Zembla. *Description de la pêche de la Baleine*, par Cornelle Zorgdrager. Nuremb. 1750., Vol. I. in 4., pag. 192.; traduit de l'allemand, par M. le Marquis de Montmirail.
- (b) Nel mese di Novembre i cani marini (*Phocas*) vengono all' isola di Fernandes per partorire; allora sono di così tristo umore, che ben lungi dal ritirarsi all' accostarsi di un uomo, gli si avventano per morderlo, quantunque sia armato di un bastone.... La sponda n'è talvolta tutta coperta a più di un mezzo miglio all' intorno. *Voyage de Woodes Rogers*, Tom. I., pag. 206.

Pare soltanto, che varj la specie, e che secondo i diversi climi cangi per la grandezza, pel colore e per la figura; abbiamo veduti alcuni di questi animali vivi, e ci sono state mandate le spoglie di molti altri; nel numero ne abbiamo trascelte due per farle delineare; la prima è la foca del nostro Oceano, la quale ha molta varietà; ne abbiamo veduta una, le cui proporzioni del corpo sembrano differenti, perchè aveva il collo più corto, il corpo più lungo e le unghie più grandi di quella, onde esponiam la figura; ma queste differenze non ci sono sembrate tali da farne una specie distinta e separata. La seconda, che è la foca del Mediterraneo e dei mari del Mezzodì, e che noi presumiamo essere la foca degli Antichi, pare di un' altra specie, perchè diversa è dalle altre per la qualità e pel colore del pelo, che è ondeggiante e quasi nero, mentre il pelo dei primi è bigio e ruvido; è diverso ancora per la forma dei denti e delle orecchie, perchè ha una specie di orecchia esterna piccolissima laddove le altre non hanno che il forame uditorio senza apparenza di conca; ha pure i denti incisivi terminati da due punte, mentre le altre due hanno questi medesimi denti incisivi uniti e taglienti a retto filo come quelli dei cani, del lupo e di tutti gli altri quadrupedi; ha pure le braccia situate più abbasso, vale a dire, più in dietro del corpo

delle altre , che le hanno collocate più innanzi ; nulladimeno queste diversità non sono forse che varietà dipendenti dal clima , e non differenze specifiche , riflettendo che nei medesimi luoghi , e sopra tutto in quelli , in cui abbondano questi animali se ne trovano di più grandi , di più piccoli , di più grossi , di più sottili , e di colore o pelo diverso secondo il sesso e l'età (a) .

(a) *Canities ut homini & equo sic quoque vitulo marino accidit* . Olai Magni , *de Gent. sept.* , pag. 165. — I vitelli marini sono coperti di peli corti , e di diversi colori , gli uni sono neri e bianchi , alcuni gialli , altri bigj , e se ne vedono di rossi . *Description de la pêche de la Baleine , par Zorndrager* , pag. 191. — Vicino alla baja di San Mattia sulle terre Magellaniche abbiamo scoperte due isole piene di lupi marini in sì gran numero , che non farebbono abbisognate due ore per empierne i nostri cinque vascelli ; sono della forma di un vitello e di diversi colori . *Histoire des Navigations aux terres Australes* . Paris , 1746. , in 4. *Tom. I.* , pag. 127. — I vitelli marini di Spitzberg non hanno tutti la testa foggia alla stesso modo , gli uni l'hanno più rotonda , gli altri più lunga e più scarnata al di sotto del muso . . . Sono essi pure di diversi colori , e maculate come le tigri ; gli uni sono di un nero misto di bianco , alcuni gialli , altri bigj , e tali ancora rossi . . . Non hanno tutti la pupilla dell'occhio di un medesimo colore , gli uni l'hanno d'un color cristallino , gli altri bianco , altri gialliccio , e alcuni rofficcio . *Recueil des voyages du Nord* , *Tom. II.* , pag. 112. *& suivantes* — La pelle del vitello marino è

Egli è per una conformità, che da principio sembra di poco momento, e per alcuni passeggiati rapporti, che abbiamo giudicato, che questa seconda foca era la *foca* degli Antichi; ci è stato assicurato, che l'individuo che abbiamo veduto, veniva dalle Indie, ed è almeno probabilissimo, che venisse dai mari del Levante; era adulto poichè aveva tutti i denti; ed era d'un quinto meno grande delle foche adulte dei nostri mari, e di due terzi più piccolo di quelle del mare agghiacciato; perchè quantunque avesse tutti i denti, non aveva che due piedi tre pollici di lunghezza, mentre quello che il Sig. Parsons ha descritto e delineato, aveva sette piedi e mezzo d'Inghilterra, vale a dire circa sette piedi di Parigi, quantunque non fosse adulto, poichè non aveva che alcuni denti: ora tutti i caratteri che gli Antichi accordano alla loro *foca* non dinotano un animale così grande, e convengono a questa piccola foca, che paragonano spesso al castoreo ed alla lontra, i quali sono di troppo piccola statura per essere paragonati con queste grandi foche

coperta d'un pelo corto a diversi colori; v'ha di questi animali che sono totalmente bianchi, e tutti sono tali nascendo, alcuni a misura, che crescono diventano neri, altri rossi, parecchi hanno tutti questi colori frammischiati insieme. *Histoire de la Nouvelle France, par Charlevoix, Tom. III., pag. 147.*

del Nord ; e ciò , che ha finito di persuaderci , che questa piccola foca è la *foca* degli Antichi , è un rapporto , il quale , comechè falso nel suo oggetto , non può tuttavia essere stato immaginato , che dopo la piccola foca , di cui qui si tratta , e non ha potuto giammai essere stato attribuito alle foche delle nostre coste , nè alle grandi foche del Nord . Gli Antichi parlando della *foca* , dicono , che il suo pelo è ondeggiante , e che per una simpatia naturale segue i moti del mare , che si distende in dietro nel tempo che il mare si abbassa , e che si rialza quando cresce la maréa (a) , e che questo effetto singolare è permanente anche nelle pelli lungo tempo dappoichè sono state divelte e separate dall' animale : ora non si è potuto immaginare questo rapporto nè questa proprietà nelle foche delle nostre coste , nè in quelle del Nord , poichè il pelo d'entrambe è corto ed aspro ; per lo contrario conviene

(a) *Pelles eorum etiam detractas corpori sensum aquarum retinere tradunt semper aestu maris recedente inborrescere . Plin. Hist. nat. lib. IX., cap. XIII.* Severino dice di aver veduto questo miracolo , ma lo esprime con tanta esagerazione , ch' è incredibile ; egli dice ; che quando spira il vento di settentrione , i peli , che si erano rizzati al vento del Mezzo dì , si distendono talmente , che sembrano annientati . *Mémoires pour servir à l' Histoire des animaux , Part. I., pag. 193.*

in qualche maniera a questa piccola foca, il cui pelo è ondeggiante e molto più morbido e lungo di quello delle altre; in generale le foche dei mari meridionali hanno il pelo assai più fino e più morbido (a) di quello dei mari settentrionali; altronde Cardano afferma (b), che questa proprietà, che fu creduta favolosa, è stata trovata reale nelle Indie; senza prestare a questa asserzione di Cardano più fede che non è duopo, indica essa almeno, che questo effetto succede nelle foche dell' India; egli si può sospettare, che realmente ciò altro non sia, che un fenomeno elettrico, di cui gli Antichi e i Moderni ignorando la cagione hanno attribuito l'effetto al flusso e riflusso del mare. Comunque ciò sia, le ragioni che abbiamo di sopra addotte sono sufficienti a far presumere, che questa piccola foca sia la foca degli Antichi, e pare altresì, che sia quella, che Rondelet (c) chiama *Foca del Mediterraneo*, la quale secondo lui ha il corpo a proporzione più lungo e meno grosso della foca dell' Oceano. La grande foca, di cui il Sig. Parsons ha

(a) I vitelli marini dell' isola di Juan Fernandez hanno una pelliccia così fina e corta, che non ne ho veduta simile altrove. *Voyage de Dampier*, Tom. I., pag. 118.

(b) Cardan, *de subtilitate*, lib. X.

(c) Rondelet, *de Piscibus*, lib. XVI.

dare le misure e la figura, e che è venuta verisimilmente dai mari settentrionali, pare di una specie diversa dalle altre due, poichè non avendo ancora denti e non essendo adulta, non lasciava però d'essere più del doppio in grandezza in tutte le sue dimensioni, ed aveva conseguentemente dieci volte più di volume e di massa delle altre. Il Sig. Parsons, secondo che l'ha ottimamente contrassegnata il Sig. Klein (a), ha dette molte cose in poche parole al soggetto di questo animale; siccome le sue osservazioni sono scritte in Inglese, così ho giudicato di dovere farne la traduzione per estratto (b).

(a) Klein, *de quad.*, pag. 93.

(b) Questo vitello marino si vedeva in Londra nell'*Charing cross*, nel mese di febbrajo 1742-3 Le figure esposte d'Aldrovando, Jonston, e d'altri essendo di profilo, ci hanno fatto incorrere in due errori; il primo si è, ch'esse fanno vedere il braccio, il quale non è visibile all'esterno in qualunque positura sia l'animale, il secondo si è, che rappresentano i piedi come due ale, mentre sono due veri piedi colle membrane e con cinque diti o cinque unghie, e i diti sono composti di tre giunture. Le unghie dei piedi anteriori assai grandi e larghi: questi sono molto simili a quelli di una talpa; sembrano fatti per istrisciarsi per terra e per nuotare: vi è una membrana stretta fra ogni dito; ma i piedi di dietro hanno membrane assai più lunghe, e non servono all'animale che per remigare nell'acqua. Questo era femmina, e morì ai se-

Ecco dunque tre specie di foche, che sembrano differenti infra di loro. La piccola foca nera delle Indie e del Levante, il vitello marino o foca dei nostri mari, e la grande foca

dici di febbrajo 1742-3. Aveva intorno alla bocca grandi peli di una sostanza trasparente e cornea. Le viscere erano come il ferro; gli stomachi, gl'intestini, la vescica, i reni, le uretre, il diafragma, i polmoni, i grossi vasi del sangue, e le parti esteriori della generazione erano come nella vacca; la milza aveva due piedi di lunghezza, quattro pollici di larghezza, ed era assai sottile; il fegato era composto di sei lobi, ciascuno di questi era lungo e sottile come la milza; la vescichetta del fiele era assai piccola, il cuore era lungo e tenero nella sua tessitura, avente un foro ovale assai largo, e le colonne carnose assai grandi. Nello stomaco più basso, vi erano in circa quattro libbre di peso di piccole pietre taglienti e angolari, come se l'animale le avesse scelte per tritare il cibo Il corpo della matrice era piccolo al paragone delle due corna, ch' erano grandissime e grossissime. Le ovaje erano assai grosse, e le corna della matrice erano aperte per un gran foro al lato delle ovaje. Io espongo la figura di queste parti . . . come pure quella dell' animale, che io stesso ho diligentemente delineato. Questo animale è viviparo, allatta i suoi parti; la sua carne è sorda e muscolosa; era assai giovane quantunque avesse sette piedi e mezzo di lunghezza, perchè quasi non avea denti, e non avea ancora che quattro piccoli buchi situati regolarmente, e formanti un quadrato intorno all' ombelico, erano questi i vestigi di quattro poppe, che dovevano col tempo comparire. *Trans. Phil.*, num. 469., pag. 383. & 386.

foca dei mari del Nord , ed appunto alla prima specie è duopo riportare quanto gli Antichi hanno scritto della *foca*. Aristotele conosceva molto bene questo animale , quando disse , che era di una natura ambigua e media fra gli animali acquatici e terrestri ; che questo è un quadrupede monco e imperfetto ; che non ha orecchie esteriori , ma solo dei buchi apparentissimi per udire ; che ha la lingua forcuta , poppe e latte , ed una piccola coda come quella del cervo : ma egli pare , che siasi ingannato assicurando , che questo animale non ha fiele ; è certo che almeno ne ha la vescichetta : il Sig. Parsons dice veramente , che la vescichetta del fiele nella grande foca , che ha descritto , era assai piccola ; ma il Sig. Daubenton ha trovata nella nostra foca che ha anatomizzata una vescichetta di fiele proporzionata alla grandezza del fegato , ed i Signori dell' Accademia delle Scienze , i quali pure hanno trovata questa vescichetta del fiele nella foca , che hanno descritta , non dicono , ch' essa fosse d'una piccolezza considerabile .

Del resto Aristotele non poteva avere alcuna cognizione delle grandi foche dei mari agghiacciati , poichè nel suo tempo tutto il Nord dell' Europa e dell' Asia era ancora incognito ; i Greci ed i Romani consideravano i Galli e la Germania come il loro Nord ; i Greci massimamente conoscevano

poco gli animali di questi paesi ; vi è dunque tutta la verisimiglianza che Aristotele , il quale parla della foca come di un animale comune , non abbia inteso con questo nome che la foca del Mediterraneo , e che non abbia conosciute le foche del nostro Oceano più che le grandi foche dei mari del Nord .

Questi tre animali quantunque per la specie diversi , hanno molte proprietà comuni , e debbono essere considerate come di una medesima natura . Le femmine partoriscono d'inverno ; depongono i loro parti in terra sopra un banco d'arena , sopra uno scoglio , o in una piccola isola , ed a qualche distanza dal continente ; stanno diritte per allattarli (a) , e li nutrono in tal modo per dodici o quindici giorni nel sito ove sono nati , dopo i quali la madre li conduce con seco al mare , e loro insegna a nuotare e a procacciarsi il vitto ; e quando sono stanchi li riceve sul dorso . Siccome non ne partorisce che due o tre , così le sue cure non sono divise , e l'educazione loro è presto terminata ; altronde questi animali hanno naturalmente assai d'intendimento e di senso ; s'in-

(a) Quando i vitelli marini sono in mare , i loro piedi posteriori servono ad essi di coda per nuotare , e in terra di sedile , quando danno il latte ai loro parti . *Voyage de Dampier* , Tom. I. , pag. 117.

tendono scambievolmente , si ajutano , si soccorrono ; i parti riconoscono la madre loro in mezzo ad una moltitudine ; distinguono la sua voce , e quando li chiama , vanno ad essa senza ingannarsi (a). Noi ignoriamo quanto tempo si portino dalla madre ; ma a giudicarne da quello dell' aumento , dalla durata della vita , ed anche dalla grandezza dell' animale , pare , che questo tempo debba essere di più mesi , e l' aumento essendo di alcuni anni , la durata della vita dee essere molto lunga ; io sono inclinatissimo a credere , che questi animali vivano assai più tempo che non si è potuto rilevare , forse cento anni e più ; perchè si sa , che i cetacei in generale vivono più lungamente degli animali quadrupedi , e siccome la foca forma una mischianza tra gli uni e gli altri , dee partecipare della natura dei primi , e conseguentemente vivere più che gli ultimi .

La voce della foca si può paragonare al latrato d' un cane fioco : ne' primi anni mette un grido più chiaro quasi come il miagolamento di un gatto ; i parti , che si tolgono alla madre miagolano di continuo , e si lasciano talora morire d' inedia piuttosto che prendere il cibo , che si offre ad essi . Le vecchie foche latrano contro quelli , che

K 2

(a) Voyage de Dampier , Tom. I. , pag. 119. . .

le percuotono, e fanno tutti gli sforzi per mordere e vendicarsi; in generale questi animali sono poco timorosi, ed egualmente animosi. Si è notato, che il fuoco dei lampi o lo strepito del tuono in luogo di spaventarli, pare che li ricrei; escono dall'acqua in tempo di procella; allora abbandonano i loro banchi di ghiaccio per evitare l'urto dei flutti, e vanno a terra a prendersi sollazzo della tempesta e a ricevere la pioggia, che li rallegra assai. Hanno essi naturalmente cattivo odore, e che si fa sentir di lontano: avviene spesso, che quando si perseguitano depongono i loro escrementi, che sono gialli, e di un odore abominevole; hanno essi una prodigiosa quantità di sangue, e siccome hanno altresì un gran pelo di grassia sono perciò di una natura grave e pesante; dormono assai, e d'un sonno profondo (a); amano di dormire al sole, sopra banchi di ghiaccio, sopra gli scogli, e l'uomo si accosta loro senza svegliarli, e questo è il modo più usato da prenderli. Di raro si pigliano con armi da fuoco, per-

(a) *Nullum animal graviore somno premitur. Plurimi quibus in mari utuntur, huius quoque pedum vice serpunt; sursunt deorsumque claudicantium more se moventes. . . . Capitur dormiens vitulus marinus praesertim humano mucrone quia profundissime dormit. Olaf Magni, de Gent. sept., pag. 165.*

chè non muojono repentinamente feriti anche da una palla nella testa; si gittano in mare e sono per gli cacciatori perduti: ma quando si sorprendono addormentati presso, od anche lungi dal mare, giacchè non possono fuggire, che lentissimamente, si uccidono a colpi di pertiche e di bastoni: sono durissimi e vivacissimi; „ non muojono facilmente, „ dice un testimonio oculare, perchè quan- „ tunque sieno mortalmente feriti, e perda- „ no quasi tutto il sangue e sieno anche scor- „ ticati, non lasciano ancora di vivere, e „ fa orrore vederli avvoltolarsi nel loro san- „ gue. Cid è quanto abbiamo osservato ri- „ spetto a quella foca, che noi abbiamo uc- „ cisa, la quale avea otto piedi di lunghe- „ za, perchè dopo di averla scorticata e spo- „ gliata della maggior parte del suo grasso, „ e malgrado tutti i colpi che aveva ricevuti „ sulla testa e sul muso, non lasciava di „ voler mordere ancora; afferrò pure una „ mezza picca, che le fu presentata con tan- „ to vigore come se non fosse stata ferita; „ dopo tuttociò le abbiamo immersa una „ mezza picca a traverso del cuore e del fe- „ gato, donde uscì ancora tanto sangue, „ quanto ne metterebbe un giovenco“. *Rac- colta dei viaggi del Nord. Tom. II. pag. 117. e seg.* Del rimanente, la caccia, o se vuolsi la pesca di questi animali non è difficile e non lascia di essere utile, perchè la carne

non è cattiva da mangiarsi (a); la pelle (b) fa una buona pelliccia; gli Americani se ne

(a) La seconda specie di lupi marini (*phoque*) è più piccola della prima (*rosmar*, o *vacche marine*); depongono pure i loro parti in terra in queste isole (del Tonquet, America settentrionale) sull' arena, sugli scogli, ed ovunque trovino delle alture I selvaggi fanno loro la guerra; la carne n'è buona da mangiare, ne estraggono dell' olio, eh' è un intingolo in tutt' i loro banchetti. Questi lupi marini incagliano in terra in ogni stagione, e poco ne stanno lontani In tempo sereno si trovano su una costa d' arena, o sugli scogli, dove dormono al sole ... Vi sono dei siti, dove arrenano due o trecento in una frotta Si uccidono facilmente Tutto l' olio, che se ne estrae, capisce nella loro vescica, in cui i Selvaggi lo ripongono dopo di avernelo estratto; quest' olio è buono da mangiarsi fresco e per friggere il pesce, è ancora eccellente per abbruciare, non ha nè odore, nè fumo come quello di uliva, e nel barile non lascia nè lordure, nè fecce al fondo. *Description de l'Amérique septentrionale, par Denis, Tom. II., pag. 225.*

(b) Il vitello marino ha, oltre al suo grasso, una pelle, che si vende tre, quattro o cinque scellini a proporzione della sua bellezza e grandezza. *Description de la pêche de la Baleine, par Zorgdager, pag. 196.* — Si adoperava per l' addietro una gran quantità di pelli di lupi marini a fare dei manicotti, ma ora la moda n'è spenta, e il loro maggior uso si è al presente di coprire i bauli e le borse; quando sono tanè sono granite come il marocchino, sono men fine, ma non si spelano così facilmente, e conservano più lungamente tutta la loro freschezza: se ne

servono per fare dei palloni (a), che riempiono d'aria, e di cui servono come di zatte: si estraе dal loro grasso un olio più chiaro e di men disgustoso sapore, che da quello del porco marino o dagli altri cetacei.

A tre specie di foche, di cui abbiам favellato, è forse mestieri di aggiungerne, come abbiам detto, una quarta, di cui l'autore del viaggio d'Anson ha data la figura e la descrizione sotto il nome del *leone marino*; essa è numerosissima sulle coste delle terre Magellaniche e nell' isola di Juan Fernandes nel mare del sud. Questi leoni marini somigliano alle foche o ai vitelli marini, i quali sono molto comuni in questo stesso tratto, ma sono assai più grandi; quando sono compiutamente cresciuti; hanno circa da undici fino a diciotto piedi di lungo, ed in circonferenza da sette o otto piedi fino ad undici. Sono così grassi, che dopo di averne traforata e aperta la pelle, che è grossa un pollice, si trova almeno un piede di grasso prima di arrivare alla carne. Si estrarraono

K 4

fanno delle buonissime scarpe e degli stivaletti, che non ricevono l'acqua; se ne coprono le sedie, il cui legno sia più usato della coperta. *Histoire de la Nouvelle France, par le Père Charlevoix, Tom. III., pag 147.*

(a) La loro pelle serve a fare dei palloni in vece di barchette. *Voyage de Frezier, pag. 75.*

da un solo di questi animali fino cinquecento boccali di olio misura di Parigi: sono tutto insieme molto sanguigni; quando si feriscono profondamente e in molti siti per volta, si vede per ogni parte spicciare il sangue impetuosamente. Un solo di questi animali, a cui fu tagliata la gola, e di cui si è raccolto il sangue, n'empìe due barili, senza misurare quello, che rimaneva nei vasi del corpo. La loro pelle è coperta d'un pelo corto, d'un colore tanè chiaro, ma la coda e i piedi sono nericci; le dita sono congiunte da una membrana, la quale non si estende fino alla estremità, e che in ciascuno è terminata da un unghia. Differiscono dalle altre foche, non pure per la grandezza e per la grossezza, ma per altri caratteri ancora; i leoni marini maschi hanno una specie di grossa cresta o tromba, che loro pende dall' estremità della mascella superiore della lunghezza di cinque o sei pollici. Questa parte non si trova nelle femmine, il che a prima vista le fa distinguere dai maschi, oltre che sono assai più piccole. I maschi più forti si fanno uno stuolo di molte femmine, a cui impediscono, che gli altri maschi si avvicinino. Questi animali sono veri anfibi, passano tutta l'estate nel mare, e tutto l'inverno in terra, ed in questa stagione partoriscono le femmine; non producono che due o tre parti, ch'esse allattano, i quali nascendo sono grossi

come un vitello marino adulto. I leoni marini in tutto il tempo, che sono a terra vivono dell' erba, che cresce sulle rive delle acque correnti, e il tempo, in cui non si palcono, lo impiegano a dormire nel loto; sembrano d'un naturale assai pigro, e si destano difficilmente; ma hanno la precauzione di porre dei maschi intorno i siti, in cui dormono; e dicesi che queste sentinelle si prendono cura di svegliarli, quando alcuno si avvicina. I loro gridi sono molto strepitosi e di diversi tuoni: ora grugniscono come porci, ed ora nitriscono come cavalli; si azzuffano sovente, e sopra tutto i maschi, che si contendono le femmine, e si fanno grandi ferite coi denti. La carne di questi animali non è cattiva da mangiarsi; la lingua massimamente è buona come quella del bue. E' facilissimo ucciderli, perchè non possono nè difendersi, nè fuggire; sono così pesanti, che hanno difficoltà a dimenarsi, e molto più a volgersi indietro; è solo mestieri guardarsi dai loro denti, i quali sono fortissimi, onde potrebbero ferire chi si presentasse ad essi a fronte e troppo da vicino (a).

Per altre osservazioni paragonate con que-

K 5

(a) Voyage autour du Monde, par Anson, pag. 100. & suivantes, in cui si vede la figura del maschio e della femmina.

ste, e per alcuni rapporti, che ne inferiremo, ci sembra che questi leoni marini, che sono alla punta dell' America meridionale si trovino, tolte alcune varietà, sulle coste settentrionali del medesimo continente. Le grandi foche dei mari del Canada, di cui parla Denis, sotto il nome di lupi marini, e ch'egli distingue dai piccoli vitelli marini ordinari, potrebbero essere della medesima specie dei leoni marini delle terre Magellaniche. I loro parti (dice questo Autore, che è molto esatto) sono nascendo più grossi del più grosso porco, che si veda, ed anche più lunghi: ora egli è certo, che le foche o vitelli marini del nostro Oceano non sono sì grandi anche adulti; quello del Mediterraneo, cioè la foca degli Antichi è ancora più piccolo, e non v'è, che la foca descritta dal Sig. Parsons, la cui grandezza convenga a quelli di Denis (a). Il Sig. Parsons non dice da qual mare venisse questa gran foca; ma sia pur venuta dal mare settentrionale dell' Europa, o da quello dell' America, potrebb' essere, che

(a) Si può altresì aggiugnere alla testimonianza di Denis, quella del Padre Cristiano Leclercq, „ ci sono (dice questo Autore) dei lupi marini sulle coste dell' America settentrionale, di cui sono alcuni così grandi e così grossi, come i cavalli e i buoi“. Questi lupi marini si appellano *Ovaspous*. *Relation de la Gaspésie*, pag. 490.

fosse lo stesso che il lupo marino di Denis, e lo stesso pure che il leone marino di Anson; perchè è della stessa grandezza, poichè non essendo adulta, nè vicina ad esserla, avea sette piedi di lunghezza; altronde la differenza più apparente dopo quella della grandezza, che vi è tra il leone e il vitello marino si è, che nella specie del leone marino, il maschio ha una gran cresta alla mascella superiore, ma la femmina ne è senza. Il Sig. Parsons non ha veduto il maschio, e non ha descritto che la femmina, la quale non avea in fatti la cresta, e che somiglia in tutto alla femmina del leone marino di Anson. Aggiungasi a tutte queste conformità un rapporto anche più preciso, vale a dire ciò, che dice il Sig. Parsons, che la sua gran foca avea gli stomachi, e gl'intestini come una vacca, e al tempo stesso l'autore del viaggio di Anson dice che il leone marino non si nutrisce, che di erbe per tutta l'estate; è dunque probabilissimo, che questi due animali sieno istessamente conformati, o piuttosto, che questi sieno gli stessi animali differentissimi delle altre foche, che non hanno che uno stomaco, e che si nutriscono di pesci.

Woodes Rogers avea parlato, prima dell'autore del viaggio d'Anson, di questi leoni marini delle terre Magellaniche, e li ha descritti alquanto diversamente. “ Il leone ma-

„ rino (egli dice) è una creatura assai stra-
„ vagante, d'una prodigiosa grossezza; se ne
„ sono veduti di venti piedi di lunghezza
„ e più, i quali non potevano pesar meno
„ di quattro mila libbre; io ne ho veduti
„ assai di sedici piedi, i quali ne pesavano
„ forse due mila; però mi fa maraviglia,
„ che si possa estrarre tant'olio dal lardo di
„ questi animali. La forma del lor corpo si
„ accosta molto a quella dei vitelli marini,
„ ma hanno la pelle più grossa di quella
„ d'un bue; il pelo corto e ruvido, la testa
„ assai più grossa a proporzione, la bocca
„ molto grande, gli occhi d'una grossezza
„ mostruosa, e il muso, che rassomiglia a
„ quello d'un leone con dei terribili mustac-
„ chi, il cui pelo è così aspro, che potrebbe
„ servire per isteccadenti. Verso la fine del
„ mese di Giugno questi animali vanno sull'
„ isola (di Juan Fernandès) per partorire,
„ e depongono i loro parti a un tratto di
„ facile dal lido del mare; ivi si tratten-
„ gono fino al termine di Settembre senza
„ cangiar sito, e senza prendere alcun nu-
„ drimento, almeno non si vedono man-
„ giare; io stesso ne ho osservati alcuni,
„ che dimoravano otto giorni interi nel loro
„ albergo, da cui non sarebbero partiti,
„ se non gli avessimo spaventati.... Ve-
„ demmo ancora all' isola di *Lobos de la*
„ *Mar*, sulla costa del Perù, nel mare del

„ Sud , alcuni leoni , e assai più di vitelli
„ marini (a).

Queste osservazioni di Woodes Rogers ,
le quali si accordano con quelle dell'Autore
del viaggio d'Anson , pare , che provino al-
tresi , che questi animali vivano d'erbe ,
quando sono in terra ; perchè è poco proba-
bile , che passino senza cibo tre mesi , mas-
simamente allattando i loro parti . Si tro-
vano nella raccolta delle Navigazioni nelle
terre australi molte cose relative a questi
animali , ma nè le descrizioni , nè i fatti ,
ci sembrano esatti : per esempio si è detto ,
che al fianco del porto di Renards , allo
stretto Magellanico (b) vi erano dei lupi
marini così grossi , che il loro cuojo disteso
era largo trentasei piedi ; ma questa è cer-
tamente una esagerazione ; si è detto che
sulle due isole del porto Desire nelle terre
Magellaniche , questi animali somigliano ai
leoni per la parte anteriore del loro corpo ,
avendo la testa , il collo e le spalle fornite
di una lunghissima criniera assai folta (c)
ciò è ancora più esagerato ; perchè questi
animali hanno soltanto intorno al collo un

(a) Voyage autour du Monde , de Woodes Rogers ,
Tom. I. pag. 207. & 223.

(b) Navigations aux terres Australes. Paris , 1756.
Tom. I. pag. 168.

(c) Idem , Ibidem , pag. 221.

po' più di pelo, che sul rimanente del corpo, ma questo pelo non è più lungo di un dito (a). Si è detto altresì, che ci sono di questi animali, i quali hanno più di diciotto piedi di lunghezza; che di quelli, che non ne hanno che quattordici piedi ve n'ha delle migliaja; ma che i più comuni non ne hanno che cinque (b). Ciò potrebbe indurre a credere, che ve ne avesse di due specie, l'una assai più grande dell'altra, perchè l'Autore non dice, che questa differenza proceda da quella dell'età, il che appunto era necessario a dirsi per prevenire l'errore. „Questi animali, dice Coreal (c), „aprono sempre la bocca: due uomini stentano a ucciderne uno collo spiedo, che è l'arme migliore, che possano usare. Una femmina allatta quattro o cinque parti, ed allontana gli altri, che se le avvicinano, dal che io giudico, che abbiano quattro o cinque figlj in un parto“. Questa presunzione è ben fondata, perchè la grande foca descritta da M. Parfons avea quattro poppe situate in guisa, che formavano un quadrato, di cui era cen-

(a) Histoire du Paraguai, par le P. Charlevoix, Tom. VI. pag. 181.

(b) Navigations aux terres Australes, Tom. II. pag. 11.

(c) Voyage de Coreal, Tom. II. pag. 180.

tro l'ombelico . Io ho creduto di dover raccogliere , ed esporre qui tutt' i fatti , che hanno rapporto a questi animali , che sono poco conosciuti , e di cui sarebbe da desiderarsi , che alcun abile Viaggiatore ce ne facesse la descrizione , e quella massimamente delle parti interiori , dello stomaco , degl' intestini , ec. perchè se ci riportiamo alle testimonianze dei Viaggiatori , si può credere , che i leoni marini sieno della classe degli animali ruminanti , che hanno molti stomachi , e che in conseguenza sieno d' una specie molto lontana da quella delle foche o vitelli marini , i quali certamente non hanno , che uno stomaco , e debbono essere posti nel numero degli animali carnivori .

IL MORSO (a)

Ovvero

LA VACCA MARINA .

Il nome di vacca marina , sotto cui il morso è più generalmente conosciuto è stato

(a) Morso , *Morff* , nome di questo animale in lingua Russa , e che noi abbiamo adottato volgarmente *Vacca marina* . Bestia dal gran dente ; *Mors* , in Inglese ; *Walros* o *Walrus* in Tedesco e in Olandese ; *Rosmarus* , in Danimarchese e in Islandese .

mal applicato (a): poichè l'animale che io accenno non somiglia nè punto, nè poco alla vacca terrestre; il nome di elefante di mare, che altri gli hanno dato è meglio immaginato, perchè è fondato sopra un solo rapporto, e sopra un carattere apparentissimo. Il morso ha, come l'elefante, due gran denti d'avorio, ch' escono della mascella superiore, ed ha la testa formata, o piuttosto sformata alla stessa guisa dell' elefante, a cui somiglierebbe perfettamente per questa parte principale, se avesse una proboscide; ma il morso è non solo senza questo istromento, che serve di braccio e di mano all' elefante; lo è ancora dell' uso delle vere braccia e delle gambe; questi membri sono come nelle foche celate sotto la pelle, non

Wallrus. Description des Indes occidentales, par de Laët, pag. 41. fig. ibid. *Nota*. Questa figura è stata copiata da Wormius. *Mus. Worm.* pag. 289.
Rosmarus verus. Jonston, de piscibus, pag. 160. Tab. XLIV.

Vache marine. Histoire d'Islande & du Groenland, Tom. II. pag. 159. fig. pag. 168.

Rosmarus. *Phoca dentibus laniariis superioribus exsertis*. Linn. *Syst. Nat. edit. X.* pag. 38.

(a) *Nota*. Questo nome viene forse, come quello del vitello marino, dall' avere il morso e la foca un grido, che imita il muggito d' una vacca o d' un vitello. *Ipsis*, [dice Plinio parlando delle foche] *in somno mugitus, unde nomen vituli*. *Lib. IX. cap. XIII.*

ne sporgono al di fuori , che le mani e i due piedi ; il suo corpo è lungo , gonfio nella parte dinanzi , stretto verso quella di dietro , e in ogni parte coperto di un certo pelo ; le dita dei piedi e delle mani sono avviluppate in una membrana , e terminate da unghie corte e acute , e grosse setole a foggia di mustacchi le cingono la bocca ; la lingua è scavata ; non ha conche nelle orecchie ec. talchè eccettuatine due gran denti , che le cangiano la forma del capo e i denti incisivi , che le mancano all' alto e al basso , la vacca marina somiglia in tutto alla foca ; è soltanto più grande , più grossa , e più forte ; le foche più grandi non hanno al più che sette o otto denti ; la vacca marina ne ha comunemente dodici , e se ne trovano di sedici piedi di lunghezza , e di otto o nove di larghezza . Hanno pure di comune colle foche l'abitare negli stessi luoghi , e si trovano quasi sempre insieme ; hanno molte inclinazioni comuni ; tengonsi entrambe nell' acqua ; salgono su i banchi di ghiaccio ; allattano e allevano nella stessa guisa i loro parti ; e gli nutriscono coi medesimi alimenti ; vivono in società , e viaggiano in truppa ; ma la specie della vacca marina non varia tanto come la foca ; pare , che non vada così lontano , che sia più attaccata al suo clima , e che di rado se ne trovino altrove , fuorchè nei mari del Nord : però la foca

era nota agli Antichi, e la vacca marina no.

La maggior parte dei Viaggiatori, che hanno frequentati i mari settentrionali dell' Asia (a), dell' Europa, e dell' Ameri-

- (a) Si trovano dei denti del morso nei contorni della nuova Zembla e in tutte le isole fino all' Obi; si pretende, che se ne trovino parimente fino nei contorni di Jeniscì, e che ne sieno stati veduti altre volte fino a Pisida: se ne trovano quindi in quantità verso la punta di Schalaginskoi presso gli Schuktschii, dove sono grossissimi.... E' credibile, che si trovino molti di questi animali da questo luogo fino al fiume Anadir, poichè tutti i denti, che si portano per vendere a Jakutzk vengono d' Anadirskoi: se ne trovano pure nello stretto di Hudson all' isola Phelipeaux, dove sono lunghi un' auna [di Russia], e sono grossi come un braccio, essi somministrano del buon avorio, come le zanne degli elefanti [*Voyez les voyages du Nord, Tom. VI. pag. 7.*].....
- „ Ho veduti a Jakutzk alcuni di questi denti
 „ di morso, che avevano cinque quarti di auna
 „ di Russia, ed altri un' auna e mezzo di lunghezza, comunemente sono più larghi che
 „ grossi, hanno fino quattro pollici di larghezza
 „ alla base..... Io non ho udito dire, che
 „ presso di Anadirskoi siasi mai andato alla caccia o alla pesca del morso per averne i denti,
 „ di cui ne vengono in gran quantità; mi è
 „ stato per lo contrario assicurato, che gli abitanti trovano questi denti distaccati dall' animale sulla bassa costa del mare, e che in conseguenza non è mestieri di uccidere prima i
 „ morfi.... Molte persone mi hanno dimandato se i morfi d' Anadirskoi erano una specie
 „ diversa da quelli, che si trovano nel mare

ca (a) hanno fatta menzione di questo animale; ma Zorgdrager (b) ci sembra quello, che ne

„ del Nord, e nell' ingresso occidentale del mare
 „ agghiacciato, perohè i denti di questa parte
 „ sono assai più grossi di quelli d'occidente...
 „ Egli pare, che i morfi della Groelandia e
 „ quelli che sono nella parte occidentale del
 „ mare agghiacciato, non abbiano alcuna comu-
 „ nicazione con quelli, che sono all' Est di
 „ Kolima, e presso alla punta di Schalaginskoi,
 „ e più lontano, vicino ad Anadirskoi.... Lo
 „ stesso è di quelli della Baia d' Hudson, non
 „ pare, che vi si possano aggiugnere quelli dei
 „ Tschuktshi.... nondimeno tutti accordano,
 „ che i morfi d' Anadirskoi non sono diversi
 „ nè per la grossezza, nè per la figura da quelli
 „ di Groelandia, ec. *Voyage de Gmelin en
 Sibérie, Tome III. pag. 148. & suivantes. Nota.*
 Il Sig. Gmelin non iscioglie questa questione,
 a cui tuttavia parmi, che si possa fare una sod-
 disfacente risposta; ciò è, che come dice egli
 stesso, non si va alla caccia di questi animali ad
 Anadirskoi, nè in tutta quella parte orientale
 del mare agghiacciato, e che in conseguenza non
 si portano, che denti di questi animali morti
 naturalmente; però non sorprende, che questi
 denti giunti al compiuto loro aumento sieno più
 grandi di quelli dei morfi di Groelandia, che
 si uccidono sovente in tarda età.

(a) Sulle coste dell' America settentrionale si veg-
 gono pure delle vacche marine altrimenti appel-
 late *Bestie dal gran dente*, perchè hanno due
 grossi denti, e lunghi come la metà del braccio...
 non v'è avorio più bello, se ne trovano all'
 isola di Sable. *Description de l'Amérique septen-
 trionale par Denis, Tom. II. pag. 257.*

(b) *Description de la prise de la baleine & de la*

parli con maggior cognizione, ed ho creduto di dover qui collocare la traduzione e l'estratto di questo articolo della sua opera, che mi è stata comunicata dal Sig. Marchese di Montmirail.

„ Si trovavano per l'addietro nella baia
„ d'Horisont e in quella di Klock molte
„ vacche marine e foche, ma oggidì ve ne
„ rimangono poche assai le une e le
„ altre vengono ne' maggiori caldi dell'estate
„ nelle pianure vicine, e se ne vedono tal-
„ volta truppe di ottanta, cento e fino due-
„ cento, singolarmente di vacche marine,
„ le quali possono dimorarvi per alcuni gior-
„ ni seguiti, e finchè la fame le riconduce
„ al mare: questi animali somigliano molto
„ nell'esteriore alle foche, ma sono più forti
„ e più grossi, hanno cinque dita alle zampe
„ come le foche, ma le unghie sono più
„ corte; la pelle della vacca marina, prin-
„ cipalmente verso il collo è grossa un pol-
„ lice, rugosa e coperta d'un pelo cortissi-
„ mo di varj colori; la mascella superiore
„ è armata di due denti d'una mezz' auna
„ o d'un' auna di lunghezza; queste zanne,
„ che sono cave nella radice s'ingrandiscono

pêche du Groenland, &c. par Corneille Zorgdrager. Nuremberg, 1750. in Tedesco. Nota. Quest' opera è stato da prima scritta in Olandese, e questo estratto si fece sulla traduzione Tedesca.

a misura, che l'animale invecchia; se ne vedono talora di quelle, che non ne hanno che una, avendo perduta l'altra in battaglia, o solo per la vecchiezza; questo avorio è d'ordinario più caro di quello dell'elefante, perchè è più consistente e duro; la bocca della vacca marina è simile a quella del bue, è rivestita nella parte superiore e inferiore di peli voti, acuti e grossi come un fascello di paglia; al di sopra della bocca ha due nari, onde questi animali tramandano acqua come la balena, senza fare strepito alcuno; i loro occhi sono scintillanti, rossi, e infiammati nel caldo di estate; e siccome non possono tollerare l'impressione, che fa l'acqua su i loro occhi, dimorano più volentieri nelle pianure di estate, che in ogni altra stagione.... si vedono molte vacche marine verso Spitzberg... si uccidono in terra con lance.... se ne va alla caccia per l'utile, che si tragge dai loro denti e dal loro grasso; l'olio è pregiato quasi come quello di balena; i loro denti costano quanto il loro grasso; l'interno di quelli ha più valore dell'avorio, sopra tutto dei grossi, che sono d'una sostanza più solida, e più dura dei piccoli. Se si vende un fiorino la libbra l'avorio di quelli, si vende tre fiorini e quattro, e spesso cinque quello dei grossi; un dente mezzano pesa tre lib-

„ bre.... e una vacca marina d'ordinaria
 „ grandezza rende una mezza botte grossa
 „ di olio, però l'animale intero frutta tren-
 „ tasei fiorini, cioè diciotto pe' denti a tre
 „ fiorini per libbra, e altrettanto pel suo
 „ grasso.... altre volte si trovavano nume-
 „ rose squadre di questi animali in terra,
 „ ma le nostre navi, che ogni anno viag-
 „ giano a que' paesi per la pesca delle
 „ balene, le hanno talmente spaventate, che
 „ sonosi rifuggite in luoghi appartati, e
 „ quelle che vi rimangono non vanno più
 „ in moltitudine a terra, ma dimorano nell'
 „ acqua o stanno separate e disperse (a) qua

(a) *Nota.* Convien dire, che il numero di questi
 animali sia prodigiosamente diminuito, o piut-
 tosto, che tutti sienosi ritirati verso le coste an-
 cora sconosciute, perchè si trova nelle relazioni
 dei viaggi al Nord, che nel 1704. vicino all'isola
 di Cherry, a settantacinque gradi quarantacinque
 minuti di latitudine, l'equipaggio di una nave
 Inglese incontrò una prodigiosa quantità di vac-
 che marine tutte coricate le une vicine alle al-
 tre, che erano forse più di mille. Gli Inglese
 non ne uccisero che quindici, ma avendo trovata
 una gran quantità di denti, ne empierono una
 botte; — che prima dei 13 di Luglio uccisero
 cento dei detti animali, di cui non trasportarono
 che i denti.... che nel 1706. altri Inglese ne
 uccisero 100 o otto cento in sei ore; nel 1708.
 più di nove cento in sette ore; nel 1710. otto
 cento in più giorni, e che un uomo solo ne
 uccise quaranta con una lancia.

„ e là sopra i ghiacci; quando si è raggiun-
 „ to uno di questi animali sul ghiaccio o
 „ nell' acqua, si scaglia sopra di essi un ram-
 „ pone forte e fatto espressamente, e spesso
 „ questo rampone sdrucchiola sulla pelle dura
 „ e grossa; ma quando vi è penetrato, si
 „ tira l'animale con un canape verso il ti-
 „ mone della scialupa, e si uccide trapas-
 „ sandolo con una lancia fatta a tale effet-
 „ to, si trae quindi sulla terra più vicina,
 „ o in un banco piano di ghiaccio; d'ordi-
 „ nario pesa più di un bue. S'incomincia
 „ dallo scorticarlo, e se ne gitta via la pelle,
 „ perchè non è buona per nulla (a); si svel-
 „ gono dalla testa con un' accetta i due denti,
 „ o se ne tronca la testa stessa per non of-
 „ fenderli, si fa bollire in una caldaja, e
 „ dopo tutto ciò si taglia il grasso in lun-
 „ ghe fette e si porta alla nave.... Le vac-
 „ che marine difficilmente come le balene
 „ s'inseguono a forza di remi e sovente si
 „ lancia indarno il rampone, perchè oltre
 „ d'essere la balena più facile a toccarsi, il
 „ rampone non le sdrucchiola sopra così fa-

(a) Nota. Zorgdrager ignorava apparentemente, che
 si facesse dell' ottimo cuojo con questa pelle.
 Ho veduti dei cignoni di carrozza, che erano
 fortissimi e fermissimi. Anderson, dice in seguito
 Other, che se ne fanno pure delle cinghie e del-
 le funi di battelli. *Histoire naturelle du Groenland*,
 Tom. II. pag. 160.

„ cilmente , come sulla vacca marina
„ Si percuote spesso per tre volte con una
„ lancia forte e ben aguzza prima di potere
„ traforarle la pelle dura e grossa ; perciò
„ è duopo studiare di coglierla in un sito ,
„ in cui la pelle sia ben tesa , perchè do-
„ vunque acconsente si ferisce con difficoltà ;
„ conseguentemente si drizza la lancia agli
„ occhi dell' animale , il quale costretto per
„ questo moto a girare la testa , fa stendere
„ la pelle verso il petto o all' intorno ; al-
„ lora si avventa il colpo a questa parte , e
„ si ritira la lancia più presto che si può ,
„ per impedire che non l' afferri e non fe-
„ risca il feritore o colla estremità dei denti ,
„ o colla lancia stessa , come più fiate è av-
„ venuto . Nondimeno questo attacco sopra
„ un piccolo banco di ghiaccio non dura mai
„ lungo tempo , perchè la vacca marina fe-
„ rita o no , si gitta rosto all' acqua , e in
„ conseguenza si presceglie l' attaccarla in
„ terra Ma non si trovano questi ani-
„ mali , che nei siti poco frequentati come
„ nell' isola di Møffen dietro Worland , nelle
„ terre , che circondano le baie d' Horisont
„ e di Klock , ed altrove nelle pianure più
„ appartate e sopra i banchi d' arena , a cui
„ le navi non si avvicinano che rare volte
„ assai ; que' medesimi , che vi si trovano
„ ammaestrati dalle persecuzioni che hanno
„ sofferte stanno talmente in guardia , che
„ di-

„ dimorano vicino all' acqua per gittarvisi
„ prontamente . Ne ho fatta io stesso la pro-
„ va sul gran banco d' arena di Rif dietro
„ Worland , ove incontrai una truppa di
„ trenta o quaranta di questi animali ; gli
„ uni erano all' estremità della sponda dell'
„ acqua ; gli altri non ne erano che poco
„ distanti ; noi ci siamo fermati alcune ore
„ prima di prender terra , sperando che in-
„ noltrerebbono un po' più nel piano , e di
„ potere avvicinarci ad essi ; ma siccome non
„ ci è riuscito essendosi sempre le vacche
„ marine tenute in guardia , ci siamo accó-
„ stati con due scialupe oltrepassandole a
„ dritta e a manca ; ma furono quasi tutte
„ nell' acqua nel momento che noi fummo
„ in terra , tal che la nostra caccia si ridusse
„ a ferirne alcune , che si gittarono in mare ,
„ come le non ferite , e non avemmo se non
„ quelle , che di nuovo abbiamo colpite nell'
„ acqua Anticamente e prima d' essere
„ insegue le vacche marine si avanzavano
„ nelle terre , tal che nelle tempeste erano
„ assai distanti dall' acqua , e nella calma an-
„ cora più , però si raggiugnevano facilmen-
„ te Si camminava rimpetto a questi
„ animali per impedir loro lo scampo dalla
„ parte del mare , essi osservavano ogni di-
„ sposizione senza timore ; e spesso ogni
„ cacciatore ne uccideva uno prima che po-
„ tesse rifuggirsi nell' acqua . Si formava una
Tom. XXVII. L

„ sbarra dei loro cadaveri e si collocavano
 „ alcune persone in aguato per accoppiare
 „ quelli che si fermavano; e talvolta se ne
 „ uccidevano tre o quattro cento..... Si com-
 „ prende dalla prodigiosa quantità di questi
 „ animali, onde la terra è coperta, che do-
 „ vevano essere per l'addietro numerosissi-
 „ mi..... Quando sono feriti diventano fu-
 „ riosi, mordendo dall' una e dall' altra parte
 „ coi denti; spezzano le armi o le fanno
 „ cader di mano a quelli che gli assalgono,
 „ ed alla fine inveleniti di rabbia, metto-
 „ no la testa fra le due zampe o ale e si
 „ lasciano aggirare nell' acqua..... Quando
 „ sono in gran numero divengono così ar-
 „ diti, che per soccorrerli scambievolmente
 „ circondano le scialupe, cercando di tra-
 „ passarle coi denti o di rovesciarle urtandole
 „ a fianco..... Del resto, questo elefante di
 „ mare prima di conoscere gli uomini non
 „ temeva di alcun nemico, perchè avea sa-
 „ puto domare gli orsi crudeli, che si di-
 „ morano nella Groelandia, che si possono
 „ porre nel numero dei ladroni di mare“.

Aggiugnendo a queste osservazioni del Sig.
 Zorgrdrager, quelle che si trovano nelle rac-
 colle dei viaggi del Nord (a), e le altre,

(a) Il cavallo marino [morso] rassomiglia molto
 al vitello marino [foca], se non è che forse è

che sono sparse in diverse relazioni, noi avremo una storia ben compiuta di questo animale; pare, che la specie fosse altre volte

L 2

assai più grosso, essendo della grossezza di un bue; le sue zampe sono come quelle del vitello marino, e le anteriori e le posteriori hanno cinque dita o artigli, ma le unghie sono più corte; ha la testa più grossa, più rotonda e più dura del vitello marino. La pelle ha un pollice di grossezza, massimamente intorno al collo: gli uni l'hanno coperto d'un pelo del colore di torcio, gli altri ne hanno pochissimo: sono d'ordinario pieni di galle e di scorticature, talchè si direbbe, che è stata tolta loro la pelle, massimamente intorno alle giunture, dove è assai rugosa; hanno alla mascella superiore due grandi e lunghi denti, che hanno due piedi di lunghezza, e talvolta più; i giovani non hanno queste zanne, ma loro crescono coll'età.... Questi due denti sono più pregiati e più cari dell'avorio, sono solidi al di dentro, ma la radice è cava.... Questi animali hanno l'apertura della bocca assai larga come quella del bue, e al di sotto e al di sopra delle barbozze hanno molte setole, che sono cave al di dentro e della grossezza di una paglia.... Hanno al di sopra della barba due nari in forma di un semicircolo, per cui rimettono l'acqua come le balene, ma con assai minor romore; i loro occhi sono assai elevati al di sopra del naso. Questi sono rossi come il sangue, quando l'animale non li gira, ed io non ho osservata alcuna differenza nel girarli: le orecchie sono poco distanti dagli occhi, e somigliano a quelli dei vitelli marini: la loro lingua è grossa come quella d'un bue.... Hanno il collo così grosso, che durano fatica a rivol-

affai più sparfa , che non lo è al presente ,
 si trovava nei mari delle zone temperate ,
 nel golfo del Canada (a) , sulle coste dell'

gere la testa , il che gli obbliga a girare estremamente gli occhi ; hanno essi la coda corta come quella dei vitelli marini . Non si può estrarre da essi il grasso , come ai vitelli marini , perchè è frammischiato colla carne Il loro membro genitale è un osso duro della lunghezza di due piedi incirca , che va scemando verso l'estremità , ed è un poco curvo nel mezzo ; presso al ventre questo membro è piatto , ma nel rimanente è rotondo e tutto coperto di nervi Vi è apparenza , che questi animali vivano d'erbe e di pesci ; il loro stercò è simile a quello del cavallo Quando si attuffanno , immergono prima la testa nell' acqua come i vitelli marini ; dormono e russano non solo sul ghiaccio , ma altresì nell' acqua , tal che spesso sembrano morti ; sono furibondi e coraggiosi ; finchè sono in vita si difendono scambievolmente Fanno ogni sforzo per liberare quelli , che sono stati presi ; si gittano a gara nella scialupa , mordendo , e mettendo spaventevoli muggiti , e per la loro moltitudine costringono gli uomini a fuggire ; inseguono la scialupa finchè la perdono di vista Si prendono unicamente pei loro denti , ma fra cento se ne troverà talvolta uno , che abbia buoni i denti , perchè gli uni sono ancora troppo giovani , e gli altri li hanno guasti . *Recueil des voyages du Nord, Tom. II. pag. 117. & suivantes.*

(a) A quarantanove gradi e quaranta minuti di latitudine , vi sono tre isolette nel golfo di S. Lorenzo , sull' una delle quali approda in grandissimo numero una certa specie di foca , animale , come io credo , incognito agli Antichi , appellato

Acadia , ec. ma ella è al presente confinata nei mari artici : non fi trovano vacche marine , che in questa zona fredda , e parimente non ve n'ha che poche nei siti frequentati , poche nel mare agghiacciato dell' Europa , e ancora mēno nel lago di Groenlandia , nello stretto di Davis e nelle altre parti del nord dell' America , perchè all' occasione della pesca della balena furono per lungo tempo molestate e discacciate . Passato il sedicesimo secolo , gli abitanti di S. Mald andavano alle isole Ramee a prendere le vacche marine , che in tal tempo ivi si trovavano in gran numero (a) ; non sono cento anni , che quelli

L 3

dai Fiamminghi *Wulras* , e dagl' Inglesi , che hanno preso il nome dai Russi , *Moss*. Questo è un animale anfibio e assai mostruoso , che supera i buoi di Fiandra nella grossezza ; ha il pelo come quello di una foca Due denti ricurvi al basso , lunghi un cubito , che s' impiegano nello stesso uso dell' avorio , e che sono dello stesso valore . *Description des Indes occidentales* , par de Laët , pag. 41. — Sulle coste dell' America settentrionale si vedono delle vacche marine altrimenti dette *bestie dal gran dente* , perchè hanno due gran denti grossi e lunghi come la metà del braccio , e gli altri denti lunghi quattro dita : non v' è avorio più bello . Si trovano di queste vacche marine nell' isola di Sable . *Description de l'Amérique septentrionale* , par Denis , Tom. II. pag. 257.

(a) *Description des Indes occidentales* , par de Laët , pag. 42.

del Porto Reale al Canada mandavano barche al capo di Sabbia e al capo Forcuto per la caccia di questi animali (a), che d'indi in poi si sono allontanati da questi tratti, come pure da quelli dei mari dell' Europa, perchè non se ne trovano molti fuor che nel mare agghiacciato dell' Asia dall' imboccatura dell' Obio fino alla punta più orientale di quel continente, le cui coste sono pochissime frequentate: se ne vedono assai di rado nei mari temperati: la specie che si trova sotto la zona torrida e nei mari delle Indie, è diversa dalle nostre vacche marine del Nord; questi temono verosimilmente o il caldo o la salsedine dei mari meridionali: e siccome non gli hanno mai valicati, così non gli hanno trovati verso dell' altro polo, mentre vi si vedono le grandi e le piccole foche del nostro Nord, e parimente ivi sono più numerose, che nelle nostre terre settentrionali.

Nondimeno la vacca marina può vivere, almeno per qualche tempo in un clima temperato: Evrard Worst dice di aver veduto in Inghilterra uno di questi animali vivi in età di tre mesi, che non si metteva nell' acqua che per piccolo spazio di tempo ogni giorno, e che si trascinava per terra; egli

(a) Description de l'Amérique septentrionale, par Denis, Tom. I. pag. 66.

non dice ch'esso fosse molestato dal calore dell'aria , ma dice al contrario , che quando si toccava prendeva sembianze di animale furioso e robusto , e che respirava con molto strepito dalle nari . Questa giovane vacca marina era della grandezza di un vitello , e molto simile alla foca ; avea la testa rotonda , gli occhi grossi , le nari piatte e nere , e che a sua voglia le apriva e chiudeva ; non avea orecchie , ma soltanto due buchi per udire ; l'apertura della bocca era assai piccola , la mascella superiore era fornita di un masticchio di peli cartilaginei , grossi e ruvidi ; la mascella inferiore era triangolare , la lingua grossa , corta , e l'interno della bocca fornito d' ambe le parti di denti piatti ; i piedi anteriori e quelli di dietro erano larghi , e la posterior parte del corpo somigliava perfettamente a quella di una foca , questa parte anzi che camminare , si strascinava , i piedi anteriori erano rivolti innanzi , e i posteriori indietro ; tutti erano divisi in cinque diti , coperti d' una forte membrana la pelle era grossa , dura e coperta d' un pelo corto e disciolto , di colore cenereo : questo animale bisfonchiava come un porco , e talora gridava con una voce grossa e forte ; era stato trasportato dalla nuova Zembla ; non avea ancora i denti grandi o zanne , ma si vedevano nella mascella superiore le bozze , da cui dovevano uscire :

si nutriva con biada bollita col miglio, anzi che mangiare succhiava lentamente ; si accostava con gran difficoltà e grugnendo al suo padrone ; tuttavia lo seguiva quando gli presentava da mangiare (a).

Questa osservazione , che dà un'idea assai giusta della vacca marina , fa vedere nello stesso tempo , che può vivere in un clima temperato , nondimeno non pare , che possa tollerare un gran caldo , nè che abbia mai frequentati i mari del Mezzodì per passare da un polo all' altro . Molti Viaggiatori parlano di vacche marine , ch' essi hanno vedute nell' Indie , ma queste sono di un' altra specie : quella della nostra vacca marina è facile a distinguerfi per le lunghe zanne : l' elefante è il solo animale , che le abbia somiglianti ; questa produzione è un effetto raro nella natura , poichè fra tutti gli animali terrestri e anfibj , l' elefante e la vacca marina ai quali ella appartiene , sono di specie isolate , uniche nel loro genere , nè v' ha altra specie di animale , che abbia questo carattere .

Si assicura , che le vacche marine non si congiungono come gli altri quadrupedi , ma al rovescio ; vi è come nelle balene , un

(a) Description des Indes occidentales , par de Laët , pag. 41.

grosso e grande osso nel membro del machio; la femmina partorisce d'Inverno in terra o sul ghiaccio, e non produce d'ordinario che un parto, il quale nascendo è già grosso come un porchetto d'un anno; noi ignoriamo quanto tempo duri la gravidanza, ma a giudicarne da quello dell'aumento, ed anche dalla grandezza dell'animale, dee durare più di nove mesi; le vacche marine non possono dimorare sempre nell'acqua, sono costrette di andare a terra o per allattare i loro parti, o per altri bisogni; quando si trovano nella necessità di rampicare sulle rive talora dirupate, e sopra i banchi di ghiaccio adoperano le zanne (a) per attaccarsi, e le mani per promuovere la pesante massa del loro corpo. Si pretende, che si nutrano di conchiglie, le quali sono attaccate al fondo del mare, e che si servano delle zanne per istrapparle (b): dicono altri (c) che non vivono che di una certa

L 5

(a) Queste zanne non sono del tutto rotonde nè ben unite, ma piuttosto piate e leggermente scanalate; la destra è d'ordinario un po' più lunga e più forte della sinistra.... Ne ho avute due, di cui ciascuna avea due piedi e un pollice di Parigi di lunghezza, e due pollici di circonferenza al fondo. *Histoire naturelle du Groenland*, par Anderson, Tom. II. pag. 162. & 163.

(b) *Histoire naturelle du Groenland*, pag. 161.

(c) *Description des Indes occidentales*, par de Laët, pag. 42.

erba di larghe foglie, la quale cresce nel mare, e che non mangiano nè carne, nè pesce; ma io credo queste opinioni mal fondate, e vi è apparenza, che la vacca marina viva di prede come la foca, e sopra tutto delle aringhe e di altri minuti pesci, perchè essa non mangia quando è in terra, ed è la necessità dell' alimento, che la sforza a ritornare al mare.

IL DUGONE (a).

Il dugone è un animale del mare d'Africa e delle Indie orientali, di cui altro non abbiamo veduto, se non due teste scarnate o

(a) Dugon, *dugung*, nome di questo animale all' isola di Lety o Leyte, una delle Filippine, e che noi abbiamo adottato. *Nota.* Ho trovato questo nome nel viaggio Olandese di Cristoforo Barchewitz alle Indie orientali, opera ch'è stata tradotta in Tedesco, e impressa in Erfurt nel 1751. L'Autore dice, che questo animale si chiama nell' isola di Lety, *dugung* o *Iham dugung*, e che si chiama altresì *manate*. Quest' ultima denominazione pare, che indichi, che questo *dugon* o *dugung* sia un *manati* o *lamantino*; ma nella descrizione di questo Viaggiatore si è detto, che il dugon ha due zanne grosse un pollice, e lunghe un palmo; ora questo carattere non può convenire al *manati*, e conviene al contrario all' animale, di cui qui si tratta, e di cui noi abbiamo la testa.

troncate , il quale per questa parte somiglia più alla vacca marina , che ad ogni altro animale ; la testa è quasi al modo stesso sformata per la profondità degli alveoli , da cui nascono nella mascella superiore due denti lunghi un mezzo piede , questi sono anzi grandi incisivi che zanne ; non si estendono essi direttamente fuori della bocca , come quelli della vacca marina , sono assai più corti e più sottili , e altronde sono situati dinanzi alla mascella , e vicino l'uno all'altro come i denti incisivi , laddove le zanne della vacca marina lasciano fra di loro un intervallo considerabile , e non sono situate alla punta , ma a lato della mascella superiore . I denti mascellari del dugone sono pure diversi così pel numero , che per la posizione e per la forma , dai denti della vacca marina , però non dubitiamo che non sia un animale di specie diversa . Alcuni Viaggiatori che ne hanno parlato l'hanno confuso col leone marino . Innigo di Biervillas dice , che si uccise presso al capo di Buona-speranza un leone marino che aveva dieci piedi di lunghezza e quattro di grossezza , la testa come quella d'un vitello d'un anno , grossi occhi spaventevoli , le orecchie corte con una barba riccia , i piedi molto larghi , e le gambe sì corte , che il ventre toccava terra ; ed aggiugne , che ne portò le due zanne che uscivano mezzo piede fuori della

bocca (a); quest' ultimo carattere non conviene al leone marino, che non ha zanne, ma denti simili a quelli della foca, e cio è, che m' induce a giudicare che non fosse un leone marino, ma l' animale a cui diamo il nome di *dugone*; altri Viaggiatori parmi, che lo abbiano indicato sotto la denominazione di *orso marino*; Spilberg e Mandelso raccontano „ che nell' isola di Santa Elisabetta sulle coste dell' Africa ci sono degli „ animali, che si dovrebbero appellare orsi „ marini anzi che lupi marini, perchè pel „ loro pelo, colore e testa somigliano assai „ agli orsi, e perchè hanno soltanto il muso „ più acuto; che somigliano ancora agli orsi „ pei movimenti, che fanno e per la maniera, onde li fanno fuori del moto delle „ gambe di dietro, che si strascinano; che „ nel resto questi anfibi hanno l' aria spaventevole, non fuggono al vedere l' uomo, „ e mordono con forza bastevole a troncare „ la cassa di una daga, e che quantunque „ impediti delle gambe di dietro, non lasciano di camminare con velocità sufficiente a rendere difficile ad un uomo, che „ corra il raggiugnerle (b). „ Il Guat „ dice

(a) Voyage d' Innigo de Biervillas, *Part. I.*, pag. 37. et 38.

(b) Premier voyage de Spilberg, *Tom. II.*, pag. 437... Voyages de Mandelso, *Tom. II.*, pag. 551. . .

„ di avere veduto vicino al Capo di Buona-
 „ speranza una vacca marina di colore ros-
 „ siccio ; aveva il corpo rotondo e grosso ,
 „ l'occhio pur grosso , i denti , le zanne lun-
 „ ghe , il cefso rimboccato , e aggiugne che
 „ un nocchiere lo assicurò , che questo ani-
 „ male , di cui non poteva vedere , che la
 „ parte anteriore del corpo perchè era nell'
 „ acqua , avea i piedi (a). “ Questa vacca
 marina di le Guat , l'orso marino di Spilberg
 e il leone marino di Biervillas ci sembra-
 no tutti e tre lo stesso animale del dugone ,
 la cui testa ci è stata mandata dall' isola di
 Francia , e che in conseguenza si trova nei
 mari meridionali dal Capo di Buona-speranza
 fino alle isole Filippine (b) : del resto , noi

(a) Voyage de Le Guat, Tom. I., pag. 36.

(b) Poteva io dalla mia casa , che era situata so-
 pra uno scoglio nell' isola di Lethy , vedere le
 testuggini ad alcune pertiche di profondità nell' ac-
 qua ; ho veduti un giorno due grossi *dugungs* o
vacche marine , che vennero presso allo scoglio
 ed alla mia abitazione : io ho fatto prontamente
 avvisare il mio Pescatore , a cui ho mostrati questi
 due animali , i quali si aggiravano e si cibavano
 d' un muschio verde , che cresce sulla riva ; corse
 egli tosto a cercare i suoi compagni , che presero
 due battelli e andarono sulla riva , e in questo
 tempo il maschio venne in cerca della sua fem-
 mina , e non volendo allontanarsi si lasciò ucci-
 dere . Ciascuno di questi pesci prodigiosi avea più
 di sei aune di lunghezza , il maschio era un po'
 più grosso della femmina ; le loro teste somi-

non possiamo assicurare, che questo animale, che somiglia un poco alla vacca marina per la testa e per le zanne, abbia com' ella quattro piedi; noi nol presumiamo, che per analogia, e per l'indizio dei Viaggiatori, che abbiamo citati; ma nè l'analogia è molto grande, nè le testimonianze dei Viaggiatori assai precise, onde poter decidere, e noi sosponderemo il nostro giudizio a questo riguardo finchè non siamo meglio informati.

IL LAMANTINO (a).

Nel regno animale qui finiscono i popoli della terra, e cominciano le popolazioni del

gliavano a quella d'un bue, avevano due grossi denti lunghi un palmo, e grolli un pollice, che sporgevano fuori della mascella, come ai cignali: questi erano più bianchi dell' avorio più bello: la femmina avea due mammelle come una donna; le parti della generazione del maschio somigliavano a quelle dell' uomo; gl' intestini a quelli d'un vitello, e la carne ne avea il sapore. *Voyage de Christophe Barbeuxitz, pag. 381.* Estratto tradotto dal Sig. Marchese di Montmirail. *Nota.* Tutta questa descrizione conviene al manati, esclusi i denti: il manati non ha nè zanne, nè denti incisivi, e sopra di ciò solo ho presunto, che questo dugung non fosse il manati, ma l'animale, di cui abbiamo le teste, e che abbiamo fatto rappresentare.

(a) *Lamantin.* Si è preteso, che tal nome nascesse dai gridi lamentevoli di questo animale; ma è

mare ; il lamantino che non è quadrupede , non è interamente cetaceo , ritiene dei primi due piedi o piuttosto due mani ; ma le gambe di dietro , che nelle foche e nelle vacche marine sono quasi del tutto racchiuse nel corpo , e quanto è possibile , raccorciate si

una favola. Questa parola è una corruzione del nome di questo animale nella lingua dei Galibis abitanti della Guiana , e dei Caribi o Caraibi , abitanti delle Antille ; è questo lo stesso popolo e la lingua è stessa , toltone alcune varietà : nominano essi il lamantino *manati* , da cui i Negri delle isole Francesi di America , che storpiano tutte le parole hanno formato *lamanti* , aggiungendovi l'articolo , come per dire *la bestia manati* ; da *lamanati* hanno formato *lamannti* , sopprimendo il terzo *a* , e battendo l'*n* ; *lamannti* , *lamenti* , che si è scritto con un *e* per l'analogia pretesa col *lamentari* , il che dà luogo all'analogia dei gridi lamentevoli supposti della femmina , quando le si rapisce il suo parto . *Lettre de M. de la Condamine à M. de Buffon* , du 28. mai 1764. Io cito questa specie di etimologia , di cui il Sig. de la Condamine , che dimorò dieci anni nelle Indie occidentali , debb' essere ben informato : tuttavia io debbo osservare , che la parola *manati* , secondo molti altri Autori è spagnuola , e indica un animale che ha mani , e che probabilmente i Guianesi , ai Caraibi che sono molto distanti gli uni dagli altri , l'hanno tolta entrambi dagli Spagnuoli .

Manati , *Phoca genus* . *Clusii exotic.* , pag. 132. , fig. *ibid.* , pag. 133.

Manati . *Hernand. Hist. Mex.* , pag. 323. , fig. *ibid.*

Mauatus . *Le lamantijn* . *Briss. Reg. anim.* , pag. 49.

trovano assolutamente nulle e cancellate nel lamantino; in luogo di due piedi corti e di una coda stretta ancor più corta, che le vacche marine portano nell'estremità in una direzione orizzontale, i lamantini non hanno in vece di tutto ciò che una grossa coda, che si allarga a foggia di ventaglio in questa medesima direzione, tal che a prima vista parrebbe, che i primi avessero una coda divisa in tre, e che negli ultimi queste tre parti si fossero riunite per non formarne che una sola; ma per una osservazione più attenta, e sopra tutto mercè l'anatomia si vede, che non si è fatta alcuna congiunzione, e che non v'è vestigio di ossa, di cosce, di gambe, e che quelli, i quali costituiscono la coda dei lamantini sono semplici vertebre isolate e simili a quelle dei cetacei, che non hanno piedi; pertanto questi animali sono cetacei per le parti posteriori del loro corpo, e non partecipano più dei quadrupedi, che pe' due piedi o per le mani, che sono dinanzi a lato del petto. Oviedo parmi il primo autore, che abbia data una specie di storia e di descrizione del lamantino; „ esso si trova frequentissimamente, egli dice, „ sulle coste di S. Domingo; è un grossissimo animale di deforme aspetto, che ha „ la testa più grossa di quella d'un bue, „ gli occhi piccoli, due piedi o due mani „ vicino alla testa, che gli servono a nuo-

„ tare ; non ha squame , ma è coperto d'una
„ pelle o piuttosto di un grosso cuojo , è un
„ animale assai mansueto ; va contro la cor-
„ rente de' fiumi , e mangia l'erbe delle rive ,
„ a cui può arrivare senza uscire dell' acqua ;
„ nuota sulla superficie ; per prenderlo si
„ procura di accostarsigli sopra una barchet-
„ ta o sopra una zatta , e gli si scaglia una
„ grossa freccia attaccata ad una lunghissima
„ fune ; tolto che si sente colpito , fugge e
„ reca con seco il dardo e la fune , all' estre-
„ mità di cui si attacca un grosso pezzo di
„ suvero o di legno leggiere per servire di
„ indizio ; quando l' animale ha perduto per
„ questa ferita il sangue e le forze va a
„ terra , allora si ripiglia l' estremità della
„ fune , si raccoglie finchè non ne riman-
„ gono che poche braccia , e coll' ajuto del
„ flutto si ritira a poco a poco l' animale
„ verso la nave , dove si finisce d' ucciderlo
„ nell' acqua a' colpi di lancia . Esso è sì
„ pesante , che ne abbisognano due buoi per
„ trasportarlo ; la sua carne è eccellente ,
„ e quando è fresca ha più sapore di bue ,
„ che di pesce ; tagliandolo in pezzi e fa-
„ cendolo seccare e marinare , piglia col tem-
„ po il sapore di carne di tonno , anzi è
„ migliore . Vi sono di questi animali che
„ hanno più di quindici piedi di lunghezza
„ e circa sei piedi di grossezza ; la parte
„ posteriore del corpo è assai più minuta e

„ va sempre scemandosi fino alla coda , che
 „ in seguito si allarga nella estremità . Sic-
 „ come gli Spagnuoli, aggiugne Oviedo, dan-
 „ no il nome di mani ai piedi anteriori di
 „ tutti i quadrupedi, e siccome questo ani-
 „ male non ha che i piedi anteriori , gli
 „ hanno essi data la denominazione alle ma-
 „ ni, *Manati* ; non ha orecchie esteriori ,
 „ ma solo due buchi, per mezzo dei quali
 „ ode, la pelle non ha che alcuni peli as-
 „ sai rari , ella è d'un bigio cenerino , e
 „ della grossezza d'un pollice , se ne fan-
 „ no delle scarpe delle suole , e dei pen-
 „ dagli, ec. La femmina ha due poppe sul
 „ petto, e produce d'ordinario due parti ,
 „ ch'essa allatta (a): “ tutti questi fatti ri-
 „ feriti da Oviedo sono veri , ed è singolare
 „ che Cieca (b), e molti altri dopo di lui ab-
 „ biano assicurato , che il lamantino esce so-
 „ vente dall' acqua per andarsene a pascolare
 „ in terra , falsamente gli hanno attribuito
 „ questa abitudine naturale , tratti in errore
 „ per l'analogia della vacca marina e delle
 „ foche che escono in fatti dall' acqua e sog-
 „ giornano in terra , ma egli è certo che il la-
 „ mantino non abbandona mai l' acqua , e che

(a) Ferdin. Oviedo . *Hist. Ind. occid.* lib. XIII. ,
cap. x.

(b) *Chron. Peruv.* , cap. xxxi.

antepone il soggiorno delle acque dolci a quello dell' acqua salata.

Clusio dice di aver veduta e misurata la pelle di uno di questi animali, e di averla trovata di sedici piedi e mezzo di lunghezza, e sette piedi e mezzo di larghezza; i due piedi, o le due mani erano molto larghe colle unghie corte. Gomara (a) assicura, che se ne trovano talvolta di quelli, che hanno venti piedi di lunghezza, ed aggiugne, che questi animali frequentano del pari l'acque dei fiumi, siccome quelle del mare, racconta, che n'era stato nudrito, e allevato un giovane in un lago a San Domingo per ventisei anni, ch'era sì mansueto e così domestico, che prendeva placidamente il cibo, che se gli porgeva, che intendeva il suo nome, e che quando si chiamava usciva dell'acqua, e si strascinava fino alla casa per ricevere il cibo, che pareva si compiacesse a udire la voce umana, e il canto dei fanciulli, che non ne avea timore, che se gli lasciava sedere sul dorso, e che li recava d'una riva all'altra del lago senza attuffarsi nell'acqua, e senza far loro alcun male. Questo fatto non può essere vero in tutte le sue circostanze, sembra formato sulla favola del delfino degli Antichi, perchè il

(a) Fr. Lopes de Gomara. *Hist. gen.*, cap. xxxi.

lamantino non può assolutamente strisciarsi per terra.

Herrera dice poco di più al soggetto di questo animale; solo assicura, che quantunque sia grossissimo, nuota sì facilmente, di modo che non fa alcuno strepito nell' acqua, e se sente da lontano qualche romore va sott' acqua (a).

Hernandes che ha date due figure del lamantino, l'uno in profilo e l'altro a fronte, non aggiugne quasi nulla a ciò che gli altri Autori Spagnuoli ne aveano scritto prima di lui; dice solo che i due oceani, cioè il mare Atlantico e il mar Pacifico, come i laghi nutriscono una bestia deforme detta *manati*, di cui dà la descrizione quasi interamente tolta da Oviedo; e tutto ciò che vi ha di più si è, che le mani di questo animale hanno cinque unghie simili a quelle dell' uomo, che ha l'ombelico e l'ano larghi, la vulva come quella della femmina, la verga come quella d'un cavallo, la carne e il grasso come quelli d'un porco grasso, e finalmente le coste e le viscere come quelle d'un toro, che si congiugne sopra la terra alla maniera umana, la femmina rovesciata sul dorso, e che non produce che un parto,

(a) Description des Indes occidentales. par Herrera, pag. 57.

ch'è d'una grossezza mostruosa nascendo (a). Il congiugnimento di questi animali non può farsi sopra terra, come dice Hernandez, poichè non possono camminare, e si fa nell'acqua sopra un fondo basso. Binet (b) dice, che il lamantino è grosso come un bue, e tutto rotondo come una botte, che ha una piccola testa e un' po' di coda; che la sua pelle è ruvida e grossa come quella dell'elefante, che ve n'ha de' così grossi, che se ne estraggono oltre a seicento libbre di carne ottima da mangiare; che il suo grasso è dolce, come il burro; che questo animale ama i fiumi vicino alla loro imboccatura nel mare per pascere l'erba, che cresce lungo le rive; che vi sono certi siti in distanza di dieci o dodici leghe di Caienna, ove se ne trovano in sì gran numero, che si può in un giorno empierne una lunga barca, purchè vi sieno persone, le quali adoperino bene il rampone. El Padre Tertre, che a lungo descrive la caccia o la pesca del lamantino, si accorda quasi in tutto cogli Autori che noi abbiamo citati; tuttavia egli dice, che questo animale non ha che quattro dita e quattro unghie per mano, ed aggiugne, che si nutre di una erbetta, la quale cresce

(a) Hernand. *Hist. Mex.*, pag. 323. & 324.

(b) Voyage à l'île de Cayenne, par Antoine Binet, pag. 346.

nel mare, che la mangia come fa il bue quella dei prati; e che dopo di essersi riempita di questo cibo, cerca i fiumi e le acque dolci, dove si abbevera due volte per giorno; che dopo di avere ben bevuto e ben mangiato, dorme col muso per metà fuori dell'acqua, ciò che lo fa scoprir di lontano; che la femmina fa due parti, che la seguitano per tutto, e che se si prende la madre, si è sicuro di avere anche i figli, i quali non l'abbandonano mai, anche dopo la sua morte, e non fanno che aggirarsi intorno alla barca che la trasporta (a). Quest'ultimo fatto mi parve assai incerto, ed è anche disdetto d'altri Viaggiatori, i quali assicurano, che il lamantino non produce, che un parto: tutt' i grossi animali quadrupedi o cetacei non producono d'ordinario che un parto, la sola analogia basta a desistere dal credere, che il lamantino ne produca sempre due, come lo assicura il P. Tertre, Oexmelin: nota, che il lamantino ha la coda collocata, come i cetacei, e non come i pesci da squame, che l'hanno in direzione verticale dal dorso al ventre, laddove la balena e gli altri cetacei hanno la coda situata trasversalmente, cioè d'una parte all'altra:

(a) Histoire générale des Antilles, par le P. du Tertre.

del corpo; esso dice, che il lamantino non ha denti anteriori; ma solo una callosità dura come un osso, colla quale esso pizzica l'erba; che ha nondimeno trentadue denti molari; che non vede bene a cagione della piccolezza degli occhi, i quali non hanno che pochissimo umore e niente d'iride; che ha poco di cervello; ma che supplisce al difetto de' buoni occhi coll' eccellenza dell' orecchio; che non ha lingua; che le parti della generazione sono più simili a quelle dell' uomo e della femmina, che a quelle di alcun animale; che il latte delle femmine, ch' egli assicura di aver gustato, è d' un buonissimo sapore; che non producono che un solo parto, che abbracciano e si recano colla mano; che esse lo allattano per un anno, passato il quale è in istato di provvedersi da se medesimo e di mangiare dell' erba; che questo animale ha dal collo fino alla coda cinquanta due vertebre; che si nutre come la testuggine, ma che non può nè camminare, nè strisciarsi per terra (a). Tutti questi fatti sono esattissimi, come pure quello delle cinquantadue vertebre; perchè il Sig. Daubenton ha trovato nell' embrione, che ha anatomizzato vent' otto vertebre nella

(a) *Histoires des Aventuries, par Oexmelin, Tom. XII. pag. 134. & suivantes.*

coda, fedici nel dorso e sei o piuttosto sette nel collo (a). Solamente questo Viaggiatore s'inganna al proposito della lingua, la quale non manca al lamantino; ma gli è vero, che è attaccata al disotto e quasi fino alla sua estremità alla mascella inferiore. Si trova nel viaggio alle isole dell' America. *Parigi*, 1722. un' ottima descrizione del lamantino, e della maniera onde se gli lancia addosso il rampone; l' Autore conviene in tutti i fatti principali con quelli, che abbiamo citati; ma osserva, che questo animale è divenuto molto raro alle Antille, da che le sponde del mare sono abitate; quello che vide e che ha misurato, avea quattordici piedi nove pollici dall' estremità del muso fino all' origine della coda; era tutto rotondo fino a questo sito; la testa era grossa, la bocca larga con grandi barbozze e alcuni peli lunghi e ruvidi al di sopra; gli occhi erano piccolissimi per rapporto alla testa, e le sue orecchie non parevano che due piccoli buchi; il collo era assai grosso e corto, e senza un piccoloto moto, che lo fa un poco piegare, non sarebbe possibile distinguere la testa dal rimanente del corpo. Alcuni Autori pretendono (egli aggiugne) che questo

„ ani-

(a) Vedi in seguito la Descrizione dell' embrione del Manati.

„ animale si serva delle sue due mani o di
„ ale per istrisciarsi per terra ; io mi sono
„ diligentemente informato di questo fatto ;
„ niuno ha veduto questo animale in terra ,
„ e non gli è possibile camminare , nè strisciarsi ; i suoi piedi anteriori o mani non
„ servendogli ; che per tenere i suoi parti
„ finchè dà loro il latte ; la femmina ha
„ due mammelle rotonde , io le ho misurate , dice l'Autore , ciascuna avea sette
„ pollici di diametro e quattro in circa di
„ elevazione ; il capezzolo era grosso come
„ il pollice , e usciva un buon dito esteriormente ; il corpo avea otto piedi due pollici di circonferenza ; la coda era come
„ una larga mestola di diciannove pollici di
„ lunghezza e di quindici nella sua maggior larghezza , e la grossezza all' estremità era di circa tre pollici ; la pelle era
„ grossa sul dorso quasi come un doppio cuojo di bue , ma era assai più sottile sotto il ventre ; era d' un colore di lavagna bruna , d' un grano grosso e ruvido con peli dello stesso colore , poco folto ,
„ grosso e molto lungo . Questo lamantino pesava circa ottocento libbre ; si era preso il piccolo colla madre ; avea presso a poco tre piedi di lunghezza ; si fece arrostito allo spiedo il lato della coda , si trovò questa carne buona e delicata come quella del vitello . L'erba onde questi animali

„ si nutriscono è lunga otto in dieci polli-
 „ ci, stretta, acuta, tenera e d'un bel ver-
 „ de: si vedono dei fiti sulle sponde e su
 „ i fondi bassi del mare, in cui quest'erba
 „ è così abbondante, che il fondo sembra
 „ una prateria; anche le tartarughe ne man-
 „ giano (a), ec. “ Il Padre Magnin di Fri-
 „ burgo, dice che il lamantino mangia l'erba,
 „ che può cogliere senza uscire dell'acqua....
 „ Che ha gli occhi piccoli e della grossezza
 „ d'una nocciuola; le orecchie sì racchiuse,
 „ che può appena entrarvi un'ago; che al di
 „ fuori delle orecchie si trovano due piccoli
 „ ossi forati; che gl'Indiani hanno costume
 „ di recare questi piccoli ossi appesi al collo
 „ come un bijou.... E che il suo grido so-
 „ miglia a un leggier muggito (b).

Il P. Gumilla, riferisce che vi è una in-
 „ finita moltitudine di lamantini nei grandi
 „ laghi dell'Orenoque; „ questi animali, egli
 „ dice, pesano ciascuno da cinquecento fino
 „ a settecento cinquanta libbre; si nutrisco-
 „ no di erbe; hanno gli occhi assai piccoli,
 „ e i buchi delle orecchie ancora di più;
 „ vengono a pascolare sulla sponda se è bassa.

(a) *Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, Tom. II.*
 pag. 200. *Et suiv.*

(b) *Extrait d'un manuscrit du Père Magnin de Fri-
 bourg, Missionnaire de Borja, Correspondant de
 l'Académie des Sciences, traduction de l'espagnol,
 communiquée par M. de la Condamine.*

„ La femmina partorisce costantemente due
 „ parti , se li reca alle poppe colle braccia e li strigne così fortemente , che non
 „ si smovono mai per qualunque moto ella
 „ faccia ; i parti appena nati non lasciano
 „ di pesare ciascuno trenta libbre ; il latte
 „ che succhiano è densissimo . Al di sotto
 „ della pelle , la quale è più grossa di quella
 „ di un bue , si trovano quattro involuppi o
 „ stratti , di cui due sono di grasso , e gli
 „ altri due d'una carne assai delicata e saporita , la quale essendo arrostita ha l'odore
 „ del porco e il sapore del vitello . Questi
 „ animali , quando dee piovere saltano fuori
 „ dell'acqua ad un'altezza considerabile (a) : “
 pare che il P. Gumilla s'inganni come il
 P. Terre , dicendo che la femmina produce due parti ; egli è quasi certo , come noi abbiamo detto , che non produce che uno .

Finalmente il Sig. de la Condamine che ha voluto darci un disegno , ch'egli medesimo ha fatto del lamantino sul fiume delle Amazzoni , parla con maggior precisione , e meglio di tutte le altre abitudini naturali di questo animale . „ La sua carne , egli
 „ dice , e il suo grasso hanno molta relazione a quello del vitello ; il Padre d'Acuna rende la sua somiglianza col bue ancor
 „ più compiuta supponendogli le corna , di

M 2

(a) Histoire de l'Orénoque , par le P. Gumilla .

„ cui la Natura non lo ha fornito : esso
„ non è a parlare propriamente anfibio , poi-
„ chè non esce dell' acqua giammai intera-
„ mente , e non può uscire , non avendo
„ che due ale assai vicine alla testa , piat-
„ te , e in forma di punte di quindici in
„ sedici pollici di lunghezza , che tengono
„ il luogo di braccia e di mani ; esso non
„ fa che sporgere la testa fuori dell' acqua
„ per cogliere l' erba sulla riva . Quello che
„ ho delineato (aggiugne il Sig. de la Con-
„ damine) era femmina , la sua lunghezza
„ era di sette piedi e mezzo reali , e la sua
„ maggior larghezza di due piedi . Ne ho
„ veduti di poi de' più grandi ; gli occhi di
„ questo animale non hanno alcuna propor-
„ zione colla grandezza del suo corpo ; sono
„ rotondi , e non hanno che tre linee di dia-
„ metro ; l' apertura delle sue orecchie è an-
„ cora più piccola , e non sembra , che un
„ buco di spilla . Il manati non è partico-
„ lare del fiume delle Amazzoni ; non è
„ meno comune nell' Orenoque : si trova
„ pure , quantunque meno frequentemente
„ nell' Oyapoc , e in molti altri fiumi all'
„ intorno di Cajenna , e delle coste della
„ Guiana , e verisimilmente altrove . E' lo
„ stesso che altre volte si nominava *Manati* ,
„ e che oggidì si nomina *Lamantino* a
„ Cajenna , e nell' isole Francesi dell' Ame-
„ rica , ma io ne credo la specie un po'

„ differente. Non si scontra in altro mare,
„ parimente di rado nelle imboccature dei
„ fiumi , ma si trova lontano più di mille
„ leghe dal mare nella maggior parte dei
„ grandi fiumi , che discendono in quello
„ delle Amazzoni, come nel Guallaga , nel
„ Pastaca ec. Non è arrestato rimontando
„ l' Amazzone , che dal Pongo (cataratta)
„ di Borja al disopra del quale più non se
„ ne ritrova (a).

Ecco quanto precisamente presso a poco si fa del lamantino ; sarebbe a desiderarsi , che i nostri abitanti di Cajenna , frai quali vi sono al presente delle persone dotte , e che amano la Storia Naturale , osservassero questo animale e facessero la descrizione delle sue parti interiori , sopra tutto di quelle della respirazione , della digestione e della generazione . Egli pare , ma noi non ne siamo sicuri , che v'abbia un grande osso nella verga , il foro ovale del cuore aperto , i polmoni di una forma singolare , lo stomaco diviso in molte porzioni , le quali formano per avventura molti stomachi differenti , come negli animali ruminanti .

Del resto la specie del lamantino non è

M 3

(a) Voyage sur la rivière des Amazones , par M. de la Condamine , in 8. pag. 154. & suiv. *Mémoires de l'Académie des Sciences* , 1745. pag. 464. & 465.

confinata nei mari e nei fiumi del nuovo mondo, egli pare, che esista pure sulle coste e nei fiumi dell' Africa. Il Sig. Adanson ha veduti dei lamantini al Senegal ; ne ha recata una testa, che ha data a noi, e nel tempo stesso ha voluto comunicarmi la descrizione di questo animale, che ha fatta sul posto, ed io giudico di doverla qui riferire tutta interamente. „ Ho veduti molti „ di questi animali (dice il Sig. Adanson); „ i più grandi non avevano che otto piedi „ di lunghezza e pesavano circa ottocento „ libbre; una femmina di cinque piedi e tre „ pollici di lunghezza non pesava, che cento novantaquattro libbre; il loro colore „ era cenerino nero, i peli sono rarissimi „ per tutto il corpo, sono a foggia di setole lunghe nove linee; la testa è conica „ e di mediocre grossezza, relativamente al „ volume del corpo; gli occhi sono rotondi „ e piccolissimi: l'iride è di un turchino-carico „ e la pupilla nera; il muso è quasi cilindrico, le due mascelle sono quasi egualmente larghe, le labbra sono scarnate e „ molto grosse; non vi sono che denti molari così alla mascella superiore, come all' „ inferiore; la lingua è di forma ovale e „ attaccata quasi fino alla sua estremità alla „ mascella inferiore: è singolare (prosegue „ il Sig. Adanson) che quasi tutti gli Autori o Viaggiatori abbiano supposte le orec-

„ chie a questo animale ; io non ne ho po-
„ tuto trovare in nessuno , nè meno un foro
„ piccolissimo da potervi introdurre uno sti-
„ lo (a) ; vi sono due braccia o ale situate
„ all' origine della testa , che non è distinta
„ dal tronco per alcuna specie di collo , nè
„ di spalle sensibili ; queste braccia sono quasi
„ cilindriche , composte di tre articolazioni
„ principali , di cui l' anteriore forma una
„ specie di mano piatta , in cui le dita non
„ si distinguono , che per quattro unghie
„ d'un rosso bruno e lucente ; la coda è oriz-
„ zontale come quella delle balene , ed ha
„ la forma di una pala da forno . Le fem-
„ mine hanno due capezzoli più ellittici che
„ rotondi , collocati vicino all' ascella del
„ braccio ; la pelle è un cuoio grosso di sei
„ linee sotto il ventre , nove linee sul dorso
„ e un pollice e mezzo sul capo . Il grasso
„ è bianco e grosso due o tre pollici : la
„ carne è d'un rosso pallido , più pallido e

(a) *Nota.* Sembra tuttavia indubitato, che questo animale abbia tre fori uditivi ed esterni . Il Sig. de la Condamine mi assicura , che gli ha veduti e misurati , e che questi fori non hanno più di una mezza linea di diametro , e come il lamantino ha la facoltà di contrarsi e ristrignersi , è facilissimo , che sieno sfuggiti alla vista del Sig. Adanson , poichè tali fori sono piccolissimi anche quando l' animale li tiene aperti .

„ più delicata di quella del vitello. I Negri
 „ Ovalosi o Jalosi appellano questo animale
 „ *Lereou*. Vive di erbe e si trova all' im-
 „ boccatura del fiume Niger. “

Si vede da questa descrizione, che il lamantino del Senegal non è diverso, per così dire, in niente da quello di Cajenna; e per un confronto fatto della testa di questo lamantino del Senegal con quella d'un feto (a) del lamantino di Cajenna, il Sig. Daubenton presume ancora, che sieno della stessa specie. Il testimonio de' Viaggiatori (b) si accorda colla nostra opinione; quello di Dam-

(a) *Nota*. Il Sig. Cavaliere Turgot attualmente Governatore della Guiana, e che prima avea donato al Gabinetto del Re questo feto di Lamantino è in istato di coltivare il suo genio per la Storia naturale, e di arricchirci non pure de' suoi doni, ma de' suoi lumi.

(b) Oexmelin riferisce, che vi sono dei lamantini sulle coste dell' Africa, e che sono più comuni sulla costa del Senegal, che nel fiume di Gambic.

[*Histoire des Aventuriers, Tom. II. pag. 115.* — Le Guat assicura di averne veduti molti nei mari dell' isola Rodriguez. La testa del lamantino di quest' isola rassomiglia all' ai, (dice questo Viaggiatore) a quella del porco, fuorchè essa non ha il grugno così acuto. I più grandi lamantini hanno venti pollici in circa di lunghezza.... Questo animale ha il sangue caldo, la pelle nericcia, molto ruvida e dura con alcuni peli così rari, che si scoprono appena; gli occhi piccoli, e due fori, che chiude, ed apre, che si posse-

pier sopra tutto è positivo, e le osservazioni che ha fatte sopra questo animale, meritano di avere qui luogo. „ Non è solo nel fiume „ di Blewfield, che prende la sua origine „ tra i fiumi di Nicaraguo e di Veraguo, „ che io ho veduto dei manati (lamantini); „ ne ho pure veduti nella baja di Campece „ sulle coste di Bocca del drago, e di Bocca „ del loro; nel fiume di Darien e nelle „ piccole isole meridionali di Cuba; ho udito „ dire, che se n'è trovato alcuno al Nord „ della Giamaica, e in gran quantità nel „ fiume di Surinam, ch'è un paese assai

no ragionevolmente chiamare le sue orecchie; siccome spesso ritira la lingua, la quale non è molto grande, molti hanno detto, che non ne avea; ha dei denti mascellari . . . ma non ha alcun dente degli anteriori, e le sue gengive sono forti bastevolmente per troncare le erbe . . . Io non ne ho veduto che un figlio colla madre, ed io sono inclinato a credere, che ne produca un solo per volta. Troviamo talora tre o quattro cento di questi animali insieme, che pascolano l'erba in fondo dell'acqua; sono così poco spaventati, che spesso li tocchiamo per iscegliere i più grossi; ne facciam trapassare da una corda alla coda per estrarli dall'acqua; non abbiamo scelti i più grossi, perchè ci avrebbero fatto durar fatica, e perchè altronde la loro carne non è così delicata come quella dei piccioli . . . Non abbiamo mai osservato, che questo animale venga a terra; io dubito, che vi si possa strisciare, e non credo, che sia anfibio. *Voyage de le Guat, Tom. I., page 93. & suiv.*

„ basso : ne ho veduti pure a Mindanao ,
„ ch' è una delle isole Filippine , e sulla
„ costa della nuova Olanda.... questo ani-
„ male ama l' acqua , che ha sapore di sale ,
„ perciò si tiene d' ordinario nei fiumi vicini
„ al mare , ed è forse perciò , che non se ne
„ vedono nei mari del Sud , ove la riva
„ è generalmente alta , l' acqua profonda vi-
„ cino a terra , i flutti grossi , se non è
„ nella baja di Panama , dove al presente
„ non ve n' ha alcuno ; ma le Indie occi-
„ dentali essendo , per così dire , una gran
„ baja composta di molte piccole , sono d' or-
„ dinario una terra bassa , dove le acque che
„ sono poco profonde , somministrano un
„ nutrimento convenevole al lamantino .
„ Si trova talvolta nell' acqua salata , talora
„ anche nell' acqua dolce , ma non mai
„ molto avanti nel mare : quelli , che sono
„ al mare , e ne' luoghi , dove non vi sono
„ nè fiumi nè stretti di mare , dove possano
„ entrare , vengono nondimeno in ventiquat-
„ tro ore una volta o due all' imboccatura
„ del fiume di acqua dolce la più vicina....
„ Non vengono mai a terra nè in un' acqua
„ così bassa , che non vi possano nuotare ;
„ la loro carne è sana e di ottimo sapore ;
„ la loro pelle è pure di una grande utili-
„ tà . I lamantini e le tartaruge si trovano
„ d' ordinario negli stessi siti , e si nutrisco-
„ no delle erbe medesime , che crescono su

„ gli alti fondi del mare ad alcuni piedi di
„ profondità sotto l'acqua , e sulle sponde
„ basse , che inonda la marea (a).

(a) Voyage de Dampier , Tom. I. , page 46. &
suivantes .



DESCRIZIONE

DELLA FOCA.


LA foca [*tav. IX., fig. 1.*] è coperta di peli, e rassomiglia agli altri quadrupedi per la forma della testa e della coda [*A, tav. X.*], e di varie parti del corpo; ma n'è molto diversa per la struttura delle gambe e dei piedi. La parte anteriore della testa ha molta relazione a quella della lontra, poichè il muso è largo e piatto, e il naso è poco sporgente; le orecchie appena si veggono, e non son contrassegnate che per via d'un piccol tubercolo che si solleva sull' orlo anteriore de' loro orifizj: esse si trovano presso a poco sul mezzo della lunghezza della testa. Gli occhi son situati più presso alle orecchie che all'estremità del muso. Quest' animale ha la parte posteriore della testa grossissima, e la sommità piatta dall'estremità del naso fino all'occipite, ch'è rotondo. Il collo è corto; nell'individuo, che ha servito di soggetto per questa descrizione, il collo era ben distinto dalla testa. Il petto è più grosso del ventre; posteriormente non appajono nè cosce nè anche; da ciascun lato dell'estremità del corpo vedesi una prominenza formata dal ginocchio; le gambe s'estendono all'indietro sotto la pelle, e i talloni [*BC*] si trovano da ciascun lato dell'ano e dell'origine della coda. Il corpo è più sottile in questo sito che




LA FOCA PICCOLA

Ramusc.













Fig. 1.





Fig. 2.





che in nessun altro; in generale ha una figura conica, poichè si diminuisce di grossezza dal petto fino all'ano. La coda ha poca lunghezza, ed è piatta sopra e sotto all'estremità.

Il braccio e l'avambraccio son corti e nascosti sotto la pelle del petto; la giuntura della mano è sporgente all'infuori; le dita sono in una membrana che serve d'aletta o nuotatojo, e non si distinguono che per via delle ungue che son lunghe, quasi cilindriche e di color nero sulla faccia esteriore: vi son cinque diti; il primo è più lungo, e gli altri sono successivamente più corti fino all'ultimo, ch'è il più piccolo di tutti. Il tarso [DE, *tav. X.*] e il metatarso [FF] son grossi e allungati e quasi cilindrici: i piedi di dietro [GG] hanno cinque diti come i piedi anteriori, ma son più grandi e involti in una membrana, ch'è per conseguenza più estesa di quella dei piedi anteriori. Il primo dito [H] di que' di dietro è il più lungo e il più grosso; il quinto [I] ha un po' meno di lunghezza; il secondo [K] e l'quarto [L] son più corti del quinto [I], e più lunghi del terzo [M], ch'è il più piccolo dei cinque. Le ungue [N] non son diverse da quelle de' piedi anteriori se non perchè son più piccole: le alette de' piedi anteriori essendo estese hanno quattro pollici e mezzo di larghezza; e quelle de' piedi posteriori nove pollici e mezzo.

I peli son corti, fini, duri e piegati all'indietro: quelli dell'individuo, che ha servito di soggetto.

getto per questa descrizione, erano uniti gli uni agli altri per una specie di mucilagine o di colla; erano però secchi e lucenti, e avevano un color bruno o nericcio sulla maggior parte della loro lunghezza dalla radice fino alla punta, ch'era d'un grigio-gialliccio; questo colore appariva solo sopra tutte le parti del corpo, eccettuato sull'occipite e lungo la faccia superiore del collo e del dorso, ove si vedeva del nero.

Da ciascun lato del muso eravi un mustacchio composto sul dinanzi del muso di setole nere, o in parte nere e in parte bianche: al di là di queste setole se ne trovavano altre molto più grosse e più lunghe, e interamente bianche; esse eran piatte e per così dire nodose, come le antenne degl'insetti chiamati *Capricorni*; eranvi parimente delle setole somiglianti al di là dell'angolo anteriore dell'occhio. Le setole più lunghe dei mustacchi avevano tre pollici e mezzo.

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall'estremità del muso fino all'ano	2.	8.	o.
Lunghezza fino all'estremità dei piedi posteriori	3.	3.	6.
Lunghezza della testa dall'estremità del muso fino all'occipite	o.	6.	6.
Circonferenza dell'estremità del muso	o.	6.	o.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi	o.	9.	o.

pied. poll lin.

Contorno dell'apertura della bocca —	o.	5.	8.
Distanza tra i due nafali ———	o.	o.	3 $\frac{1}{2}$
Distanza tra l'estremità del muso e l'angolo anteriore dell'occhio —	o.	2.	3.
Distanza tra l'angolo posteriore e l'orecchia ———	o.	o.	11.
Lunghezza dell'occhio da un angolo all'altro ———	o.	o.	9.
Apertura dell'occhio ———	o.	o.	5.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi, misurata in linea retta —	o.	1.	7.
Circonferenza della testa presa al di- sopra delle orecchie al sito più grosso ———	l.	l.	3.
Lunghezza delle orecchie ———	o.	o.	3.
Larghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore ———	o.	o.	7.
Distanza tra le due orecchie ———	o.	3.	5.
Lunghezza del collo ———	o.	4.	o.
Circonferenza del collo ———	l.	o.	6.
Circonferenza del corpo, presa die- tro le gambe anteriori ———	l.	6.	o.
Circonferenza presa al sito più grosso	l.	9.	o.
Circonferenza presa dinanzi le gambe posteriori ———	l.	4.	o.
Lunghezza del tronco della coda —	o.	3.	4.
Circonferenza della coda all'origine del tronco ———	o.	3.	4.
Circonferenza della giuntura della			

	pied. poll. lin.		
mano —————	o.	5.	6.
Circonferenza del metacarpo ———	o.	5.	6.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o.	4.	1.
Circonferenza del metatarso ———	o.	6.	o.
Lunghezza dal tallone fino all'estre- mità delle ugne —————	o.	9.	o.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	2.	8.
Larghezza del piede posteriore ———	o.	3.	2.
Lunghezza delle ugne più grandi —	o.	o.	10 $\frac{1}{2}$
Larghezza alla base —————	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$

Questa foca pesava ventisei libbre; staccando dalla pelle la membrana carnosa, si son trovati sotto lo scalpello de' peli aspri e duri, eh' erano l'uno all'altro attaccati, e eh' erano disposti come fibre muscolari.

Aprendosi l'addomine, le viscere si son trovate situate come negli altri quadrupedi. L'epiploon era cortissimo, molto sottile e situato dietro lo stomaco. Il fegato s'estendeva molto più a destra che a sinistra, e l'arteria epatica era molto apparente al lungo del legamento sospensorio dal fegato fino all'ombelico. Lo stomaco si trovava nel mezzo della regione epigastrica; esso era curvato in arco di circolo, la cui convessità si trovava all'indietro, e le due estremità all'innanzi: il piloro terminava quella del lato destro.

Il canale intestinale s'estendeva all'indietro sotto lo stomaco verso la sua estremità posteriore; in

questo sito il canale intestinale si ricurvava, e in seguito si prolungava all' innanzi fin contro il piloro, faceva varj piccoli giri sotto lo stomaco, nella regione ombelicale, nel lato sinistro, nel lato destro, nelle regioni iliache e nell'ipogastrica, finalmente s'estendeva all' innanzi dalla regione ipogastrica fino al sito del piloro ove si trovava il cieco. Il colon era molto corto, e formava sotto lo stomaco un piccol arco, la cui convessità era rivolta all' innanzi.

Lo stomaco [tav. XI., fig. 1.] era diverso da quello degli altri animali per la sua forma; non aveva punto di fondo: l'esofago metteva capo all'estremità sinistra [A] dello stomaco, ch'era molto lungo a proporzione della sua grossezza; esso non aveva punto di curvatura nella parte che s'estendeva dall'esofago [A] fino all'angolo [B] che formava la parte destra, come negli stomaci della maggior parte dei quadrupedi: quest'angolo era ben contrassegnato, e 'l restante della parte destra che si trovava tra l'angolo [B] e 'l piloro [C] era lungo e aveva poco diametro: la curvatura, che si chiama *gran curvatura* nello stomaco dell'uomo, e che in fatti vi è notabilissima, nello stomaco della foca aveva poca convessità dalla curvatura [D], che si trovava dietro l'angolo [B] fino all'esofago [A].

Gl'intestini tenui avevan tutti presso a poco la stessa grossezza; ma la porzione più grossa [E] si trovava nel duodeno, e la più piccola [A,

fig. 2.] nell' ileo . Il cieco [B] era molto corto e rotondo all' estremità . La prima porzione [C] del colon aveva il maggior diametro: la grossezza di questo intestino era minore nel resto della sua estensione e eguale a quella del retto, eccettuato vicino all' ano, ove il retto era più grosso che il colon alla sua origine .

Il fegato era grandissimo, ma aveva a proporzione minor grossezza, che lunghezza e larghezza . I lobi eran molto lunghi e puntuti all' estremità; ve n' eran quattro, due a destra, uno interamente a sinistra, e il quarto nel mezzo: quest' ultimo era diviso in tre parti per via di due scissure, nell' una delle quali si trovava il legamento sospensorio, e la vescichetta del fiele era nell' altra ch' era a destra della prima . Il lobo sinistro e il lobo inferiore e anteriore del lato destro avevano presso a poco un' egual grossezza sì l' uno che l' altro; il lobo superiore e posteriore del lato destro era il più piccolo di tutti, e aveva alla radice un' appendice ben contrassegnata . Quando il Sig. Perrault nel fegato della foca (*) ha contati sei lobi, senza dubbio ha prese le tre porzioni del lobo medio per tre lobi particolari, poich' egli dice che la vescichetta del fiele era situata fra due lobi; ma io non comprendo come mai si siano potuti trovare dieci lobi nel fegato della foca;

(*) Memorie per servire alla Storia Naturale degli animali; *Parte I.*

poichè pigliando anche l'appendice del piccol lobo destro per un lobo particolare, non vi farebbero che sette lobi in tutto. Questo fegato aveva un color rossiccio, e pesava una libbra sett' once e una dramma. La vescichetta del fiele era d'una grandezza proporzionata a quella del fegato, e aveva una figura allungata e irregolare.

La milza si trovava situata trasversalmente da destra a sinistra sullo stomaco, e aveva presso a poco la stessa larghezza in tutta la sua lunghezza. Era d'un color rossiccio e più carico di quello del fegato: pesava sette dramme e diciotto grani.

Il pancreas era molto grande, grossissimo, assai compatto e di colore scarnatino: aveva una figura irregolare e allungata: la sua estremità destra era più larga che la sinistra.

I reni erano molto grandi; essi avevano poca cavità, ed erano esteriormente tubercolosi (*il rene destro è rappresentato tav. XII., fig. 1.*): prendoli si vedeva distintamente che tutti questi tubercoli erano altrettanti piccoli reni che formavano il grande (*il rene sinistro è rappresentato, veduto interiormente fig. 2.*); nel mezzo di ciascun piccol rene vedevasi una papilla biancastra [AAA], d'onde usciva l'urina: essa colava nei condotti [BBB], che si univano insieme per formar l'uretra [C].

Il centro nervoso del diaframma era pochissimo esteso, e la parte carnosà aveva molta grossezza. Il cuore [A, *tav. XIII.*] si trovava nel mezzo

del petto un po' più a destra che a sinistra; la sua punta era diretta all'indietro e poco apparente, perch' esso aveva una figura molto straordinaria; era piatto sopra e sotto; formava quasi un ovale, il cui gran diametro [BC] s'estendeva da destra a sinistra da un lato all'altro di questa viscera, e 'l piccol diametro [DE] dalla base fino alla punta: l'orecchietta destra [F] era pochissimo più estesa che la sinistra [G]: i principali vasi sanguigni erano grossissimi; si vedeva distintissimamente il canale arteriale, che comunicava dall'arteria polmonare all'aorta; il suo diametro preso esteriormente era di due linee e mezzo. Dall'arco [L] dell'aorta uscivano tre rami [HIK].

I polmoni [MN] erano grandissimi; non eravi che un lobo in ciascuno; il polmon sinistro [N] era un poco più grande del destro [M].

L'estremità della lingua [A, *tav. XIV.*] era incavata, quasi forcuta, molto stretta e molto sottile in paragone del resto, ch'era largo, grosso e corto. La parte anteriore [B] era guernita di piccole papille, e sparsa di grani rotondi e poco visibili: sulla parte posteriore [C] eranvi alcune piccole glandule, e delle papille larghe, ma molli e poco elevate.

L'epiglottide [D] era curvata al disotto e all'indietro, grossa, e di figura triangolare un poco allungata. Gli anelli della trachea arteria [E, *tav. XIV.*, e O, *tav. XIII.*] erano cartilagineosi in tutta la loro estensione (*Veggonsi nella *tav. XIV.**

due primi pezzi FG dell'osso iside). Sul palato non eranvi solchi contraffegnati; scorgevanfi soltanto alcune grinze irregolari sulla parte anteriore e sulla parte posteriore, e una cavità molto larga sul mezzo.

Il cervello era molto grande, e 'l cervelletto ancor più grande a proporzione; questo si trovava situato al disotto della parte posteriore del cervello, e sulla sua superficie eranvi delle larghe circonvoluzioni presso a poco come sul cervello, e una fascia convessa e scanalata trasversalmente, che s'estendeva da un'estremità all'altra sul mezzo. Il cervello pesava sei once e due dramme e mezzo, e 'l cervelletto un'oncia e due dramme.

La vulva e l'ano erano situati sotto l'origine della coda tra i due talloni dell'animale: l'ano [A, tav. XV.] formava un cordone al di fuori della pelle e sporgeva in fuori cinque linee di lunghezza: la vulva toccava immediatamente l'ano (*al sito B, la vulva e la vagina sono in questa figura aperte*): le labbra [CCC] della vulva erano molto sottili, e non si distingueva il sito della clitoride che per una piccolissima cavità [D], ma comprimendo le pareti della vagina si sentiva la clitoride molto distintamente, poich'era grossa e molto lunga. La vagina [EF] s'estendeva tra le due gambe dell'animale; essa aveva un restringimento nel mezzo della sua lunghezza al sito dell'orifizio [G] dell'uretra, e una specie di cordone trasversale [H], la cui estremità [G]

faceva parte dell' uretra. La vescica [I] aveva una figura allungata e quasi conica. L' orifizio [K] della matrice [L] era largo e si trovava al mezzo d' un cordone piatto, ch' era formato dal collo della matrice, e che s' estendeva due linee di lunghezza nella vagina: il collo non era contrassegnato che dall' anzidetto cordone, e il corpo [L] non aveva che pochissima estensione: i corni [MN] erano cilindrici e diretti in linea retta: i testicoli [OP] avevano esteriormente e interiormente un color biancastro.

pie. poll. lin.


Lunghezza degl' intestini tenui dal pi-			
loro fino al cieco —————	54.	0.	0.
Circonferenza del duodeno nei siti			
più grossi —————	0.	2.	9.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	7.
Circonferenza del digiuno nei siti più			
grossi —————	0.	1.	9.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	6.
Circonferenza dell' ileo nei siti più			
grossi —————	0.	2.	0.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	6.
Lunghezza del cieco —————	0.	1.	0.
Circonferenza al sito più grosso —	0.	2.	9.
Circonferenza al sito più sottile —	0.	1.	9.
Circonferenza del colon nei siti più			
grossi —————	0.	4.	3.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	3.	3.
Circonferenza del retto vicino al colon	0.	3.	3.
Circonferenza del retto vicino all' ano	0.	4.	9.

pied. poll. lin.


Lunghezza del colon e del retto presi insieme —————	1.	7.	0.
Lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco —	55.	7.	0.
Gran circonferenza dello stomaco —	1.	11.	6.
Piccola circonferenza —————	1.	0.	0.
Lunghezza della piccola curvatura, dall' esofago fino all' angolo che forma la parte destra —————	0.	8.	0.
Circonferenza del piloro —————	0.	1.	6.
Lunghezza del fegato —————	0.	6.	9.
Larghezza —————	0.	10.	0.
La sua maggior grossezza —————	0.	1.	0.
Lunghezza della vescichetta del fiele	0.	2.	6.
Il suo maggior diametro —————	0.	1.	1.
Lunghezza della milza —————	0.	6.	6.
Larghezza dell' estremità inferiore —	0.	0.	10.
Larghezza dell' estremità superiore —	0.	1.	3.
Grossezza nel mezzo —————	0.	0.	3.
Grossezza del pancreas —————	0.	0.	9.
Lunghezza dei reni —————	0.	3.	8.
Larghezza —————	0.	1.	11.
Grossezza —————	0.	0.	11.
Lunghezza del centro nervoso dalla vena-cava fino alla punta ———	0.	0.	9.
Larghezza —————	0.	0.	9.
Circonferenza della base del cuore —	0.	9.	3.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare —————	0.	2.	11.

pied. poll. lin.


Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare —————	o.	2.	2.
Lunghezza della lingua —————	o.	3.	2.
Lunghezza della parte anteriore dal freno fino all'estremità —————	o.	1.	0.
Larghezza della lingua —————	o.	1.	9.
Lunghezza del cervello —————	o.	2.	10.
Larghezza —————	o.	3.	1.
Groffezza —————	o.	1.	10.
Lunghezza del cervelletto —————	o.	1.	6.
Larghezza —————	o.	2.	8.
Groffezza —————	o.	0.	10.
Distanza tra l'ano e la vulva ———	o.	0.	3.
Lunghezza della vulva —————	o.	0.	9.
Lunghezza della vagina —————	o.	3.	10.
Circonferenza al sito più grosso ———	o.	3.	0.
Circonferenza al sito più sottile ———	o.	2.	0.
Gran circonferenza della vescica ———	o.	8.	8.
Piccola circonferenza —————	o.	5.	8.
Lunghezza dell'uretra —————	o.	1.	2.
Circonferenza —————	o.	0.	6.
Lunghezza del collo e del corpo del- la matrice —————	o.	0.	8.
Circonferenza —————	o.	0.	10.
Lunghezza dei corni della matrice ———	o.	3.	9.
Circonferenza —————	o.	0.	6.
Distanza in linea retta tra i testicoli e l'estremità del corno —————	o.	0.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della linea curva, che tra-			

















picd. poll. lin.

scorre la tromba	_____	o.	2.	o.
Lunghezza dei testicoli	_____	o.	o.	9.
Larghezza	_____	o.	o.	3.
Groffezza	_____	o.	o.	4.

La foca rassomiglia più agli altri animali quadrupedi pel suo scheletro [*tav. XVI.*] che per la forma esteriore del suo corpo intero . Le quattro gambe , benchè molto corte , son composte di tutti gli ossi , che si trovano nelle gambe dei quadrupedi . La testa e i denti hanno molte relazioni con que' degli animali carnivori , come i cani , i leoni , le tigri , le pantere , ec. ; nondimeno vi sono delle differenze grandi nello scheletro della foca , paragonato a quello degli altri animali .

Il cranio è largo e piatto alla sommità . Le orbite degli occhi son grandi . L'osso frontale non ha vestigio veruno d'apofisi orbitaria : l'orlo osseo delle orbite è interrotto nella sesta parte della loro circonferenza . Gli ossi proprj del naso son corti .

I denti sono al numero di trentaquattro , cioè , sei incisivi , due canini e dieci mascellari nella mascella superiore : quattro incisivi , due canini e dieci mascellari nella mascella inferiore . Gl' incisivi e i canini hanno molta somiglianza a quelli dei cani , dei gatti , dei leoni , ec. La maggior differenza ch'io abbia osservata fu i denti incisivi della foca , paragonandoli a quelli degli accennati animali , consiste nel numero degl' incisivi inferiori , poichè la foca non ne ha che quattro , mentre gli altri

mentovati animali ne hanno sei: nella foca vi ha uno spazio voto tra i due incisivi di mezzo, ma non vi si vede verun vestigio nè di denti, nè d'alveoli. I mascellari hanno una grossa punta nel mezzo, ed una o due piccole al dinanzi della grossa, e altrettante all' indietro: questi denti son poco diversi dai due primi mascellari inferiori del gatto. Fra tutti gli animali, che hanno trentaquattro denti, come la foca, il pipistrello, che noi abbiam chiamato *pipistrello propriamente detto*, è l'animale men diverso dalla foca relativamente ai denti; ma vi hanno differenze grandi per la loro figura e per la loro situazione, poichè il pipistrello ha sei incisivi nella mascella inferiore, e solamente quattro nella mascella superiore, al contrario di ciò che si trova nella foca.

Le apofisi spinose delle vertebre oervicali son corte, eccettuate quelle della seconda vertebra, ch' è alquanto elevata; essa però ha maggior larghezza dall' innanzi all' indietro, che in altezza.

Le vertebre dorsali non hanno le apofisi spinose più apparenti di quelle delle vertebre cervicali. Le coste sono al numero di quindici da ciascun lato, dieci vere e cinque false. Lo sterno è composto di dieci ossi molto stretti, l' ultimo de' quali è il più lungo di tutti. Le prime coste, una da ciascun lato, s' articolano colla parte anteriore del prim' osso dello sterno [*]; l' articolazione

(*) Nell' animale adulto forse il prim' osso dello

delle seconde coste è tra 'l primo e 'l second' osso; quella delle terze coste tra 'l secondo e 'l terz' osso, e così in seguito fino alle non e decime coste, che s'articolano tra 'l nono e 'l decimo osso dello sterno.

Le vertebre lombari sono al numero di cinque: le loro apofisi spinose hanno poca altezza: le apofisi trasverse sono più lunghe e inclinate all' innanzi.

L'osso sacro è composto di quattro false vertebre, e la coda di dodici: le prime hanno una piccola apofisi da ciascun lato.

La parte anteriore dell' osso dell' anca è corto, largo e curvato all' infuori; il catino è lunghissimo e molto stretto; parimente i fori ovali e il corpo dell' osso pube son molto allungati; esso ha due volte la lunghezza dell' osso dell' anca, al contrario di ciò che ho veduto negli atri animali quadrupedi; essi han tutti il corpo dell' osso pube men lungo dell' osso dell' anca. Nella foca gli ossi pubi son articolati col loro angolo presso a poco come nell' uomo.

Il lato anteriore e la base dell' omoplata sono esterlormente convessi nella lunghezza, e formano un arco di circolo irregolare: il lato posteriore è concavo, e l'angolo che lo separa dalla base è molto sporgente. Non vi ha punto di clavicole.

sterno si prolunga più all' innanzi: nello scheletro, di cui si parla, non vi ha che una cartilagine al dinanzi dell' articolazione delle prime coste.

Gli ossi del braccio e dell'avan-braccio sono cortissimi, e presso a poco della stessa lunghezza gli uni che gli altri. L'osso del braccio sembra esser difforme, principalmente nella sua parte superiore; esso non può esser paragonato che all'osso del braccio della talpa (*), benchè la sua figura non sia così irregolare, e benchè sia anche più corto a proporzione della lunghezza del corpo dell'animale. Le tuberosità dell'umero della foca sono eccessivamente grandi, e per conseguenza la doccia, che si trova tra due è molto larga e profondissima, e l' suo orlo è elevatissimo, e molto grosso al di sotto della grossa tuberosità lungo la parte media dell'osso.

L'estremità inferiore dell'osso del radio è piatta e larghissima; l'estremità superiore dell'osso dell'ulna è pure molto sottile e larghissima.

L'osso della coscia ha minor lunghezza che l'osso del braccio: esso è più corto a proporzione che l'osso della coscia della talpa, e eccessivamente corto a proporzione della lunghezza del corpo della foca. Il gran trocantere è più grosso e più elevato che la testa; non vi ha verun vestigio del piccol trocantere; l'estremità inferiore dell'osso è larghissima.

Gli ossi della gamba son molto più lunghi che quelli dell'avan-braccio. Il peroneo è grosso in paragone della tibia.

(*) Vedi il Tomo XVI. di quest'Opera, pag. 115.

Non vi son che tre ossi nel prim' ordine del carpo ; il primo occupa il sito dello scafoide e del lunare : il second' ordine è composto di quattr' ossi ; il primo è al disopra del prim' osso del prim' ordine del carpo , e in parte al disotto del second' osso del second' ordine ; quest' osso è parimente in parte al disopra del second' osso del metacarpo : il terz' osso del second' ordine del carpo è al disopra del terz' osso del metacarpo , e 'l quart' osso del carpo al disopra del quarto e del quint' osso del metacarpo .

Il tarso è composto di sett' ossi come nell' uomo .

Il primo del metacarpo è il più grosso e 'l più lungo : il secondo è men grande del primo e più grande del terzo ; il quarto e 'l quinto sono i più piccolli di tutti , e presso a poco egualmente grandi l' uno che l' altro .

I cinque diti dei piedi anteriori si diminniscono successivamente di grandezza dal primo fino al quinto : benchè il primo , ch' è il pollice , sia il più grande , non ostante non ha che due falangi ; ma la prima ha sola maggior lunghezza che le due prime falangi del più gran dito , prese insieme .

Il metatarso e i diti dei piedi di dietro son molto più lunghi che il metacarpo e i diti dei piedi anteriori . Il prim' osso del metatarso è il più grosso e il più lungo come nel metacarpo , ma il terz' osso è il più corto . Il secondo e 'l quinto sono presso a poco egualmente lunghi l' uno che l' altro , ed i più lunghi dopo il primo .

Il quinto dito dei piedi di dietro è il più lungo , e quello di mezzo è il più corto . Benchè il primo dito , ch' è il pollice , non abbia che due falangi , è nondimeno il più lungo di tutt' i diti , eccettuato il quinto , perchè la sua prima falange ha molto maggior lunghezza che nessun'altra di quelle degli altri diti . Le ungue dei piedi di dietro son più piccole di quelle de' piedi anteriori .

La foca non è formata per esser portata sulle sue gambe , nè per camminare , perchè gli offi delle gambe non sono al di fuori del corpo : quelli del braccio e dell' avan-braccio sono incollati ed anche in parte piatti sotto la pelle contro il petto fino alla giuntura della mano ; onde non vi ha che il metacarpo e le dita , ch' escano al di fuori e che faccian le veci di gambe anteriori . Quelle di dietro hanno una situazione anche più straordinaria ; esse fanno parte del corpo , e sono involte colla maggior parte della coda in un prolungamento della pelle del corpo , e dirette all' indietro , di modo che le ginocchia e le rotelle si trovano situate da ciascun lato del catino , e i talloni allato della coda e delle parti della generazione . Non vi ha che il metatarso e i diti che sian separati dalla coda . I talloni son rivolti all' indentro e non all' indietro come quelli degli altri animali .

pie'd. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità

delle mascelle fino all' occipite — o. 6. 2.

La maggior larghezza della testa — o. 3. 9.

pied. poll. lin.

Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità fino all' orlo po- steriore dell' apofisi condiloidea —	o.	3.	11.
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini —	o.	1.	1.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —	o.	o.	9.
Lunghezza della detta apertura —	o.	1.	2.
Larghezza —	o.	o.	11.
Lunghezza degli ossi proprj del naso —	o.	1.	4.
Larghezza al sito più largo —	o.	o.	3.
Larghezza delle orbite —	o.	1.	7.
Altezza —	o.	1.	8.
Lunghezza dei denti canini al difuori dell' osso —	o.	o.	6.
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra cervicale —	o.	o.	4.
Larghezza dall' innanzi all' indietro —	o.	o.	9.
Lunghezza della dodicesima costa, ch'è la più lunga —	o.	5.	4.
Larghezza della parte anteriore dell' osso dell' anca —	o.	1.	4.
Lunghezza dal mezzo della cavità co- tiloidea fino all' estremità superiore dell' osso —	o.	1.	9.
Lunghezza dei fori ovali —	o.	2.	o.
Larghezza —	o.	o.	11.
Larghezza del catino —	o.	1.	3.
Altezza —	o.	4.	o.

pied. poll. lin.

Lunghezza dell' omoplata —————	o.	3.	7.
Lunghezza dell' umero —————	o.	2.	11.
Larghezza della sua parte superiore	o.	1.	3.
Groffezza —————	o.	1.	4.
Lunghezza dell' osso dell' ulna ———	o.	3.	4.
Lunghezza dell' olecranio —————	o.	0.	8.
Larghezza —————	o.	0.	4.
Groffezza —————	o.	1.	2.
Lunghezza dell' osso del radio ———	o.	2.	8.
Larghezza della sua estremità infe- riore —————	o.	0.	6.
Groffezza —————	o.	1.	0.
Lunghezza del femore —————	o.	2.	9.
Circonferenza del mezzo dell' osso —	o.	1.	6.
Larghezza della sua estremità infe- riore —————	o.	1.	7.
Lunghezza della tibia —————	o.	4.	9.
Lunghezza del peroneo —————	o.	4.	6.
Altezza del carpo —————	o.	0.	9.
Lunghezza del calcagno —————	o.	1.	9.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo, ch' è il più lungo ———	o.	1.	4.
Lunghezza del quinto, ch' è il più corto —————	o.	0.	10.
Lunghezza della prima falange del pol- lice —————	o.	1.	7.
Lunghezza della seconda —————	o.	0.	9.
Lunghezza della prima falange del se- condo dito —————	o.	0.	11.

picd. poll. lin.

Lunghezza della seconda —————	o.	o.	7.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del quinto dito, ch' è il più corto —	o.	o.	8. $\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del prim' osso del meta- tarso, ch' è il più lungo —————	o.	2.	3.
Lunghezza del terzo, ch' è il più corto —————	o.	1.	5. $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del pollice —————	o.	2.	o.
Lunghezza della seconda —————	o.	1.	2. $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del se- condo dito —————	o.	1.	7.
Lunghezza della seconda —————	o.	1.	o.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del terzo dito, ch' è il più corto —	o.	1.	3.
Lunghezza della seconda —————	o.	1.	o.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	8.

Abbiam veduta un' altra foca, ch' era diversa dalla prima per le proporzioni del corpo; essa era meno allungata e aveva il collo più corto e più grosso; le ugne erano più lunghe e s' estendevano al di là degli orli della membrana, ch' è tra le dita. Il pelo era della stessa lunghezza e della stessa qualità che quello della nostra prima foca, ma non era lustro e coperto di mugilagine che sulle guance.

Queste due foche avevano presso a poco i medesimi colori sul pelo, ma la seconda aveva più di nero tra le spalle e sopra una parte del dorso; essa m'è paruta rassomigliare alla foca dell' Oceano, che Rondelet descrisse e distinse dalla foca del Mediterraneo, chiamata in Marsiglia *buc di mare* (*); io credo che quest' ultima sia la stessa che la nostra seconda foca, per quanto ho potuto giudicare sulle cattive figure, che Rondelet ha date, e sulle sue descrizioni; ma vi ha ogni motivo di credere che le nostre due foche provengano dall' Oceano, e che siano per conseguenza della medesima specie, ma di diverse razze, che nell' Oceano variano come nel Mediterraneo.

Nel Gabinetto del Re vi ha una piccola foca delle Indie [*tav. IX., fig. 2.*], ch' è presso a poco della stessa figura che quelle delle nostre coste; ma è d' una specie differentissima e molto caratterizzata per la grandezza del corpo, per le orecchie, pel colore e per la qualità del pelo, e per la forma dei denti e dei piedi ec. Ho vedute le pelli imbottite dei due individui della specie di foca, di cui qui si parla; il più grande di questi animali impagliati m'è paruto esser adulto, ma non aveva che due piedi e due pollici e mezzo di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda, e per conseguenza era presso a un quinto men lungo della foca, di cui ho riferite le misure: esso aveva


(*) Storia dei Pesci, *Libro XVI.*, pag. 341. e 343.

il collo più lungo e il corpo più corto; le gambe anteriori si trovavano al mezzo della lunghezza del corpo intero: quest' animale aveva una piccola conca alle orecchie. Il pelo era più lungo e più morbido di quello delle altre foche, aveva fino a un pollice di lunghezza, era lustro, ondeggiante ed anche riccio in alcuni siti; era nero sulla parte superiore della testa, del collo e del corpo, e bruno-nericcio sulla faccia inferiore e su i piedi: allontanando i peli, si vedeva ch' essi avevano un color fulvo-pallido verso la radice. La pelle della pianta dei piedi era nuda e di color bruno, con delle grinze o linee longitudinali molto apparenti. Le ungue eran piccolissime, e la pelle che univa i diti s' estendeva sotto le ungue, si prolungava molto al di là di esse, e terminava con un orlo frastagliato, di cui ciascuna parte sporgente si trovava di grandezza proporzionata a quella del dito, a cui essa corrispondeva; le alette adunque di questa foca sono non solamente fra i diti, ma anche all' estremità dei piedi, e i frastagli dei loro orli rappresentano dei diti: vedesi parimente un prolungamento delle alette sotto le ungue delle altre foche; ma tali ungue son grandi e s' estendono al di là delle alette: la pianta dei piedi di queste foche è coperta di pelo come il rimanente del corpo.

La foca delle Indie aveva sei denti incisivi nella mascella superiore, quattro nell' inferiore, e quattro canini in ciascuna mascella come le altre foche;

224 *Descrizione della Foca.*

ma gl' incisivi eran differentissimi; i quattro di mezzo della mascella superiore eran grossi e forcuti, avevan ciascuno due rami, l' uno all' innanzi e l' altro all' indietro: io non aveva mai veduta siffatta biforcazione nei denti incisivi d' alcun altro animale; l' ultimo da ciascun lato era molto sottile e cilindrico; i due incisivi di mezzo della mascella inferiore erano situati l' uno contro l' altro e egualmente grossi che i più grandi del disopra; ciascun d' essi terminava con tre piccoli lobi; l' incisivo esteriore da ciascun lato era corto e puntuto. Nelle pelli di foche delle Indie, che hanno servito di soggetto per questa descrizione, non eravi stata lasciata che una parte delle mascelle, onde non ho veduti che i primi denti mascellari: essi mi sono sembrati differenti da quelli delle altre foche, erano a proporzione più corti e più piccoli, non avevano che una punta, ed erano molto più distanti gli uni dagli altri.



DE-






Fig. 1.



Fig. 2.

BIBLIOTECA NAZIONALE
ROMA
ESTERIO EMANUELE

Fig. 1.






Fig. 2.







IL MORSO

DESCRIZIONE

DEL MORSO.

IL morso [*tav. XVII.*] rassomiglia molto alla foca [*tav. XVIII.*] per la forma del corpo intero, 'eccettuata la testa; invece d'un muso allungato, il morso ha una specie di muso o di faccia che non s'estende in alto che fino al disopra del naso, ov' essa termina con due convessità, che sono presso a poco a distanze eguali dalle nari e dagli occhi. Il frontale, cioè la parte della testa che nei quadrupedi s'estende dagli occhi fino all'estremità del muso, forma nel morso un gomito tra le nari e gli occhi. La faccia, di cui si è fatta menzione, è al disotto del detto gomito; la direzione del suo piano è presso a poco verticale; la fronte e la sommità della testa son dietro il gomito del frontale sopra un piano orizzontale. Questa straordinaria struttura è cagionata da due zanne o denti grandissimi, ch' escono dalla parte anteriore della mascella superiore, e che son diretti al basso e un poco all' infuori e curvati all' indietro: gli alveoli di siffatti denti formano i due lati del muso, e 'l loro fondo è sotto il gomito del frontale: le due convessità, che sono al disopra del muso al sito del detto gomito, corrispondono al fondo di ciascun alveolo: all' uscir dagli alveoli i detti denti sono a tre pollici e mezzo di distanza

Tab. XXVII.

O

l'un dall' altro , e lasciano apparir tra essi l'estremità del labbro inferiore ; il labbro superiore è grandissimo , perchè passa intorno ai due grossi denti ; esso è un poco incavato nel mezzo , al sito , con cui tocca il labbro inferiore . Nel morso , che ha servito di soggetto per questa descrizione , i denti escono della lunghezza di undici pollici e mezzo al di fuori della bocca : le narici son situate a tre pollici e mezzo al disopra del labbro ; ma queste misure non possono essere esatte , perchè il soggetto di questa descrizione non è che una pelle disseccata . A questa pelle sono attaccati una gran parte degli ossi della testa , le gambe e 'l membro : essa è guernita d'un pelo di quattro linee in circa di lunghezza , e molto più corto sulla testa e sulle gambe : questo pelo è fino , fodo e di color olivastro , gialliccio e rossiccio in differenti siti : non restanvi che piccolissime parti delle setole dei mustacchi , ch' escono da grossi buchi situati gli uni vicino agli altri sopra tutta la parte anteriore del labbro superiore : tali setole son bianche e piatte , hanno due terzi di linea di larghezza e un terzo di linea di grossezza . La pelle ha undici piedi e mezzo di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda , otto piedi e mezzo di circonferenza dietro i piedi anteriori , e cinquantaquattro pollici dinanzi i piedi posteriori . Il muso ha otto pollici e un quarto nella sua maggiore altezza , dieci pollici di larghezza nel basso , e sei pollici e mezzo nell' alto . L'estremità del

muso è a trentanove pollici di distanza dai piedi anteriori , che son distanti una pertica dai piedi posteriori . I piedi anteriori hanno diciannove pollici di lunghezza e nove pollici e tre quarti di larghezza ; i posteriori son lunghi tredici pollici , e hanno fino a venti pollici di larghezza . La coda è di forma triangolare , ha sei pollici di larghezza alla sua origine , e solamente quattro pollici di lunghezza . Il membro è lungo un piede e otto pollici . Le ugne son piccolissime , brune e piegate in doccia ; le più grandi hanno un pollice di lunghezza e cinque linee di larghezza alla base .

Dalla pelle , di cui si parla , non dedurrò una circostanziata descrizione ; i piedi e 'l membro si sono difformati pel disseccamento : farà meglio il descriverli sopra un feto e sopra un membro d'un morso adulto , che trovansi nel Gabinetto del Re . Questo feto , e la pelle , di cui si è fatta menzione , hanno servito di modello pel disegno del morso della *tav. XVII.* ; il feto ha data la forma del corpo , della coda , delle gambe e dei piedi , e la testa è stata disegnata su quella ch' è attaccata alla pelle disseccata , e che ha il muso , il gomito del frontale , la bocca e i lunghi denti in buono stato . Credo che questa figura , ch' è verace quanto può esserlo in mancanza dell' animal vivo o morto recentemente , sia per lo meno più esatta di quelle , ch' hanno date Mortens (*),

O 2

(*) Descrizione di Spitzbergen , *chap. IV.*

e Anderson (*), e ch  son riguardate come le migliori, che si sian vedute fino al presente.

Il feto   piccolissimo, ha meno d' un mezzo piede di lunghezza dalla sommit  della testa fino all' origine della coda . Il frontale non fa punto ancora di gonito , e per conseguenza non vi ha il muso come nell' adulto , perch  i denti non son formati : ma il labbro superiore   gi  grossissimo ; vi son de' buchi e delle finissime fetole che ne escono . Gli occhi son ferrati ; e non vedesi che l' apparenza dell' orifizio delle orecchie investigando con un crine ; ho trovato anch' esso ferrato . I piedi anteriori sono a due pollici e mezzo di distanza dai posteriori : i quattro piedi rassomigliano a quelli della foca s  esteriormente , come interiormente ; bench  i loro ossi sian peranco quasi interamente cartilaginei , nondimeno mi son paruti presso a poco somiglianti a quelli della foca : il numero , la disposizione e la forma delle dita e delle ugne mi son parute parimente esser le stesse in amendue questi animali .

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero , misurato in linea retta dall' estremit� del muso fino all' ano —————	o. 5. 6.
Lunghezza della testa dall' estremit� del muso fino all' occipite ———	o. 1. 6.

(*) Storia Naturale di Groenlandia , ec. *Tomo II.*,
pag. 159. e seguenti .

pied. poll. lin.

Circonferenza dell' estremità del muso	o.	1.	10.
Circonferenza del muso , presa sotto gli occhi	o.	2.	5.
Contorno dell' apertura della bocca	o.	o.	8.
Distanza tra i due nasali	o.	o.	0 $\frac{3}{4}$
Distanza tra l' estremità del muso , e l' angolo anteriore dell' occhio	o.	o.	7.
Distanza tra l' angolo posteriore e l' o- recchia	o.	o.	5.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro	o.	o.	2.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi , seguendo la curvatura del frontale	o.	o.	11.
La stessa distanza in linea retta	o.	o.	8.
Circonferenza della testa , presa tra gli occhi e le orecchie	o.	3.	2.
Distanza tra le due orecchie , presa al basso	o.	o.	11.
Lunghezza del collo	o.	o.	11.
Circonferenza del collo	o.	2.	6.
Circonferenza del corpo , presa dietro i piedi anteriori	o.	4.	7.
La stessa circonferenza presa sul mezzo	o.	4.	4.
La stessa circonferenza dinanzi i pie- di posteriori	o.	2.	10.
Lunghezza del tronco della coda	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Circonferenza all' origine del tronco	o.	o.	5.
Circonferenza della giuntura	o.	1.	o.

Circonferenza del metacarpo ———	o.	1.	1.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne ———	o.	o.	7.
Circonferenza del metatarso ———	o.	o.	10.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne ———	o.	o.	9.
Larghezza del piede anteriore ———	o.	o.	8.
Larghezza del piede posteriore ———	o.	o.	10.
Lunghezza delle ugne più grandi —	o.	o.	$0\frac{2}{3}$
Larghezza alla base ———	o.	o.	$0\frac{1}{3}$

Aprendo l'addomine non ho veduto punto d'epiploon; esso era estremamente corto e nascosto contro lo stomaco. Il fegato copriva lo stomaco e s'estendeva tanto a sinistra, quanto a destra. Lo stomaco era interamente a sinistra tra 'l fegato e gl' intestini, che per via di piccoli giri occupavano tutto il resto dell' addomine fino alla matrice.

Il duodeno s'estendeva fino al rene destro; si ripiegava e si prolungava all' indentro prima d'unirsi al digiuno, che faceva i suoi giri nel lato sinistro, nella regione ipogastrica e nell' ombelicale: in seguito i giri dell' ileo erano nella regione ipogastrica e nel lato destro. L' ileo passava da destra a sinistra dietro lo stomaco, e metteva capo nell' ipocondro sinistro al cieco, ch' era diretto da sinistra a destra. Il colon faceva de' giri sugli intestini tenui prima d'unirsi al retto.

Lo stomaco non era diverso da quello della foca se non perch' era più gonfio nella sua parte sinistra al di sotto dell' esofago.

Gl' intestini tenui avevano due piedi e mezzo di lunghezza dal piloro fino al cieco. La lunghezza del colon e del retto presi insieme era di quattro pollici; così il canale intestinale in intero, non compreso il cieco, aveva due piedi e dieci pollici di lunghezza. Il cieco era sì piccolo che esteriormente non aveva che l'apparenza d'un tubercolo; ma interiormente vi ho veduta una piccola valvula che m' ha determinato a credere che questo tubercolo fosse un cieco, tanto più che non ve n' era nessun altro su tutta la lunghezza del canale intestinale, che in fatti si trovava al sito ove debb' essere il cieco, e che d'altra parte quest' intestino è piccolissimo nella foca, che ha molta relazione a quest' animale. Il canale intestinale aveva presso a poco la medesima grossezza in tutta la sua estensione, per quanto ne ho potuto giudicare in un feto, in cui tutte le viscere eran sì indurate per l'azione dello spirito di vino.

Il fegato m' è paruto rassomigliare a quello della foca pel numero, per la forma e per la situazione de' lobi, e per quella della vescichetta del fiele; ma questa viscera era molto grossa.

La milza aveva la stessa situazione che quella della foca, ma era più stretta alle sue estremità che al mezzo.

I reni erano grandissimi e situati l' uno per contro l' altro; essi eran composti di tubercoli, e mi parvero rassomigliare interamente a quelli della foca.

Il polmon dritto avea quattro lobi , tre de' quali eran disposti in fila, e 'l quarto si trovava vicino alla base del cuore , come nella maggior parte dei quadrupedi : ma nel feto , di cui si parla , il lobo anteriore e 'l lobo medio erano in parte uniti insieme . Nel polmon sinistro non eranvi che due lobi .

Il cuore era rotondo alla punta ; avea un pollice e sette linee di circonferenza alla base , sette linee d'altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare , e cinque linee e mezzo fino al sacco polmonare . Dall'arco dell' aorta uscivano quattro rami .

La lingua era incavata all' estremità come quella della foca .

Non ho scoperti che quattro capezzoli sul ventre , due da ciascun lato della regione ombelicale .

Tra l'ano e la vulva eravi una linea in circa di distanza . I corni della matrice non eran dritti , e formavano delle sinuosità . I testicoli eran grandissimi (*) e allungati , avevano tre linee di lunghezza , una linea e due terzi di larghezza , ed una linea e un terzo di grossezza . La vulva era situata tra i due talloni , e la vagina tra le due gambe come nella foca , e m'è paruto che tra le parti della generazione di questi due animali non vi fosse che poca differenza .

Quando gli ossi della testa del morso sono sco-

(*) Ho già osservato che i testicoli d'un feto femmina di cavallo erano molto grossi . Vedi il Tomo VII. di quest' Opera .

perti [tav. XVIII., fig. 1. e 2.], si vede distintamente che la struttura straordinaria della mascella superiore proviene dalla grandezza degli alveoli [A B] dei due lunghi denti o zanne, come tutta la struttura parimente strana della mascella superiore dell'elefante è cagionata dagli alveoli delle sue zanne. Nel morso la grossezza [C D] della mascella, benchè molto grande al disotto dell'apertura [E F] delle nari, non lo è a proporzione tanto, quanto nell'elefante; parimente su questa parte non appoggiasi punto di proboscide, che al contrario s'appoggia sulla parte anteriore [G] della mascella inferiore, di modo che essendo serrata la bocca [figura 1.], l'estremità di questa mascella si trova tra la parte inferiore [A] degli alveoli dei lunghi denti: il fondo [B, fig. 1. e 2.] di ciascuno dei detti alveoli è situato tra l'apertura delle nari [E F] e l'orbita [H] dell'occhio. L'orlo osseo delle orbite è interrotto in più d'un terzo della loro circonferenza tra l'apofisi dell'osso frontale, ch'è piccola, e quella [K] dell'osso della guancia, ch'è grande. Il cranio [L, fig. 1.] è poco esteso, ma le apofisi zigomatiche [M, fig. 1.] e mastoidea [N, fig. 1. e 2.] dell'osso temporale, tra le quali è l'ingresso [O, fig. 1.] del condotto uditario esterno, son grandissime. Sull'osso frontale [P] e sull'occipitale [Q] vi sono delle ineguaglianze e delle coste fortissime. La mascella inferiore [G R, fig. 1. e 2.] è picciola; i suoi rami son poco inclinati in alto.

I denti mascellari [SSSS, *fig. 2.*] sono al numero di quattro da ciascun lato di ciascuna mascella; così la vacca marina ha diciotto denti, compresi i due lunghi del dinanzi [TTVV, *fig. 1. e 2.*]. I mascellari son piccoli e d'una figura conica, la cui punta fa la radice del dente, che non è attaccato nel suo alveolo che colle sue asprezze. La base è molto ineguale; il fregamento dei denti del disotto contro quelli del disopra vi cagiona delle cavità, che la rendono molto irregolare.

I denti del dinanzi della testa, che serve di soggetto per questa descrizione, hanno un piede, otto pollici e mezzo di lunghezza misurata sulla loro curvatura convessa; ma non escono dall'alveolo e che un piede due o tre pollici di lunghezza; essi hanno sei pollici di circonferenza alla loro radice, e sette pollici e mezzo all'uscir dall'alveolo: il dente diventa sempre più piccolo fino alla sua estremità [V], che non ha più di tre pollici di circonferenza. Essi son piatti su i lati, scanalati ed anche folcati longitudinalmente: la loro curvatura suol variare in differenti individui, e quella dei denti della testa, di cui si parla, fa con la sua convessità l'arco d'un circolo di due piedi e mezzo di diametro. La cavità, che questi denti hanno come le zanne dell'elefante, e i denti incisivi e canini dell'ippopotamo, non ha che tre pollici e un terzo di profondità in quelli che servono di soggetto per questa descrizione.

Questi denti hanno esteriormente un color gialliccio , e son composti d'una scorza e di altre due sostanze . Sotto la scorza , che non ha che una linea di grossezza , vi ha una sostanza compatta , grossa circa un quarto di linea ; essa è d'un bruno scolorito : ho osservato che in certi aspetti essa è gattigliosa , e che per questa ragione ha qualche relazione alle parti grige biancastre della pietra *chatoyant* che chiamasi l'*occhio di gatto* . La parte compatta delle zanne del morso acquista un bel lustro , egualmente che la scorza , il cui colore è poco diverso da quello della sostanza compatta . Il resto delle zanne è composto di aletti longitudinali e di tubercoli uniti gli uni agli altri : essi appajono nel loro intero al fondo della cavità , ch'è alla radice di queste zanne . Quando siffatta sostanza tuberculosa è segata e pulita , ha un color gialliccio e un lustro molto ineguale .

pied. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità delle mascelle fino all' occipite —	1. 3. 6.
Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi condiloidea —	o. 10. 6.
Larghezza della parte anteriore —	o. o. 11.
Larghezza al sito del contorno dei rami —	o. 2. 11.
Larghezza dei rami al disotto della grande incavatura —	o. 3. 9.

236 *Descrizione del Morso.*

pied. poll. lin.

Distanza misurata esteriormente tra i contorni dei rami —————	o.	7.	o.
Distanza tra le apofisi condiloidee —	o.	4.	5 $\frac{1}{2}$
Grosshezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore ———	o.	2.	6.
Larghezza di questa mascella al sito dei lunghi denti —————	o.	7.	2.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —————	o.	3.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della detta apertura ———	o.	1.	10.
Larghezza —————	o.	2.	o.
Diametro delle orbite —————	o.	2.	1.
Lunghezza dei lunghi denti al di- fuori dell' osso —————	1.	o.	o.
Larghezza alla base —————	o.	2.	10.
Lunghezza dei più grossi denti ma- scellari al difuori dell' osso ———	o.	o.	6.
Diametro —————	o.	o.	11.





Fig. 1.




Fig. 2.






Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.

Fig. 6.







II. LAMANTINO *T. Vies. inc.*

DESCRIZIONE

D'UN EMBRIONE DI LAMANTINO
DELLA GUIANA.

Quest' embrione [*tav. XX.*] non aveva che dieci pollici e mezzo di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda , e sette pollici di circonferenza al sito più grosso . Il collo non era distinto ; e la testa non distingueva dal rimanente del corpo che pel muso , ch' era grossissimo , diretto obbliquamente al basso e all' innanzi , e terminato con una specie di musolo piatto e composto dalla parte anteriore del naso , dal labbro superiore , dall' estremità della mascella superiore e da quella dell' inferiore , e dal mento . Il labbro superiore era interrotto nel suo mezzo , e lasciava comparire l' estremità della mascella superiore ; non eravi punto di labbro inferiore ; il mento era molto più largo che l' estremità della mascella , ma molto corto , poichè non eravi che la distanza di quattro linee tra la strozza e' l' mento . Le aperture delle nari non erano distanti l' una dall' altra che una linea , e non si trovavano che due linee e mezzo tra esse e l' estremità del muso ; esse avevono ciascuna la forma d' una luna crescente , la cui convessità era dal lato della testa . Non ho scoperta verun vestigio nè di denti nè di orecchie.

Il lamantino ha dei piedi anteriori come il morfo: nell'embrione, che fa il soggetto di questa descrizione, si comprendevano già le tracce dei cinque diti, ch' erano chiusi sotto una pelle continuata, in forma di aletta. Vedevasi l'origine delle ugne, e nell'interno ho distinte le cartilagini, che debbono in seguito formare l'osso del braccio, quelli dell'avan-braccio, del carpo, del metacarpo e dei diti. I piedi avevano nove linee di larghezza al sito più largo: il corpo era informe e aveva sette pollici di circonferenza al sito più grosso, sei pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'ano, e quattro pollici e mezzo dall'ano fino all'estremità della coda. Non ho scoperto nessun vestigio degli ossi del catino, nè delle gambe nè dei piedi: per mezzo della sezione non ho trovate che le cartilagini, che debbono formare le vertebre della coda; esse erano contrassegnate esteriormente da un gonfiamento, che terminava in punta all'estremità della coda; eravi da ciascun lato un prolungamento della pelle in forma di semicircolo irregolare, che rendeva la coda più larga vicino alla sua estremità che alla sua origine, e che le dava in qualche guisa la figura della coda d'un castoreo; ma nei detti prolungamenti non si trovavano nessuna apparenze di cartilagini che possano indicare gli ossi delle gambe di dietro, le quali si è creduto poter esser confuse colla coda, perch' esse son piccolissime nella foca e nel morfo. Volendo giudicar del la-

dell' Embrione di Lamantino. 239

mantino dall' embrione, che ho descritto, mi sembra ch' esso non sia quadrupede, cioè che non abbia quattro gambe, ma solamente due.

Sull' alto della *tavola XX.* si son rappresentate la testa e la coda dell' embrione di lamantino, che ha servito di soggetto per questa descrizione: la coda è veduta dalla sua fascia inferiore.

Aprendo l'addomine, l'epiploon s'è trovato cortissimo. Il fegato s'estendeva tanto a sinistra quanto a destra, e abbracciava lo stomaco.

Il duodeno faceva de' giri vicino allo stomaco nella regione epigastrica: i giri del digiuno erano nella regione ombelicale e nelle regioni lombare e iliaca sinistra: i giri dell' ilco erano pure nell' iliaca sinistra e nell' ombelicale; nel mezzo di questa regione esso metteva capo al cicco: i giri del colon si trovavano nella regione ombelicale, nel lato destro, e nella regione ipogastrica, in seguito passava nell' iliaca sinistra, ove si univa al retto.

Lo stomaco [*tav. XXI., ov' esso è veduto dalla sua faccia superiore, e fig. 2., ov' è veduto dalla sua faccia inferiore*] aveva al suo fondo un' appendice [AB] in forma di cieco: la parte destra [CDE] dello stomaco si ripiegava all' indentro e si prolungava all' indietro prima di metter capo al duodeno [FG]: all' angolo della piegatura della detta parte destra eranvi due altre appendici [H, *fig. 1.*; e I, *fig. 2.*] curve in forma d'archi, l'una delle quali [H] era piegata sulla fac-

cia superiore dello stomaco, e l'altra [I] sulla faccia inferiore. Aprendo questa viscera, ho scoperto ch' essa era divisa in due borse al sito della piegatura [D, *fig. 2.*] della parte destra; che l'appendice [AB, *fig. 1. e 2.*] del fondo dello stomaco era vota, e comunicava nella prima borsa per mezzo d'un piccolissimo orifizio, e che le altre due appendici [H, *fig. 1.*; e I, *fig. 2.*] formavano parimente ciascuna una cavità e un piccolo orifizio vicino all' ingresso della seconda borsa: sulle pareti interiori di questa seconda borsa eranvi delle grinze trasversali.

Gl' intestini tenui avevano tre piedi di lunghezza dal piloro fino al cieco: la lunghezza del colon e del retto presi insieme era d'un piede e undici pollici; così la lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco, era di quattro piedi e undici pollici. Gl' intestini tenui sembravano esser tutti presso a poco della stessa grossezza. Il colon [AB, *tav. XXI.*] era grossissimo alla sua origine [A] sulla lunghezza di quattro linee solamente, e formava de' gonfiamenti; il restante del colon, benchè molto men grosso, aveva nondimeno maggior diametro che gl' intestini tenui, e la sua grossezza sembrava accrescersi a poco a poco verso il retto, ch' era anche più grosso. Il cieco [C] era corto e diviso in due rami [DE].

Il fegato [*tav. XXI.*] era grande come in tutti gli altri embrioni; esso non aveva che due lobi [ABCD] presso a poco di grandezza eguale,

dell' Embrione di Lamantino . 241

I' uno [A B] a destra , e l' altro [C D] a sinistra : il destro aveva sulla sua estremità inferiore una profonda scissura [E] ch' era diretta obliquamente all' innanzi , e che si separava quasi in due parti [A B] eguali . La vescichetta [F] del fiele era attaccata alla faccia interna della parte anteriore vicino al suo angolo inferiore e posteriore . Anche nel lobo sinistro eravi una scissura [D] sulla parte posteriore della sua estremità superiore .

Ho sospettato che un piccol tubercolo situato al dinanzi dell' appendice del fondo dello stomaco fosse la milza , poichè non ne ho scoperta nessun' altra . In tal caso il lamantino sarebbe anche diverso dai quadrupedi per la piccolezza estrema della milza .

I reni [A , *tav. XXI.*] erano allungati e situati l' uno per contro all' altro .

Il diaframma era ben formato ; non vi ho scoperto punto di centro nervoso : dopo d'averlo staccato , ho trovata al dinanzi una cavità che s' estendeva da ciascun lato fino alle coste , e che rinchiudeva il cuore [A B , *tav. XXII.*] , e il timo [C D] .

I polmoni s' estendevano fino all' estremità del petto , cioè fino alle ultime coste false ; ma la capacità , che si trovava sotto le coste non poteva esser riguardata in intero come un petto , poichè il fegato , lo stomaco , gl' intestini , ec. vi si trovavano situati sotto i due polmoni , quando l' ani-

male era piegato sul ventre nella sua attitudine naturale. M'è paruto che il diaframma si prolungasse all' indietro tra i polmoni e le altre viscere sopraccennate; così l'addomine era sotto una parte del petto al sito delle coste false, ch'era molto esteso; poichè di sedici coste non ve n'era che due vere, e lo sterno era cortissimo. La parte del petto, ch'era sotto le dette coste vere, aveva pochissima estensione, e non conteneva che il cuore, la trachea arteria, ec. I polmoni erano interamente sotto le coste false al disopra dell'addomine.

L'osso ioide [EF], la glottide [G, fig. 2.], la laringe [HI, fig. 1., e 2.] la trachea arteria [K] e la sua biforcazione in due rami [LM, fig. 1.] rassomigliavano a queste stesse parti vedute nei quadrupedi: ma i polmoni [NOPQ, fig. 1. e 2.] erano diversi dai polmoni dei quadrupedi per la loro allungatissima figura; e'l cuore [AB, fig. 2.] invece di trovarsi nel mezzo dei polmoni, era situato all'innanzi, e aveva un gran volume: dopo d'aver aperto il pericardo ho veduto che il cuore era piatto all'innanzi e all'indietro. I due ventricoli erano l'uno allato dell'altro e separati colla punta; il destro era molto più grosso del sinistro, ma le orecchiette erano tutt'edue della medesima grandezza. I rami [LM, fig. 1.] della trachea-arteria penetravano nell'interno dei polmoni [in tutta l'estensione RS, fig. 2., ov'essi son veduti dalla loro fuccia inferiore]. Dopo aver aper-

dell' Embrione di Lamantino. 243

ta questa parte della trachea, ho veduti sulle sue pareti interne più orifizj, che penetravano in essa.

L' ano e le parti della generazione erano situate sotto l' ultime vertebre del dorso; eravi un pollice e mezzo di distanza dall' ano fino all' orifizio del prepuzio, che formava al difuori del ventre un fodero lungo due linee: la ghianda usciva fuori del prepuzio della lunghezza di quattro linee; esso aveva sei linee di lunghezza dalla sua estremità [B, *tav. XXI.*] fino all' inserzione [C] del prepuzio [DD], e terminava con una prominenza conica [B], alla cui punta si trovava l' orifizio dell' uretra; all' intorno della detta prominenza la ghianda era fatta a frangia, ed eravi una cavità poco profonda al dinanzi della sua base. La verga [E] era rotonda, e ciascun ramo dei corpi cavernosi metteva capo ad una cartilagine sottile, piatta e triangolare [F], che sembrava dinotare la formazione d' un osso: la detta cartilagine era attaccata per via d' un lungo legamento all' estremità della penultima delle coste false, e per via d' un altro legamento più forte e più corto all' apofisi trasversa di una delle vertebre della coda. I testicoli [GG] avevano una forma triangolare: i canali deferenti [HH] erano più corti che gli ureteri [II], e mettevano capo alle vescichette seminali [KK]. La vescica [L] era puntuta: questa forma proveniva dall' uscita dell' uraca pel fondo della vescica.

244 *Descrizione dell' Embrione, ec.*

Nel collo non ho distinte che sei vertebre: ve n'erano sedici nel dorso, e sedici coste da ciascun lato, due delle quali solamente erano coste vere, e mettevano capo colla loro cartilagine allo sterno, che mi parve non esser composto che d'un sol osso. La terza costa aveva parimente una lunga cartilagine diretta verso lo sterno, ma non giungeva fino ad esso, e terminava vicino alla cartilagine xifoide. Le vertebre della coda erano al numero di ventotto, e avevano ciascuna le loro apofisi trasverse ben distinte, eccettuato nell' ultime vertebre, ch'erano piccolissime. Non eravi punto di clavicole. L'omoplata era grande e di forma triangolare allungata, e aveva una spina. Gli ossi dell'avan-braccio erano più corti che gli ossi del braccio. Gli ossi del metacarpo e le falangi dei diti eran tutti ben distinti; ma quelli del carpo sorgevano appena.



DESCRIZIONE

D'UNA TESTA DI LAMANTINO
DEL SENEGAL.

Questa testa fu recata dal Senegal dal Sig. Adan-
son; non vi restano che gli ossi, che mi pa-
jon tutti interi: essi provengono da un animale
molto giovane, poichè gli ultimi tre denti mascel-
lari da ciascun lato delle mascelle non son peranco
usciti dagli alveoli. Per quanto ho potuto giudi-
care della somiglianza d'un individuo ad un altro
per la forma della testa e del muso, e per la situa-
zione delle nari e degli occhi, paragonando la testa
intera d'un feto colla testa scarnata d'un animal
giovane, credo che quella, di cui qui si parla,
sia stata tolta da un individuo presso a poco della
medesima specie, che il feto lamantino d'America,
di cui ho fatta la descrizione, e che per conse-
guenza il lamantino del Senegal e quello dell' Ame-
rica sian di specie poco diversa, e forse della
medesima specie: mi son anche maggiormente con-
fermato in questa opinione, allorquando avendo
fatto vedere un feto di lamantino della Guiana
al Sig. Adanson, egli ha notate poche differenze
tra questo feto e i lamantini, ch' egli ha veduti
nel paese del Senegal: il labbro superiore del feto
gli parve meno innoltrato al dinanzi dell' inferio-
re, la coda men rotonda alla sua estremità, la

testa meno allungata , il muso più grosso e 'l braccio men largo che nei lamantini del Senegal , ma fissatte differenze si possono trovare tra un feto e un adulto della medesima specie .

La testa scarnata del lamantino del Senegal rassomiglia meno a quella del morso e del dugone , che a quella della maggior parte degli altri quadrupedi , che hanno la testa larga e 'l muso corto . La mascella superiore è più lunga dell' inferiore ; l' una e l' altra hanno poca larghezza all' estremità ; l' apertura delle nari è molto estesa , principalmente in lunghezza dall' innanzi all' indietro ; essa occupa una grande incavatura , ch' è nella parte anteriore dell' osso frontale , e comunica nella bocca al dinanzi del palato : non ho veduto punto d' ossi proprj del naso : le orbite degli occhi sono situate su i lati della testa dirimpetto al mezzo dell' apertura delle nari : la parte anteriore degli orli delle orbite è molto sporgente ; esse han poco diametro , e l' apofisi orbitaria dell' osso frontale è grande ; così gli orli ossei delle orbite non sono interrotti che da un piccol intervallo che non è che la ventesima parte in circa della circonferenza delle orbite : l' arco zigomatico ha maggior volume che in nessun altro animale , perchè l' apofisi dell' osso temporale è grossissima . Il cranio è poco esteso : sull' occipite vi sono delle forti coste trasversali . L' orlo dei rami della mascella inferiore è sporgente e grosso . L' apofisi coronioide è larghissima e molto inclinata all' innanzi .

d'una Testa di Lamantino . 247

Il lamantino del Senegal non ha denti incisivi , nè canini : m'è paruto che vi fossero nove denti mascellari da ciascun lato di ciascuna mascella , il che fa in tutto trentasei denti , contando i tre ultimi , che non erano ancora usciti dagli alveoli . Tutti questi denti son quasi quadrati e coperti di smalto ; la loro corona è formata da due o tre reste trasversali .



DESCRIZIONE

DELLA PARTE DEL GABINETTO

*Spettante alla Storia Naturale*DELLE FOCHE, DEL MORSO, DEL DUGONE
E DEL LAMANTINO.

Num. MCCLXXI.

Una pelle di foca.

Questa pelle è imbottita ; vi si son lasciati gli ossi della testa e dei piedi. I colori del pelo rassomigliano a quelli della foca, eh' io ho tagliata e descritta.

Num. MCCLXXII.

Lo scheletro d' una foca.

Questo è lo scheletro, che ha servito di soggetto per la descrizione degli ossi della foca. Le gambe di dietro sono attaccate al resto dello scheletro, nella stessa situazione, in cui si trovano sotto la pelle dell' animale intero.

Num. MCCLXXIII.

La pelle d' una foca delle Indie.

A Questa pelle, eh' è imbottita e ben conservata, sono attaccati gli ossi dei diti e delle mascelle. Essa fu data al Gabinetto dal Sig. Mauduit, Dottor-Reggente della Facoltà di Medicina di Parigi.

Num.

Descrizione del Gabinetto. 249

Num. MCCLXXIV.

*L'estremità delle mascelle d'una foca
delle Indie.*

I Denti incisivi del disopra e del disotto sono ne' loro alveoli: vi si vede distintissimamente la figura singolare dei denti forcuti di quest' animale.

Num. MCCLXXV.

La pelle d' un morso.

IN questa pelle, la cui descrizione si trova in quella del morso, sono attaccati i piedi, una parte degli ossi della testa e le zanne.

Num. MCCLXXVI.

Un feto di morso.

Questo feto è nello spirito di vino. L'ho tagliato, e ho data la descrizione delle sue viscere con quella delle sue parti esteriori nella descrizione del morso. Esso era femmina.

Num. MCCLXXVII.

La verga e i testicoli d' un morso.

Queste parti sono nello spirito di vino, e sono state tolte da un individuo giovane, poichè l'osso che si sente sotto la ghianda e sotto una parte della verga non ha che un mezzo piede in circa di lunghezza; quella della ghianda non è che di tre pollici; l'osso adunque s'estende tre pollici nella verga; il resto della verga, o piuttosto ciò che se ne trova nel pezzo, di cui si tratta, non ha che tre pollici di lunghezza. Non ho ve-

Tom. XXVII. P

duto che un corpo cavernoso . I testicoli rassomigliano a quelli degli altri quadrupedi ; essi hanno quasi due pollici e mezzo di lunghezza : aprendoli ho veduto nel loro interno un asse tendinoso .

Num. MCCLXXVIII.

L'osso della verga d'un morso .

Quest' osso ha la forma d' una clava un poco curva : è lunga ventidue pollici e mezzo , ha sette pollici e mezzo di circonferenza al sito più grosso , e solamente quattro al sito più piccolo . La radice di quest' osso ha una faccia tubercolosa : vi son parimente de' tubercoli alla sua estremità , ch' è rotonda . Il suo peso è di due libbre e mezzo .

Num. MCCLXXIX.

Altr' osso della verga d'un morso .

Quest' osso è più piccolo del precedente ; è troncato alla sua estremità per una sezione trasversale , che scopre la sostanza cellulare ; essa è involta dalla sostanza foda , che non ha che due linee e mezzo in circa di grossezza .

Num. MCCLXXX.

Gli ossi della testa d'un morso .

La descrizione e le misure di questa testa , e delle zanne , che vi sono attaccate , si trovano nella descrizione del morso .

Num. MCCLXXXI.

Le zanne d'un morso giovane .

Queste zanne non hanno undici pollici di lunghezza ; l' una ha cinque pollici e tre linee

di circonferenza alla sua radice, e l'altra solamente tre pollici e due linee: non ostante questa differenza di grossezza, credo che le zanne, di cui si parla, possano provenire da uno stesso individuo; siffatte disuguaglianze si trovano spesso in parti, che si corrispondono da ciascun lato del corpo degli animali; fors' anche esse non sono mai assolutamente simili; quanto più queste parti son grandi, tanto più son notabili le loro differenze.

Num. MCCLXXXII.

Una grande zanna di morso.

LA lunghezza di questa zanna è di due piedi e sei pollici e mezzo; essa ha nove pollici e nove linee di circonferenza alla sua radice. Paragonando la grandezza di questa zanna con quelle delle zanne, che sono attaccate alla pelle riferita sotto il Num. MCCLXXV., sembra che il morso, che aveva la zanna, di cui si parla, avesse più di venti piedi di lunghezza, misurato dall'estremità del muso fino all'origine della coda, supponendo che l'accrescimento del corpo si faccia in proporzione dell'accrescimento delle zanne. Quella, ch'ora descrivo, è quasi diritta; ho fatta fare una sezione trasversale vicino alla sua estremità per iscoprire la sua sostanza interiore; vi si vede la parte tubercolosa, la parte compatta, e la scorza nei siti ove la zanna non è stata esteriormente logorata. Il pezzo ch'è separato per mezzo della sezione è attaccato al resto della zanna per via d'una commessura e ritenuto con un uncino. La zanna intera pesa dieci libbre e tre quarti.

Num. MCCLXXXIII.

Altra zanna di morso.

Questa zanna è longitudinalmente divisa in due parti, e l'uno dei piani della sezione è ripu-

lito. Vi si veggono le tre sostanze della zanna, le differenze del lor lustro e del lor colore, e dei riflessi gatteggianti della sostanza compatta.

Num. MCCLXXXIV.

Un pezzo d'una zanna di morso.

Questo pezzo è pulito sopra le sue due facce. Vi si distinguono gli strati concentrici, di cui è composta la sua sostanza compatta.

Num. MCCLXXXV.

Un dente mascellare di morso.

Questo dente è tagliato trasversalmente nel mezzo; l'uno dei piani della sezione è stato pulito per far vedere l'avorio dei denti mascellari del morso.

Num. MCCLXXXVI.

La testa d'un dugone.

Questa testa [tav. XIX.] è scarnata. Vi mancano interamente gli ossi parietali e l'occipitale: le parti che restano hanno una figura molto straordinaria e differentissima da quella delle parti, che loro corrispondono in qualunque altro animale, anche nel morso, sebbene la testa del dugone abbia maggior relazione a quella del morso, che a quella di nessun altro animale. Per meglio far conoscere la forma e la situazione delle diverse parti della testa, di cui si parla, è a proposito il cominciare dall'indicare le principali di queste parti sulle figure della tav. XIX. Vi si vede distintamente la porzione anteriore [A, fig. 1., che rappresenta la testa veduta da lato] dell'osso frontale: l'apertura delle nari [BC];

un angolo [D] formato dalla mascella superiore, al dinanzi dell' apertura delle nari; la grand' estensione [DE] che ha questa mascella dall' apertura delle nari [B] fino all' orlo alveolare [E]; l'apofisi zigomatica [FG] dell' osso temporale; l'osso della guancia [HIK]; l'orbita dell' occhio [L]; l'apofisi condiloidea [M] della mascella inferiore; la sua estremità anteriore [N, fig. 1., e fig. 2., che rappresenta la testa veduta pel davanti, colla bocca aperta]; il contorno [O] de' suoi rami; una profonda incavatura [P] sul suo orlo inferiore; un angolo sporgente [Q] sul suo orlo superiore, che corrisponde all' angolo della mascella superiore. Dopo aver paragonata questa testa con quella del morso, presumo ch' essa provenga da un animale avente maggiori relazioni a quella del morso che a nessun' altra degli animali ch' io conosco, perchè le diversità grandi che si trovano tra queste due teste per le loro forme non m' hanno impedito di rimarcarvi un fondo di rassomiglianza decisiva. Il dugone ha delle zanne [RR] come il morso, e gli alveoli di tali zanne sono profondissimi e allungano la mascella a seguo che s' estende molto al dinanzi e al disotto del palato, di modo che questo prolungamento forma col palato, al di dentro della bocca, un angolo rientrante, e al di fuori, colla faccia superiore della testa, un angolo sporgente; tali angoli sono notabilissimi nelle teste di questi due animali, e contribuiscono più che la struttura del resto della testa a render la sua forma straordinaria. Egli è ben certo che questa strana forma, relativamente agli altri animali, non proviene che dalla lunghezza degli alveoli; imperciocchè supponendo che i denti anteriori della mascella superiore fossero grandissimi in tutti gli animali, e avessero degli alveoli molto lunghi, che allungassero la mascella, fissatto prolungamento formerebbe parimente, col palato, un angolo rientrante, e col frontale un angolo sporgente, di modo che la fi-

gura della loro testa s'accosterebbe molto a quella della testa del morso e del dugone. Tra le zanne di quest'ultimo vi ha poco intervallo; esse fan le veci di denti incisivi; i loro alveoli non son separati che per via d'un tramezzo poco grosso; tra esse non restavi nessun voto; la porzione della mascella superiore, ove sono tutteddue, si trova ai dinanzi della mascella inferiore. Le estremità delle due mascelle si toccano con una faccia larga e piatta; sulla mascella inferiore la detta faccia [S, *tav. XIX.*] è inclinata al basso, e forma, coll'orlo alveolare [T] di questa mascella, un angolo sporgente [Q], e sugli orli inferiori della stessa mascella un'incavatura corrispondente al detto angolo. Nel morso gli alveoli delle zanne essendo molto distanti l'un dall'altro, e lasciando un grand'intervallo voto tra le loro parti inferiori, la mascella inferiore occupa il detto intervallo colla sua estremità, che ha poca larghezza, e che non tocca la mascella superiore. L'estremità della mascella inferiore non termina con una faccia piatta e inclinata, che formi, cogli orli alveolari della detta mascella, un angolo sporgente e delle incavature sugli orli inferiori, come nel dugone. L'apertura delle nari di quest'animale è molto maggiore che nel morso, ed è situata al di là dell'angolo sporgente della mascella superiore. Quest'apertura ha una comunicazione nella bocca per la parte anteriore del palato. Le orbite degli occhi son situate su' i lati della testa, al disotto dell'apertura delle nari. L'apofisi zigomatica dell'osso temporale è molto più lunga che nel morso. L'osso della guancia non ha punto d'apofisi orbitaria: l'orlo osseo delle orbite è interrotto d'un quarto in circa della loro circonferenza. I rami della mascella inferiore son più alti e più curvi che nel morso.

I denti mascellari del dugone son situati al fondo della bocca a una gran distanza dalle zanne: ve ne son quattro [V, *tav. XIX.*] da ciascun

lato della mascella superiore, e solamente tre [T] da ciascun lato della mascella inferiore, il che non fa che sedici denti in tutto, comprendovi le zanne. I mascellari rassomigliano più alle zanne che ai mascellari del morso, o a quelli degli altri animali: la loro corona è formata da una faccia concava; la loro radice è vota come quella delle zanne; gli ultimi sono i più grossi; essi hanno una larga scanalatura longitudinale su i lati. Tutti questi denti sono di sostanza d'avorio, con una scorza sottile della stessa natura, senza verun invoglio di smalto. Le zanne hanno circa un mezzo piede di lunghezza, e due pollici di circonferenza: la cavità della loro radice ha più di tre pollici di profondità; esse sono alquanto curve, e non escono al di fuori dell' alveolo che un pollice: questa parte è coperta di smalto nella sua circonferenza, eccettuato sul lato esterno. La sostanza di queste zanne è d'avorio come quella dei mascellari: la loro estremità è stata logorata pel fregamento, e la sua faccia obliqua si trova sul lato esterno della zanna: questa faccia non ho potuto esser formata dall' incontro di verun altro dente; io presumo che l' animale fregghi le sue zanne dal lato esterno contro i corpi che incontra, e le logori sullo stesso lato fino alle gengive. La testa riferita sotto il presente numero fu data al Gabinetto dal Sig. Bernardo de Jussieu.

Num. MCCLXXXVII.

Una zanna di dugone.

Questa zanna proviene dal lato sinistro, e non ha che un mezzo piede di lunghezza. Fu tagliata trasversalmente, e l' uno dei piani della sezione fu pulito per far vedere la qualità dell' avorio di questa zanna.

256 *Descrizione del Gabinetto.*

Num. MCCLXXXVIII.

Un dente mascellare di dugone.

Questo dente è stato tagliato trasversalmente, come la zanna riferita sotto il Num. precedente, e pulito sull' uno dei piani della sezione per far vedere la sua sostanza d'avorio.

Num. MCCLXXXIX.

Un feto di lamantino.

Questo feto è presso a poco della stessa grandezza che quello, la cui descrizione si trova in questo volume. Essi furon dati tutteddue al Gabinetto dal Sig. Cavaliere Turgot, Governatore di Cajenna, che gli aveva ricevuti dal detto Paese.

Num. MCCXC.

I polmoni e 'l cuore d' un lamantino.

Queste parti trovansi nello spirito di vino, e furon tolte dall' embrione di lamantino, ch' è stato descritto in questo Tomo.

Fine del Tomo XXVII.

INDICE.

<i>Il Pipistrello Ferro-di-lancia .</i>	pag. <u>3</u>
<i>Il Serval .</i>	<u>11</u>
<i>L'Ocelot .</i>	<u>18</u>
<i>Il Margay .</i>	<u>29</u>
<i>Il Chacal e l'Adive .</i>	<u>37</u>
<i>L'Isatis .</i>	<u>57</u>
<i>Il Ghiottone .</i>	<u>64</u>
<i>Le Muffette .</i>	<u>75</u>
<i>Il Pèkan e il Vison .</i>	<u>95</u>
<i>Il Gibellino .</i>	<u>101</u>
<i>Il Lemno .</i>	<u>107</u>
<i>La Saricovienna .</i>	<u>112</u>
<i>Una Lontra del Canada .</i>	<u>115</u>
<i>Le Focbe , le Vacche marine e i lamanti- ni .</i>	<u>123</u>

Di M. de Buffon.

<i>Descrizione del Pipistrello Ferro-di-lancia .</i>	<u>6</u>
<i>Descrizione del Serval .</i>	<u>14</u>
<i>Descrizione dell' Ocelot .</i>	<u>25</u>
<i>Descrizione del Margay .</i>	<u>33</u>
<i>Descrizione del Guepardo .</i>	<u>35</u>
<i>Descrizione del Chacal .</i>	<u>52</u>
<i>Descrizione del Coaso .</i>	<u>89</u>
<i>Descrizione del Chinco .</i>	<u>91</u>

<i>Descrizione del Zorillo.</i>	93
<i>Descrizione del Pekan.</i>	97
<i>Descrizione del Vison.</i>	99
<i>Descrizione d'una Lontra del Canadà.</i>	119
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale del Pipistrello Ferro-di-lancia, del Margay, del Chacal e d'una Lontra del Canadà.</i>	121
<i>Descrizione della Foca.</i>	200
<i>Descrizione del Morso.</i>	225
<i>Descrizione d'un Embrione di Lamantino della Guiana.</i>	237
<i>Descrizione d'una Testa di Lamantino del Senegal.</i>	245
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale delle Foche, del Morso, del Dugone e del Lamantino.</i>	248

Di M. Daubenton.





